



zoovet®

ATB FENAC

5.000.000 U.I. / 10.000.000 U.I.

ELABORADO BAJO NORMAS GMP

Penicilina sódica + Penicilina benzatínica
Estreptomicina + Diclofenac

Potente combinación farmacéutica capaz de revertir rápidamente, procesos infecciosos sensibles a sus componentes



ACCIÓN RÁPIDA

30 minutos luego de la aplicación



ACCIÓN DEPÓSITO

24-48 horas de biodisponibilidad

Fórmula

5.000.000 U.I.:

Cada frasco con polvo contiene: Penicilina G Benzatínica 2.500.000 U.I. (1,98 g), Penicilina G Sódica 2.500.000 U.I. (1,56 g), Estreptomina 2 g.

Cada frasco con diluyente contiene:

Diclofenac sódico 1,25 g, Agua c.s.p. 20 ml.

10.000.000 U.I.:

Cada frasco con polvo contiene:

Penicilina G Benzatínica 5.000.000 U.I.; Penicilina G Sódica 5.000.000 U.I.; Estreptomina 4 g.

Cada frasco con diluyente contiene:

Diclofenac sódico 2,5 g, Agua c.s.p. 40 ml.

Indicaciones

Se trata de una formulación antimicrobiana de amplio espectro destinada a combatir infecciones mixtas causadas por bacterias gram positivas, aerobias y anaerobias, y gram negativas. Además cuenta con el accionar de un potente agente antiinflamatorio, analgésico y antipirético.

Presenta efectividad en el control de afecciones causadas por las siguientes bacterias: *Streptococcus penicilina lábiles*; *Staphylococcus penicilina lábiles*; *Corynebacterium pyogenes*; *Clostridium spp.*; *Erysipelothrix rhusiopathie*; *Actinomyces ovis*; *Leptospira spp.*; *Pasteurella spp.*; *Escherichia coli* y *Campylobacter foetus*.

Dosis

Diluya en forma aséptica el polvo mezcla de antimicrobianos con el diluyente del segundo frasco. Agitar antes de usar. Administrar 1ml cada 25 kg de peso vivo.

Esta dosis corresponde a la aplicación de:

- 10.000 U.I. de penicilina por kg de peso vivo.

- 4 mg de estreptomina por kg de peso vivo.

- 2,5 mg de diclofenac por kg de peso vivo.

Repetir cada 24 horas. Tres aplicaciones. De no remitir los signos replantear el diagnóstico y su tratamiento.

Una vez reconstituido el producto debe conservarse en heladera, siendo la duración máxima de 48 horas.

Vías de administración

Se aplica por vía intramuscular profunda.

Contraindicaciones, precauciones y advertencias

Evite administrar en animales con historia de reacciones alérgicas o hipersensibilidad a los principios activos del producto.

No administrar a animales con insuficiencia renal, insuficiencia hepática o úlceras gastrointestinales.

Utilizar jeringa y aguja estériles.

Cerciórese al introducir la aguja y previo al inyectar el antibiótico, que la misma no esté en un vaso sanguíneo.

A la dosis recomendada es bien tolerado. Las reacciones colaterales que pueden presentarse están relacionadas con el tracto gastrointestinal y pueden ser estomatitis, anorexia, constipación o diarrea y dispepsia.

No destinar animales a faena para consumo humano hasta 30 días después de finalizado el tratamiento.

No administrar en vacas en lactación cuya leche se destine a consumo humano o industrialización.



Bovinos



Equinos



Porcinos



Ovinos



zoovet[®]

Otros antibióticos zoovet asociados con diclofenac

OXIFENAC[®] L.A.

Oxitetraciclina 20% - Diclofenac sódico 2,5%



ZIFLOR[®] FENAC

Florfenicol 30% - Diclofenac (diclofenaco) 3,75%



ELABORADO BAJO NORMAS GMP

ATB FENAC

5.000.000 U.I. / 10.000.000 U.I.

- Antimicrobiano
- Antiinflamatorio
- Analgésico
- Antipirético
- Amplio espectro
- Polvo para preparar
- Acción rápida y de depósito



zoovet

www.zoovet.com.ar

[/zoovet.productosveterinarios](https://www.facebook.com/zoovet.productosveterinarios)

[@Zoovetargentina](https://www.instagram.com/Zoovetargentina)

[Parque Tecnológico Litoral Centro
CP 3000 - Santa Fe - Argentina](#)