



ZOOVET®
● ○ ●

DI-OXI-FORTE®

ELABORADO BAJO NORMAS GMP

Oxitetraciclina clorhidrato: 7 %
Diminazene diaceturato: 3,5%



Probado por la
Facultad de Ciencias
Veterinarias
Corrientes (UNNE)



¡UN FRASCO DE 100 ML
ALCANZA PARA 1000 K.P.V.!

Di Oxi Forte

Producto evaluado y aprobado por facultativos

Prueba oficial de eficacia parasiticida
Realizada en la Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Veterinaria de Corrientes. Director del ensayo: MV. Elvio Eduardo Ríos.

1. Resumen del ensayo
A los 6 animales que conformaron cada grupo se les aplicó 1×10^7 eritrocitos infectados

con cada una de las especies etiológicas por separado, para poder demostrar la eficacia terapéutica individual sobre cada una de las especie productoras de tristeza bovina. Una vez presentado los síntomas clínicos y hematológicos de la enfermedad, se trataron a 4 animales por grupo con DI OXI FORTE a razón de 1 ml cada 10 kg de peso vivo, permaneciendo 2 animales por grupo como testigos sin tratar.

2. Resultados

Grupos de 6 animales	Aplicación de 1×10^7 Infectados a	Síntomas clínicos de la enfermedad	Resultado de los 4 tratados por grupos con <u>DI OXI FORTE</u>	Resultado de los 2 testigos por grupo <u>sin tratar</u>
Grupo 1	Babesia bovis	Sí	Cura clínica y hematológica	Muerte
Grupo 2	Babesia bigermina	Sí	Cura clínica y hematológica	Muerte
Grupo 3	Anaplasma marginale	Sí	Cura clínica y hematológica	Muerte

3. Conclusiones

Todos los animales bajo prueba presentaron signos y síntomas clínicos, parasitológicos y hematológicos correspondientes al complejo tristeza bovina antes de ser tratados con el producto.
Todos los animales tratados (para los 3 inóculos) evidenciaron resolución de los parámetros evaluados y cura clínica y hematológicas hasta el final del ensayo, y los testigos (sin tratar) de los 3 grupos murieron en el transcurso de la prueba con signos y síntomas de la enfermedad.

DI OXI FORTE se comportó como eficaz para el tratamiento del complejo parasitario rikettsial “tristeza bovina” independientemente del agente etiológico actuante.





Di Oxi Forte


Un solo tratamiento para todos los agentes productores de tristeza

La tristeza bovina es un síndrome causado por 3 agentes etiológicos a saber: *Babesia bovis* (1); *Babesia bigemina* (2) y *Anaplasma marginale* (3), no siendo raras las infestaciones/infecciones mixtas.


Si bien existen diferencias sintomatológicas y hematológicas (de laboratorio) todas producen hipertermia de entre 40,5°C y 42°C (y por lo tanto muerte embrionaria y muerte de espermatozoides en toros), anemias de menor o mayor grado (todas reflejan un hematocrito por debajo de un 20 %), y faltas de estado y decaimiento general, con pérdidas productivas muy importantes. El síndrome puede producir **mortalidades hasta un 50% si no se trata rápida y adecuadamente**.

Indicaciones


Tratamiento y prevención del Síndrome de Tristeza Bovina: Babesiosis y anaplasmosis bovina, y enfermedades infecciosas bacterianas producidas por gérmenes sensibles a la oxitetraciclina como: mancha, gangrena, queratoconjuntivitis, leptospirosis, carbunco, etc.



1. *Babesia bovis*



2. *Babesia bigemina*




3. *A. marginale*

USO EXTRAINDICADO

Tripanosomiasis equina: 1 ml cada 5 kg de peso (equivalente a 7 mg/kg de Diaceturato de Diminazene) y 1 ml cada 10 kg de peso (equivalente a 3,5 mg/kg de Diaceturato de Diminazene) a las 24 hs por la vía IM (Según Blood - Henderson - Radostits).

Dosificación, especies destinadas y vías de administración

Bovinos: 1 ml cada 10 kg (equivalente a 3,5 mg/kg de Diaceturato de Diminazene y 7 mg/kg de Oxitetraciclina) de peso vivo en una única dosis, por la vía intramuscular. En caso de anaplasmosis se puede repetir a las 24 hs si fuera necesario.



Mucosas conjuntiva de anemia (subictérica)



Mucosas vulvar con signos de anemia (subictérica)



Mucosas conjuntiva de anemia (subictérica)

ELABORADO BAJO NORMAS GMP

¡No importa la causa de su tristeza!

DI-OXI-FORTE®

Oxitetraciclina clorhidrato: 7 %
Diminazene diacetato: 3,5%



1.

CURATIVO

En zonas endémicas sobre animales con sintomatología clínica.

2.

PREVENTIVO

Uso en zonas de riesgo, sobre animales sospechosos de estar incubando la enfermedad.

3.

ECONÓMICO

Una sola dosis controla la enfermedad sin necesidad de diagnósticos etiológicos.

ZOOVET®
● ○ ●

www.zoovet.com.ar

/zoovet.productosveterinarios

@Zoovetargentina

Parque Tecnológico Litoral Centro
CP 3000 - Santa Fe - Argentina