



zoovet®

MINI VADEMÉCUM REPRODUCCIÓN DE GRANDES ANIMALES

ELABORADO BAJO NORMAS GMP

INNOVACIÓN & VANGUARDIA

OPCIONES DE PROTOCOLOS BÁSICOS PARA TRATAMIENTOS DE I.A.T.F. + FOLI-REC

OPCIÓN 01

Día 00: Dispositivo + 2 ml de Benzoato Zoovet

Día 08: Retirar Dispositivo+ 2 ml de Ciclar

Opcional: Foli-Rec: 1-1,5 ml en vaquillonas y 1,5-2 ml en vacas**

Día 09: (24 hs de retirado los Dispositivos):
1 ml de Benzoato Zoovet.

Día 10: (52-54 hs de retirado los Dispositivos con Foli-Rec): IATF

OPCION 01 / CONVENCIONAL CON BENZOATO



* Con Foli-Rec 48 horas

OPCIÓN 02


Día 00: Dispositivo+ 2 ml. de Benzoato Zoovet

Día 08: Retirar Dispositivo + 2 ml. de Ciclar + 1 ml. de Cipionato Zoovet.

Opcional: Foli-Rec: 1-1,5 ml en vaquillonas y 1,5-2 ml en vacas**

Día 10: (48 horas de retirado los Dispositivos con Foli-Rec): IATF

OPCIÓN 02 / CONVENCIONAL CON CIPIONATO



* Con Foli-Rec 48 horas

OPCIÓN 03


Día 00: Dispositivo + 2,5 ml. de Buserelina Zoovet.

Día 07: Retirar Dispositivo + 2 ml. de Ciclar

Opcional: Foli-Rec: 1-1,5 ml en vaquillonas y 1,5-2 ml en vacas**

Día 9: Buserelina Zoovet (48 hs de aplicado el Ciclar).
12-16 hs pos Buserelina: IATF.

OPCIÓN 03 / OVSYNCH+DISPOSITIVO



OPCIÓN 04

Día 00: Dispositivo + 2 ml. de Benzoato Zoovet.

Día 06: Retirar Dispositivo + 2 ml. de Ciclar

Foli-Rec: 1-1,5 ml en vaquillonas y 1,5-2 ml en vacas**

Día 09: 2,5 ml de Buserelina Zoovet (0,010 mg) IATF

* Según criterio del profesional veterinario

OPCIÓN 03 / J-SYNCH



OPCIÓN 05

Día 00: Dispositivo + 2 ml. de Benzoato Zoovet.


Día 06: Retirar Dispositivo + 2 ml. de Ciclar

Foli-Rec: 1-1,5 ml en vaquillonas y 1,5-2 ml en vacas**

Día 09: 2,5 ml de Buserelina Zoovet (0,010 mg) IATF

** Según criterio del profesional veterinario

OPCIÓN 05 / J-SYNCH




INDICACIÓN DE USO PARA REDUCIR PÉRDIDAS EMBRIONARIAS

El tratamiento combinado de FOLI-REC (140 UI, 2 ml) aplicado al día 14 y acetato de buserelina (0,01 mg, 2,5 ml BUSERELINA – ZOOVET) al día 17 post inseminación demostraron reducir las pérdidas embrionarias tempranas en vacas lecheras de alta producción, principalmente en vacas de más de 1 lactancia.


La suplementación con una dosis de FOLI-REC al día 14 post inseminación indujo una mayor producción de progesterona por parte del cuerpo lúteo de gestación. Por su parte, FOLI-REC también estimuló el aumento de tamaño de folículos en crecimiento que pudieron luego ser ovulados mediante la aplicación de una dosis de BUSERELINA al día 17 induciendo una elevada tasa de formación de cuerpos lúteos accesorios aumentando de esa forma el tejido luteal total.

Está bien estudiado que elevados niveles de progesterona durante la gestación temprana, previo a la implantación del embrión, aumentan el tamaño del mismo y la producción de interferón Tau por parte de este mejorando las chances de su supervivencia.

IATF



IADC



Protocolo de aplicación de FOLI-REC y BUSERELINA el día 14 y 17 post inseminación a tiempo fijo (IATF) o celo detectado (IADC). P₄= progesterona, BE= benzoato de estradiol, PGF 2α= prostaglandina F2α, CE= cipionato de estradiol, DG= diagnóstico de gestación.

Un ternero por vaca por año. Ese es el kit de la cuestión.

Todo lo necesario para una buena performance reproductiva en la misma caja.

Kit reproductivo FULL



\$

ESTE KIT CONTIENE
Prociclar 750 mg
CON CIPIONATO

CON STICKERS
IDENTIFICADORES
DE JERINGAS
Y FRASCOS

Kit reproductivo diprogest 600



\$

ESTE KIT CONTIENE
Diprogest 600 mg
CON CIPIONATO

CON STICKERS
IDENTIFICADORES
DE JERINGAS
Y FRASCOS

Kit reproductivo diprogest 1200 leche



\$

ESTE KIT CONTIENE
Progesterona 1,2 gr

Kit J-SYNCH con Prociclar



\$

ESTE KIT CONTIENE
Prociclar 750 mg
CON BUSERELINA

CON STICKERS
IDENTIFICADORES
DE JERINGAS
Y FRASCOS

Kit J-SYNCH con Diprogest



\$

ESTE KIT CONTIENE
Diprogest 600 mg
CON BUSERELINA

CON STICKERS
IDENTIFICADORES
DE JERINGAS
Y FRASCOS

FOLI-REC®

¡Única en el mundo!



\$

CONTIENE **30 y 100 ML**

- ✓ Lista para usar
- ✓ Rinde 15 a 20 dosis *
- ✓ Mantener entre 2-8°C

APLICADOR ZOOVET

<< **DISEÑO MODERNO** CON LOS
BENEFICIOS DE SIEMPRE



- ✓ Menor diámetro
- ✓ Fácilmente esterilizable
- ✓ Mango anatómico antideslizante
- ✓ Freno de armado (el émbolo luego de su preparación no se cae)

(*) Dosis de 1,5 o 2 ml para Bos taurus

RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS CON DIFERENTES CATEGORÍAS, PROTOCOLOS Y DOSIS

VACAS

Resultados de preñez en VACAS CON CRÍA (VCC), VACAS SECAS (VS) y EN LACTANCIA (VL) suplementadas con PMSG (400 UI) y FOLI-REC LÍQUIDO (140 UI) al retiro del dispositivo en protocolos de IATF:

Lugar	Categoría	Raza	Protocolo	Cant.	Foli-Rec líquido			eCG sérica			Valor P
					Cant.	Preñadas	Porcentaje Preñez	Cant.	Preñadas	Porcentaje Preñez	
Goya (Corrientes) 2	VCC	BR	Convenc	43	33	9	27%	10	3	30%	1,000
Tala Huasi (Córdoba)	VCC	AA	J-SYNCH	49	25	13	52%	24	12	50%	1,000
Humberto (Santa Fe)	VS	BF	Convenc	48	24	12	50%	24	7	29%	0,045
Malbrán (Santiago del Estero) 1	VS	BR	Convenc	237	122	72	59%	115	61	53%	0,354
Mojones Sur (Entre Ríos) 1	VS	AA	Convenc	140	120	71	59%	20	10	50%	0,471
Malbrán (Santiago del Estero) 2	VS	BR	Convenc	136	68	32	47%	68	33	49%	0,864
Porteña (Córdoba)	VL	HA	Convenc	57	29	13	45%	28	10	36%	0,149
El sombrero (Corrientes) 1	VS	BR	Convenc	200	92	35	38%	108	39	36%	0,811
El sombrero (Corrientes) 2	VCC	BR	Convenc	30	14	6	43%	16	6	38%	0,778
Brandsen (Buenos Aires)	VCC	AA	Convenc	112	62	36	58%	50	32	64%	0,251
Los sembrados (Santa Fe)	VCC	BR-BF	Convenc	303	147	51	35%	156	84	54%	0,008
Sunchales (Santa Fe)	VCC	BF	Convenc	185	96	41	43%	89	40	45%	0,962
Traill (Santa Fe)	VCC	BR	Convenc	117	62	34	55%	55	28	51%	0,453
Pozo Borrado (Santa Fe)	VCC	BR	Convenc	224	80	28	35%	144	61	42%	0,375
Logroño (Santa Fe)	VCC	BR	Convenc	131	65	24	37%	66	26	39%	0,571
Tio Pujio (Córdoba)	VCC	BR	Convenc	122	26	7	27%	96	50	52%	0,011
Villa Minetti (Santa Fe)	VCC	BR	Convenc	89	43	10	23%	46	16	35%	0,213
TOTAL=				2223	1108	494	45%	1115	518	46%	

VAQUILLONAS

Resultados de preñez en VAQUILLONAS (VQ) suplementadas con PMSG sérica y FOLI-REC LÍQUIDO al retiro del dispositivo en un protocolo de IATF.

Lugar	Protocolo	Raza	Cant.	Dosis UI FOL / eCG sér.	Foli-Rec líquido			eCG sérica			Valor P
					Cant.	Preñadas	Porcentaje Preñez	Cant.	Preñadas	Porcentaje Preñez	
Tacurales (Santa Fe) 1	Convenc	J X HA	103	105/300	54	25	46%	49	21	43%	0,927
Cda. Rosquin (Santa Fe)	Convenc	HA	67	140/400	30	17	57%	37	20	54%	0,994
Palacios (Santa Fe)	J-SYNCH	HA	22	140/400	13	9	69%	9	8	89%	0,360
Maciá (Entre Ríos)	Convenc	AA	90	105/300	45	22	49%	45	24	53%	0,673
San José (Entre Ríos)	J-SYNCH	AA	199	105/300	149	62	42%	50	13	26%	0,049
Mojones Sur (Entre Ríos) 2	J-SYNCH	AA	198	105/300	148	65	44%	50	19	38%	0,464
Tacurales (Santa Fe) 2	Convenc	HF	67	105/300	34	20	59%	33	15	45%	0,273
Las Palmeras (Santa Fe)	J-SYNCH	HA	34	105/300	17	11	65%	17	12	71%	1,000
Palacios (Santa Fe)	J-SYNCH	HA	20	105/300	9	7	78%	11	11	100%	1,000
Tacurales (Santa Fe) 3	Convenc	J X HA	62	105/300	28	14	50%	34	18	53%	1,000
Pérez Millán (Buenos Aires)	J-SYNCH	AA	173	105/300	86	69	80%	87	62	71%	0,205
Coronda (Santa Fe) 1	J-SYNCH	BR	206	105/300	99	35	35%	107	52	49%	0,035
El sombrero (Corrientes)	Convenc	BR	134	105/300	31	14	45%	103	42	41%	0,811
Arrufó (Santa Fe)	Convenc	BF	62	105/300	31	8	26%	31	20	65%	0,006
Coronda (Santa Fe) 2	J-SYNCH	BR	120	105/300	69	30	43%	51	28	55%	0,216
Sol de Julio (Santiago del Estero)	Convenc	BR	181	105/300	88	57	65%	93	48	52%	0,039
Los sembrados (Santa Fe)	Convenc	BR-BF	25	105/300	9	7	78%	16	11	69%	1,000
Sunchales (Santa Fe)	J-SYNCH	BF	89	105/300	46	15	33%	43	22	51%	0,115
Las Hacheras (Chaco)	J-SYNCH	BR-BF	182	105/300	56	27	48%	126	60	48%	0,917
Pozo Borrado (Santa Fe)	Convenc	BR	89	105/300	39	22	56%	50	20	40%	0,077
Tio Pujio (Córdoba)	Convenc	BF	47	105/300	12	8	67%	35	18	51%	0,363
TOTAL=			2170		1093	544	50%	1077	544	51%	

CONTACTO COMERCIAL

LUCIANO CATTANEO

DOCTOR EN CIENCIAS VETERINARIAS
RESPONSABLE TÉCNICO DEL ÁREA DE REPRODUCCIÓN BOVINA

+ 54 9 349 3436037 reproduccion@zoovet.com.ar

