



VADEMÉCUM

Animales de Compañía





Juntos más allá de la Salud Animal

“Juntos, nuestros apasionados colaboradores, impulsan soluciones innovadoras para la salud de todos los animales, contribuyendo así al futuro de nuestro planeta diverso”

#OneCeva

#OneHealth

#OnePlanet

Índice



FEROMONAS

01. Feliway Classic Spray
02. Feliway Classic Difusor
03. Feliway Friends Difusor
04. Adaptil Transport Spray
05. Adaptil Calm Collar
06. Adaptil Calm Difusor

ANALGÉSICOS Y ANESTÉSICOS

07. Algidol Dúo
08. Algidol Inyectable
09. Diazepam
10. Eutanásico
11. Xilazina

ANTIBIÓTICOS BETA

12. ATB Listo
13. Cefalong

ANTIBIÓTICOS NO BETA

14. Ciproplus Gel Ótico
15. Enroplus Comprimidos
16. Enroplus Inyectable
17. Doxin
18. Doxivit
19. Ziflor Crema Cicatrizante

ANTIDIARREICOS DIGESTIVOS

20. Duosecretina
21. Entero Relax Dúo
22. Full Hepat

ANTIINFLAMATORIOS

23. Algicam Pets Inyectable
24. Carprodol
25. Dexa 21- Vet
26. Prednovet
27. Triavet

ANTIMICÓTICOS

28. Itraconazol Suspensión Oral
29. Itraconazol Zoovet

ANTIparasitarios EXTERNOS

30. Spinomax Dúo Comprimidos
31. Tratamiento Integral Canino
32. P.I. Pipeta Imidacloprid
33. P.I.P. Plus
34. Pets Protector Max Spot on
35. Pets Protector Spray
36. Rochy crema
37. Rochy Curabicheras Aerosol
38. Ectocan

ANTIparasitarios INTERNOS

39. Albex
40. Trivermex Comprimidos
41. Trivermex Suspensión

HIGIENE Y BELLEZA

42. Bucal Vet
43. Shampoo con Clorhexidina
44. Shampoo AP
45. Shampoo Belleza

HORMONALES

46. Sincelar comprimidos
47. Sincelar Inyectable
48. T.I.U.

SUPLEMENTOS MINERALIZANTES

49. Artrovvet
50. Artrovvet Plus
51. Total Vet comprimidos
52. Vita Plus

Nuestra selección para uso en Felinos

FEROMONAS

- Feliway Classic Spray
- Feliway Classic Difusor
- Feliway Friends Difusor

ANALGÉSICOS Y ANESTÉSICOS

- Algidol Dúo
- Algidol Dúo Inyectable
- Diazepam
- Eutanásico
- Xilazina

ANTIBIÓTICOS BETA

- ATB Listo
- Cefalong

ANTIBIÓTICOS NO BETA

- Ciproplus Gel Ótico
- Enroplus Comprimidos
- Enroplus Inyectable
- Doxivit
- Ziflor Crema Cicatrizante

ANTI-DIARREICOS DIGESTIVOS

- Full Hepat

ANTIINFLAMATORIOS

- Dexa 21- Vet
- Prednovet
- Triavet

ANTIMICÓTICOS

- Itraconazol Suspensión Oral
- Itraconazol Zoovet

ANTIPARASITARIOS EXTERNOS

- P.I. Pipeta Imidacloprid
- Pets Protector Max Spot on
- Pets Protector Spray
- Rochy Curabichera Aerosol
- Rochy crema

ANTIPARASITARIOS INTERNOS

- Albex
- Trivermex Comprimidos
- Trivermex Suspensión

HIGIENE Y BELLEZA

- Bucal Vet
- Shampoo con Clorhexidina
- Shampoo Belleza

HORMONALES

- Sincelar comprimidos
- Sincelar Inyectable

SUPLEMENTOS MINERALIZANTES

- Artrovét
- Artrovét Plus
- Total Vet comprimidos

 **FELIWAY® CLASSIC**

 **FELIWAY® FRIENDS**

La opción natural que ayuda
a nuestros gatos a lidiar
con situaciones de estrés



Marcaje con orina

Arañazos verticales



Estrés en los viajes



Miedo



Casas con más de un gato



Nuevo hogar/entorno

Ayuda a que el gato se adapte mejor a la vida moderna creando un efecto de tranquilidad y bienestar que contribuye a evitar comportamientos no deseados y mejora la relación y la convivencia.



nuevo
DIFUSOR

Reduce los conflictos
entre gatos que viven juntos



nuevo
DIFUSOR



01. Felipay Classic Spray

Felipay es un análogo sintético del olor facial (fracción F3) de los gatos.



Cuando usar:

- En los viajes y visitas al veterinario.
- Permite un manejo adecuado y localizado de las zonas marcadas con orina o arañazos en el hogar.

Modo de uso:

En los viajes: Durante los viajes en coche o las visitas al veterinario, pulverizar directamente dentro del transportín. Pulverizar 2 veces en cada esquina y en la superficie de la caja de transporte.

En viajes largos, pulverizar cada 4-5 horas.

Esperar siempre unos 15 minutos antes de dejar que el gato se acerque a las zonas pulverizadas.

En el hogar: Pulverizar en puertas, marcos de ventanas y otros objetos que sobresalgan en la casa.

Para prevenir el marcaje si ya ha ocurrido, limpiar los lugares marcados con agua y jabón o alcohol.

- . 1 pulverización para marcaciones urinarias
- . 6 pulverizaciones para rasguños verticales.
- . Pulverizar 2 veces al día por lo menos durante 30 días.

En la clínica: Internación: se usa para generar tranquilidad y bienestar; durante la recuperación y para medicar.

Consultorio: Para hacer el examen físico.

Indicaciones:

- No tiene acción en humanos y otros animales.
- No olor ni perfume.
- No es sedante.
- No tiene contraindicaciones.
- No pulverizar nunca directamente sobre el gato.
- No hay posibilidad de sobredosis.
- No penetra en la circulación (sangre).
- Indicado en animales gerontes, ciegos o con deficiencias cognitivas.

Presentaciones: FELIWAY Classic Spray 60 ml 50 usos.



02. Felipay Classic Difusor

Felipay es un análogo sintético del olor facial (fracción F3) de los gatos.



Cuando usar:

- . Marcaje con orina: Disminuye el marcaje con orina en el 90% de los gatos tras un mes de uso.
- . Nuevo entorno/hogar: El 100% de los gatos se siente a gusto en el hogar desde el primer día.
- . Miedo: Ayuda a los gatos cuando tienen que adaptarse a nuevos entornos o a situaciones que le suponen un reto.
- . Arañazos verticales: Disminuye el 80% de los arañazos verticales en los primeros 7 días.
- . En la clínica: Internación: se usa para generar tranquilidad y bienestar; durante la recuperación y para medicar.
- . Consultorio: Para hacer el examen físico.

Se recomienda usar en sala de espera, consultorios y salas de internación donde genera un mejor resultado.

Modo de uso: Enrosca el envase en el difusor y conectarlo a un enchufe. Mantener el difusor enchufado todo el tiempo. Evitar enchufar el difusor debajo de estanterías o muebles y cerca de entradas o salidas de aire (ventanas, puertas) porque no funcionará correctamente.

El difusor debe ser revisado mensualmente y renovado cada 6 meses para asegurar un efecto óptimo. El repuesto debe ser renovado cada 30 días. Cada difusor cubre un área hasta 70 m2.

Indicaciones:

- No tiene acción en humanos y otros animales.
- No olor ni perfume.
- No es sedante.
- No tiene contraindicaciones.
- Indicado en animales gerontes, ciegos o con deficiencias cognitivas.

Presentaciones:

Felipay Classic Difusor + recambio 48 ml.
Felipay Classic recambio 48ml.

FEROMONAS



03. Feliway Friends Difusor

Reduce los conflictos entre gatos que viven juntos.



DIFUSOR

Cuando usar:

- En caso de tensión y conflictos entre gatos que viven en el mismo hogar.
- Persecuciones.
- Miradas desafiantes.
- Conflictos SIN marcaje de orina.
- Conflictos CON marcaje de orina.

Modo de uso:

Enroskar el envase en el difusor y conectarlo a un enchufe. Mantener el difusor enchufado todo el tiempo. Evitar enchufar el difusor debajo de estanterías o muebles, y cerca de entradas o salidas de aire (ventanas, puertas) porque no funcionará correctamente. El difusor debe ser revisado mensualmente y renovado cada 6 meses para asegurar un efecto óptimo. El repuesto debe ser renovado cada 30 días.

Indicaciones:

- No tiene acción en humanos y otros animales.
- No olor ni perfume.
- No es sedante.
- No tiene contraindicaciones.
- Indicado en animales gerontes, ciegos o con deficiencias cognitivas.

Presentaciones:

Feliway Friends Difusor + recambio 48 ml.
Feliway Friends recambio 48 ml.



04. Adaptil Transport Spray

Libera "mensajes de seguridad" que promueven una buena socialización y aprendizaje, evitando situaciones de estrés.



SPRAY

Cuando usar:

- Viajes.
 - Visitas al veterinario.
- Reduce el jadeo, los temblores y el nerviosismo durante el viaje.

Modo de uso:

Pulverizar directamente en el coche o en el transportín. Esperar unos 15 minutos antes de introducir al perro en el coche o en el transportín. En viajes largos pulverizar cada 4-5 horas. Nunca pulverizar directamente sobre el perro.

Indicaciones:

- Específico para la especie canina.
- No tiene acción en humanos y otros animales.
- No es sedante.
- No tiene olor ni perfume.
- No tiene contraindicaciones.
- Se puede utilizar con otros medicamentos.
- No penetra en la circulación (sangre).
- No hay posibilidad de sobredosis.
- Indicado en animales gerontes, ciegos o con deficiencias cognitivas.

Presentaciones:

Spray 60 ml 50 usos.



05.

Adaptil Calm Collar

Adaptil es un análogo de la feromona de apaciguamiento canino que libera "mensajes de seguridad" que ayudan a promover una buena socialización y aprendizaje, vitando situaciones de estrés en los perros.



Cuando usar:

- Visitas al veterinario o la peluquería.
- Ruidos fuertes: Reduce los signos de miedo, temblores o esconderse en un 93% durante tormentas eléctricas o fuegos artificiales.
- Residencia canina: Permite que se sientan tranquilos, reduce los ladridos y el movimiento de un lado al otro mientras los dueños están ausentes.
- Adiestramiento y socialización: Ayuda a los perros a aprender más rápido.
- Nuevo hogar: Logra reducir el llanto nocturno, adaptarse a nuevas rutinas, crear confianza y quedarse solo en casa.
- Miedos en el exterior: Logra que los perros se sientan más tranquilos y confiados.

Modo de uso:

Colocar el collar alrededor del cuello del perro y ajustarlo. El perro debe llevar el collar en todo momento (excepto, durante el baño con shampoo). El efecto del collar dura 30 días.

Indicaciones:

- Específico para la especie canina.
- No tiene acción en humanos y otros animales.
- No es sedante.
- No tiene contraindicaciones.
- No tiene olor ni perfume.
- Se puede utilizar con otros medicamentos.
- No penetra en la circulación (sangre).
- Indicado en animales gerontes, ciegos o con deficiencias cognitivas.

Presentaciones:

Collar Pequeño se recomienda para perros hasta 15 kg.
Collar Grande se recomienda para perros hasta 50 kg.



06.

Adaptil Calm Difusor

Adaptil es un análogo de la feromona de apaciguamiento canino que libera "mensajes de seguridad" que ayudan a promover una buena socialización y aprendizaje, evitando situaciones de estrés en los perros.



Cuando usar:

- Cambios en el ambiente: Nuevos integrantes en la familia, renovaciones, nuevo hogar.
- Ruidos fuertes: Reduce los signos de miedo, temblores o esconderse en un 93% durante tormentas eléctricas o fuegos artificiales.
- Solo en el hogar: Reduce en un 65% menos los ladridos, un 91% los signos de destrucción y un 75% el hacer sus necesidades dentro de la casa debido al estrés.

Modo de uso:

Enroskar el envase en el difusor y conectarlo a un enchufe. Mantener el difusor enchufado todo el tiempo. Evitar enchufar debajo de estanterías, detrás de puertas, cortinas o muebles porque no funcionará correctamente. El difusor debe ser revisado mensualmente y renovado cada 6 meses para asegurar un efecto óptimo. En la veterinaria, se recomienda usar en sala de espera, consultorios y salas de internación donde genera un mejor resultado.

Indicaciones:

- Específico para la especie canina.
- No tiene acción en humanos y otros animales.
- No es sedante.
- No tiene contraindicaciones.
- No tiene olor ni perfume.
- Indicado en animales gerontes, ciegos o con deficiencias cognitivas.

Presentaciones:

Adaptil calm Difusor + recambio 48 ml.
Adaptil calm recambio 48 ml.

FEROMONAS



ADAPTIL®

La opción natural que ayuda
a nuestros perros a lidiar
con situaciones de estrés



Ruidos fuertes



Solo en casa



Llanto nocturno
Adaptación
del cachorro



Adiestramiento



Viajes



Ansiedad por
separación

La terapia con feromonas es una solución natural que resuelve los problemas que causan estrés o conductas inadecuadas en perros y gatos.

Veterinarios especializados en comportamiento los recomiendan y usan en todo el mundo.





07. ALGIDOL DÚO

Analgésico – Condrotrófico.



COMPRIMIDO

Fórmula: Cada comprimido ranurado contiene: tramadol clorhidrato 75 mg, glucosamina sulfato sódica 425 mg, excipiente c.s.p.1250 mg.

Indicaciones: Tratamiento y prevención del dolor, tanto de tipo visceral como somático, y de moderado a severo, agudo o crónico. Alivio del dolor post quirúrgico.

Dosis: 1 comprimido cada 25 a 75 kg de peso (1 a 3 mg/kg de Tramadol Clorhidrato y 5,7-17 mg/kg de Glucosamina). Intervalo entre dosis: 8 a 12 horas.

Duración del tratamiento: Dependerá del tipo de dolor a tratar. Para tratamientos de osteoartritis se recomienda un mínimo de 10 semanas.

Presentación: Caja hospitalaria de 30 flow packs por 5 comprimidos.

→ La glucosamina actúa en problemas óseos y articulares.

→ Es una combinación del efecto antiinflamatorio suave de la Glucosamina y el efecto analgésico del Tramadol.



08. ALGIDOL INYECTABLE

Analgésico.



INYECTABLE

Fórmula: Tramadol clorhidrato 5%.

Indicaciones: Tratamiento y prevención del dolor, tanto de tipo visceral como somático, de moderado a severo, agudo o crónico. Alivio del dolor post quirúrgico en caninos y felinos.

Dosis: 0,20-0,60 ml cada 10 kg de peso (1 a 3 mg/kg de Tramadol clorhidrato con un máximo diario total de 10 mg/kg). Intervalo entre dosis: Cada 8 a 12 horas.

Duración del tratamiento: Dependerá del tipo de dolor a tratar.

Vía de administración: Inyectable subcutánea, intramuscular o endovenosa lenta.

Presentación: Frasco por 50 ml.

→ Analgésico opioide.

→ Uso en protocolos quirúrgicos.

ANALGÉSICOS Y ANESTÉSICOS



09. DIAZEPAM

Tranquilizante – Benzodiacepina.



Fórmula: Diazepam 0,5 %.

Indicaciones: Tranquilizante, ansiolítico, miorrelajante, anticonvulsivante y estimulante del apetito en felinos.

Dosis:

Como ansiolítico, tranquilizante, pre-anestésico y miorrelajante: Caninos: 1 ml cada 10 a 20 kg de peso (0,2-0,5 mg/kg). Felinos: 0,1 ml cada 2 a 10 kg de peso (0,05-0,2 mg/kg). Dosis única.

Como anticonvulsivante: **Caninos y Felinos:** 1 ml cada 5 a 10 kg de peso (0,5-1 mg/kg). Como estimulante del apetito: Felinos: 0,1 ml cada a 2,5 kg de peso (0,2 mg/kg) en dosis única.

Duración del tratamiento: Se puede repetir la aplicación 2 a 3 veces cada 6 a 8 horas por vía endovenosa en bolo, o bien administrando una infusión endovenosa constante a razón de 1-2 mg/kg/hora en perros y 0,5-1 mg/kg/hora en gatos.

Vía de administración: Endovenosa o intramuscular.

Presentación: Frasco por 20 y 50 ml.

→ Anticonvulsivante, miorrelajante.

→ Forma parte de protocolos.



10. EUTANÁSICO

Barbitúrico - Agente eutanásico.



Fórmula: Pentobarbital sódico 39%, difenilhidantoína 5%.

Indicaciones: Provocar una humanitaria, indolora y rápida eutanasia en caninos y felinos.

Dosis: Caninos: 1 ml cada 5 kg de peso. Felinos: 0,2 ml por kg de peso.

Vías de administración: Endovenosa o intracardiaca. La inyección intravenosa es la ruta preferible de administración. La inyección intracardiaca puede practicarse cuando la vía intravenosa es impracticable, como en animales muy pequeños, o animales comatosos con alteraciones vasculares. La dosis calculada debe ser aplicada en forma de bolo, en una sola aplicación.

Presentación: Frasco por 15 ml.



11. **XILAZINA**

Sedante - Analgésico - Anestésico - Relajante muscular.



INYECTABLE

Fórmula: Xilazina Clorhidrato 2%.

Indicaciones: Anestésico inyectable, pre-anestésico, sedante, miorelajante y analgésico.

Dosis:

Vía endovenosa: 0,5 ml cada 10 kg de peso (1 mg/kg). Vía intramuscular: 1 ml cada 10 kg de peso (2 mg/kg).

Vías de administración:

Endovenosa o intramuscular.

Presentación: Frasco por 20 ml.

→ **Preanestésico, analgésico, y sedante.**

→ **Forma parte de protocolos anestésicos en inducción y mantenimiento.**

→ **Tiene un reversor específico muy útil en algunas cirugías y procedimientos en general.**

ANALGÉSICOS Y ANESTÉSICOS



12. ATB LISTO

Antimicrobiano de amplio espectro – Larga acción.



INYECTABLE

Fórmula: Cada 100 ml contiene: Penicilina G procainica 15.000.000 UI, penicilina G benzatínica 15.000.000 UI, dihidroestreptomicina 14.208.000 UI.

Indicaciones: Tratamiento y prevención de procesos infecciosos producidos por microorganismos sensibles a la Penicilina G, Dihidroestreptomicina y/o su combinación.

Dosis: 1 ml cada 15 kg de peso (20.000 UI/kg de Penicilina G y 9.400 UI/kg de Dihidroestreptomicina por kilo de peso vivo).

Intervalo entre dosis: Cada 48 o 72 horas.

Vía de administración: Intramuscular profunda.

Presentación: Frasco por 100 ml.

→ 1 ml cada 15 kilos de peso.

→ Fácil resuspensión.

→ 50% más de penicilina.



13. CEFALONG

Antibiótico de amplio espectro.



COMPRIMIDO

Fórmula: Según la presentación: cefalexina monohidrato 500 mg o cefalexina monohidrato 1000 mg por comprimido.

Indicaciones: Tratamiento de infecciones de piel, tejidos blandos, osteoarticulares, gastrointestinales, otitis, vías respiratorias y genitourinarias.

Dosis: 1 comprimido de 500 mg cada 16-20 kg de peso o 1 comprimido de 1.000 mg cada 33-40 kg de peso (25 a 30 mg/ kg). Intervalo entre dosis: Cada 8-12 horas.

Duración del tratamiento: No menos de 7 días. En infecciones rebeldes (piel) puede suministrarse por un lapso mayor a 30 días.

Presentación: Caja hospitalaria de 30 flow packs.

→ Ideal para uso en dermatología.

ANTIBIÓTICOS BETA



14. CIPROPLUS GEL ÓTICO

Antimicrobiano – Antifúngico – Antiinflamatorio Analgésico.



TÓPICO

Fórmula: Ciprofloxacina (como clorhidrato) 0,8%, prednisolona 0,25%, ketoconazol 2%, lidocaína clorhidrato 2%.

Indicaciones: Tratamiento de otitis externas bacterianas, alérgicas o fúngicas. Analgésico.

Dosis: 0,5 ml en cada oído, aunque sólo uno sea el afectado. Intervalo entre dosis: Cada 24 horas.

Duración del tratamiento: Aplicar durante un mínimo de 7 días consecutivos.

Vía de administración: Tópica en el conducto auditivo externo.

Presentación: Jeringa por 10 ml.

→ Una fórmula completa con anestésico local, antiinflamatorio y antibiótico.

→ La Ciprofloxacina elimina las otitis producidas por *Pseudomonas*.

→ El Ketoconazol combate las otitis producidas por hongos.

→ La Lidocaína calma el dolor inmediatamente.



15. ENROPLUS COMPRIMIDOS

Antibiótico de amplio espectro – Quinolona.



COMPRIMIDO

Fórmula: Según la presentación: enrofloxacin 50 mg, enrofloxacin 100 mg y enrofloxacin 150 mg por comprimido.

Indicaciones: Tratamiento de infecciones severas, crónicas o rebeldes a otras medicaciones antibióticas, tales como piodertrias, infecciones recurrentes del tracto urogenital, otitis infecciosa e infecciones secundarias a procesos virales. No aplicar a animales en crecimiento, hembras en gestación ni lactantes.

Dosis: 1 comprimido de 50 mg cada 10 kilos de peso; 1 comprimido de 100 mg cada 20 kg de peso o 1 comprimido de 150 mg cada 30 kg de peso (5 mg /kg). Intervalo entre dosis: Cada 24 horas.

Duración del tratamiento: Administrar durante un mínimo de 7 días.

Presentación: Caja hospitalaria de 30 flow packs de 10 comprimidos por 50, 100 y 150 mg.

→ Antibiótico de amplio espectro para infecciones resistentes.

ANTIBIÓTICOS NO BETA

Erradicación inmediata de la **EHRlichia**



DOXIN



INYECTABLE



**Doxiciclina Hiclato 4,6%
- Uso intravenoso o intramuscular**

**¡Actúa primero!
Al inicio del tratamiento.**

**ÚNICO EN
EL MERCADO**

**Combinados optimizan
los resultados clínicos**

DOXIVIT

COMPRIMIDOS



**Doxiciclina - Vitamina B1 - Vitamina
B6 - Vitamina B12 - Ácido Fólico.**



**¡Actúa después!
Al inicio o continuidad del
tratamiento ambulatorio.**





16. ENROPLUS INYECTABLE

Antimicrobiano de amplio espectro – Quinolona.



INYECTABLE

Fórmula: Enrofloxacin 5%.

Indicaciones: Tratamiento de infecciones provocadas por bacterias Gram (+), Gram (-) y Mycoplasmas. No administrar en animales en crecimiento, hembras preñadas ni lactantes.

Dosis:

Todas las especies: 1 ml cada 10 kg de peso (5 mg/kg).

Intervalo entre dosis: Cada 24 horas. Duración del tratamiento: 3 a 5 días.

Vías de administración: Subcutánea o intramuscular.

Presentación: Frasco por 100 ml.

→ **Antibiótico amplio espectro.**

→ **Infecciones respiratorias, urinarias.**

→ **Dosis cada 24 hs.**



17. DOXIN

Antibiótico.



INYECTABLE

Fórmula: Doxiciclina hiclato 4,6%.

Indicaciones: Tratamiento de la ehrlichiosis canina.

Tratamiento de la ehrlichiosis canina; de infecciones anemizantes causadas por mycoplasmas; de rickettsiosis; y de infecciones bacterianas mixtas causadas por organismos sensibles a la doxiciclina, tales como infecciones del tracto respiratorio, enteritis, infecciones urinarias. Especialmente útil en pacientes incapaces de tolerar la administración oral de doxiciclina.

Dosis: Uso general para infecciones: 0,75 a 1,25 ml cada 10 kg de peso, equivalente a 3 - 5 mg/kg de Doxiciclina, cada 12 hs. En infecciones agudas por Ehrlichia canis: 1,25 ml cada 10 kg de peso, equivalente a 5 mg/kg cada 12 hs, o 2,5 ml cada 10 kg de peso, equivalente a 10 mg/kg, cada 24 horas. En infecciones crónicas por Ehrlichia canis: 2,5 ml cada 10 kg de peso, equivalente a 10 mg/kg, cada 24 hs.

Duración del tratamiento: Uso general para infecciones: 7 a 14 días. En infecciones agudas por Ehrlichia canis: 14 a 16 días. En infecciones crónicas por Ehrlichia canis: 30 a 42 días.

Vía de administración: Endovenosa lenta o intramuscular.

Presentación: Frasco por 50 ml.

→ **Única doxiciclina inyectable del mercado.**

→ **Alta eficacia en tratamiento de Ehrlichiosis aguda.**

ANTIBIÓTICOS NO BETA



18. DOXIVIT

Antibiótico – Vitamínico.

   **COMPRIMIDO**

Fórmula: Comprimidos de 500 mg: doxiciclina 100 mg, tiamina clorhidrato 5 mg, piridoxina clorhidrato 1 mg, cianocobalamina 5 µg, ácido fólico 5 mg. Comprimidos de 1000 mg: doxiciclina 200 mg, tiamina clorhidrato 10 mg, piridoxina clorhidrato 2 mg, cianocobalamina 10 µg, ácido fólico 10 mg.

Indicaciones: Tratamiento de infecciones de las vías respiratorias, incluyendo rinitis, amigdalitis, bronconeumonía y enfermedad respiratoria felina. Infecciones anemizantes por Micoplasmas. Tratamiento de la infección por Ehrlichia canis en gatos y perros. Doxivit incorpora vitaminas, que favorecen la recuperación clínica del animal.

Dosis: Comprimido 500 mg: 1 comprimido cada 10 kg de peso. Comprimido 1000 mg: 1 comprimido cada 20 kg de peso. Esto equivale a: 10 mg/kg de Doxiciclina, 0,5 mg/kg de Tiamina clorhidrato, 0,1 mg/kg de Piridoxina clorhidrato, 0,5 µg/kg de Cianocobalamina y 0,5 mg/kg de Ácido fólico.

Intervalo entre dosis: 24 horas. Administrar durante 7 a 14 días. Tratamiento de Ehrlichia canis: En caninos: Infecciones agudas: 14 a 16 días. Infecciones crónicas: 30 a 42 días. En felinos: 21 días. Tratamiento para Micoplasmas anemizantes: 14 días.

Presentación: Doxivit 200 mg: Caja con 12 flow packs por 5 comprimidos. Doxivit 100 mg: Caja con 12 flow packs por 10 comprimidos.

→ Único con Vitaminas del grupo B.

→ Antibiótico de elección para el tratamiento de la Ehrlichiosis.



19. ZIFLOR CREMA CICATRIZANTE

Antimicrobiano – Antiinflamatorio Antialérgico – Anestésico.

   **TÓPICO U OFTALMOLÓGICA**

Fórmula: Florfenicol 1,5%, difenhidramina clorhidrato 1%, lidocaína clorhidrato 0,5%, bencidamina clorhidrato 0,2%, cloruro de benzalconio 1%.

Indicaciones: Tratamiento de patologías oculares, prevención y curación de lesiones de piel. Indicado en queratoconjuntivitis, queratitis, conjuntivitis y blefaritis, escoriaciones, heridas de piel traumáticas o quirúrgicas.

Dosis: Aplicar una pequeña cantidad de gel en el saco conjuntival o en la zona a tratar y extender suave y uniformemente.

Duración del tratamiento e intervalo entre dosis: Según criterio del Profesional Veterinario.

Vías de administración: Tópica u oftalmológica.

Presentación: Pomo por 15 g.

→ Completa fórmula con antibiótico, anestésico local y antiinflamatorio no esteroide.

→ Recomendado para lesiones de piel (dermatitis).

→ Ideal para queratoconjuntivitis.

→ Único producto del mercado para usar dentro del ojo y en la piel.



20. DUOSECRETINA

Colerético – Colagogo – Hipersecretor.



COMPRIMIDO

Fórmula: Menbutona 70 mg, ácido tióctico 5 mg.

Indicaciones: Anorexias, insuficiencia hepática o pancreática, intoxicaciones. No utilizar en animales con patologías cardíacas, hipertermia, obstrucción de vías biliares. No utilizar en gatos.

Dosis: 1 comprimido cada 7-10 kg de peso (7 - 10 mg/kg de Menbutona y 0,5-0,7 mg/kg de Ácido Tióctico). Intervalo entre dosis: Cada 12 a 24 horas.

Duración del tratamiento: 3 a 5 días.

Presentación: Caja hospitalaria de 12 flow packs por 10 comprimidos.

→ La Menbutona aumenta la calidad, cantidad y secreción de Bilis hacia el intestino delgado, y actúa en cólicos hepáticos, estomacales e intestinales.

→ El Ácido Tióctico es un potente protector hepático.

→ Estimula la función del tracto gastrointestinal.



21. ENTERO RELAX DUO

Analgésico – Espasmolítico.



INYECTABLE

Fórmula: Hioscina Butilbromuro 0,4%, Flunixin Meglumine 2,2%.

Indicaciones: Control de la diarrea en caninos, en particular cuando el dolor o malestar abdominal está presente. Control del dolor asociado con la obstrucción urinaria.

Dosis: 1 ml cada 20 kg de peso (0,2 mg/kg de Hioscina Butilbromuro y 1,1 mg/kg de Flunixin Meglumine). Intervalo entre dosis: Cada 24 horas.

Duración del tratamiento: 1 a 3 días.

Vías de administración: Intravenosa o intramuscular.

Presentación: Frasco por 50 ml.

ANTIDIARREICOS - DIGESTIVOS



22. FULL HEPAT

Complemento dietario – Colagogo y colerético.

  **COMPRIMIDO**

Fórmula: Presentación de 50 mg: Cada comprimido contiene: ácido ursodesoxicólico 50 mg, silimarina 50 mg, excipientes c.s.p.1 comprimido. Presentación de 100 mg: Cada comprimido contiene: ácido ursodesoxicólico 100 mg, silimarina 100 mg, excipientes c.s.p.1 comprimido.

Indicaciones: Indicado en casos en donde sea necesario mejorar la digestión de alimentos, principalmente aquellos ricos en grasas. Favorece la funcionalidad hepática protegiendo la integridad del hepatocito mediante propiedades antioxidantes. En casos donde la funcionalidad hepática se encuentre comprometida, indigestiones, animales obesos, animales que presentan alteraciones en los parámetros bioquímicos del metabolismo de las grasas.

Dosis: Felinos: Medio comprimido hasta 5 kg de peso por día. Caninos: 1 comprimido cada 10 kg de peso por día. Durante la ingesta de alimentos.

Presentación: Caja premium de 50 mg con 30 comprimidos. Caja premium de 100 mg con 50 comprimidos.

→ **Patologías hepáticas profundas.**

→ **Alteración de enzimas hepáticas.**

→ **Patologías biliares.**



23. ALGICAM PETS INYECTABLE

Antiinflamatorio – Analgésico.



Fórmula: Meloxicam 0,5%.

Indicación: Alivio de la inflamación y el dolor en trastornos músculo-esqueléticos agudos y crónicos. Tratamiento y prevención del dolor postquirúrgico. Uso en caninos y felinos.

Dosis: La dosis inicial es de 0,2 mg/kg, continuándose el tratamiento con dosis de 0,1 mg/kg cada 24 hs. Comenzar administrando 0,20 ml cada 5 kg de peso vivo, el primer día. Luego continuar con 0,10 ml cada 5 kg de peso vivo. En caso de prevención del dolor post-quirúrgico, se recomienda administrar 45 a 60 minutos antes de la intervención.

Presentación: Frascos por 50 ml.

→ Apto para tratamientos prolongados.

→ Excelente tolerancia.

→ Alta tolerancia antiinflamatoria y analgésica.

→ Menor efecto tóxico.



24. CARPRODOL

Antiinflamatorio – Analgésico.



Fórmula: Cada comprimido contiene: carprofeno 75 mg o carprofeno 100 mg.

Indicaciones: Tratamiento del dolor y de la inflamación asociados a patologías osteoarticulares. Prevención y tratamiento del dolor post quirúrgico. Uso en caninos.

Dosis y vía de administración: Administrar por vía oral según peso del animal. Comprimidos de 75 mg. 1 c/ 17 kg de peso por día. Comprimidos de 100 mg. 1 c/ 23 kg de peso por día. Estas posologías aportan aproximadamente 4,4 mg/kg de carprofeno por toma. Se recomiendan: Para tratamiento de afecciones osteo-articulares: 14 días. Dolor post-quirúrgico: 3 a 4 días, prevención del dolor post-quirúrgico: Administrar 2 horas antes de la cirugía y continuar luego durante 3 o 4 días o según criterio profesional.

Presentación: Caja Premium conteniendo blísters con 21 comprimidos.

→ En dos presentaciones para mejor dosificación.

→ Acción prolongada.

ANTIINFLAMATORIOS



25. **DEXA 21- VET**

Antiinflamatorio esteroide -Antialérgico.



INYECTABLE

Fórmula: Dexametasona Fosfato Sódico 0,2%.

Indicaciones: Manifestaciones alérgicas o inflamatorias de diversa índole.

Dosis: Caninos y felinos: 0,5 a 10 ml c/10 kg de peso (0,1 a 2 mg/kg).

Intervalo entre dosis: Cada 24 horas. En casos de shock: 11 a 22 ml cada 10 kilos de peso (2,2 a 4,4 mg/kg) por vía endovenosa.

Vías de administración:

Intramuscular, subcutáneo o endovenoso.

Presentación: Frasco por 100 ml, pack de 5 frascos por 20 ml y pack de 25 frascos por 10 ml.



26. **PREDNOVET**

Antiinflamatorio esteroide.



COMPRIMIDO

Fórmula: Cada comprimido de 100 mg contiene: prednisolona 20 mg.

Indicaciones: Dermopatías alérgicas. Artropatías no sépticas. Otros estados inflamatorios no infecciosos e hipersensibilidad. Tratamiento de enfermedades inmunomediadas y deficiencia de corticoides endógenos.

Dosis: Como antipruriginoso: Caninos y felinos: 1 comprimido cada 10 a 20 kg de peso (1 a 2 mg/kg). Intervalo entre dosis: Cada 12 o 24 horas.

Duración del tratamiento: 3 a 5 días. En tratamientos prolongados (de mantenimiento): 1 comprimido cada 10 a 20 kg de peso (1 a 2 mg/kg). Intervalo entre dosis: Cada 48 horas. Disminuir gradualmente la dosis cada 7 a 10 días hasta lograr mantenimiento con el mínimo posible.

Presentación: Caja hospitalaria de 30 flow packs por 10 comprimidos.

→ Excelente para el tratamiento a días alternos.

→ Sabor a pollo.



27. **TRIAVET**

Antiinflamatorio esteroide inyectable de depósito.



INYECTABLE

Fórmula: Acetónido de Triamcinolona 0,6%.

Indicaciones: Afecciones cutáneas, prurito, eczemas, urticaria. Afecciones osteomusculares. Afecciones oculares en caninos, felinos.

Dosis: Caninos y felinos: 0,15 - 0,3 ml cada 10 kg de peso (0,1 a 0,2 mg/kg), en dosis única. **Aplicación intraarticular:** 1-3 mg totales en dosis única.

Duración del tratamiento: Tratamiento único. En caso necesario se puede repetir la dosis a los 15 días.

Vías de administración:

Intramuscular, subcutáneo, intraarticular o intrasinoval.

Presentación:

Frasco por 20 ml.

→ Corticoide de depósito, 15 días de efecto.

ANTIINFLAMATORIOS

ANTIMICÓTICO SISTÉMICO

ITRACONAZOL

Facilidad de administración y dosificación.
Único apto para el tratamiento por pulsos.

Único,
moderno y
altamente
eficaz



SUSPENSIÓN ORAL Itraconazol 1%
COMPRESIDOS Itraconazol 100mg



28. ITRACONAZOL SUSPENSIÓN ORAL

Antimicótico sistémico.



ORAL

Fórmula: Itraconazol 1%.

Indicaciones: Antimicótico.

Dosis: 1 ml por cada 1 ó 2 kilos de peso (equivalente a 5 ó 10 mg/kg).

Intervalo entre dosis y duración del tratamiento:

Tratamiento por pulsos: Cada 24 horas dos días consecutivos, suspender por 5 días y repetir el tratamiento durante no menos de 4 semanas o hasta la remisión del cuadro.

Tratamiento diario (micosis sistémicas): Cada 24 hs, 1 ml cada 2 kg de peso durante no menos de 4 semanas, o hasta la remisión del cuadro.

Presentación: Frasco por 15 ml.

→ Único en el mercado argentino.

→ Único apto para el tratamiento por pulsos.



29. ITRACONAZOL ZOOVET

Antimicótico para micosis sistémicas.



COMPRIMIDO

Fórmula: Cada comprimido ranurado contiene: itraconazol 100 mg.

Indicaciones: Tratamiento de infecciones causadas por hongos que afectan pulmones, uñas, boca, garganta, etc. Tiñas causadas por dermatofitos. Micosis sistémicas, superficiales y profundas. Como profiláctico en pacientes inmunodeprimidos. No utilizar en hembras en gestación o lactancia ni en pacientes con insuficiencia hepática.

Dosis: 1 comprimido cada 10 a 20 kg de peso (5 a 10 mg/kg).

Intervalo entre dosis y duración del tratamiento:

Tratamiento por pulsos: Cada 24 horas dos días consecutivos, suspender por 5 días y repetir el tratamiento durante no menos de 4 semanas o hasta la remisión del cuadro.

Tratamiento diario (micosis sistémicas): cada 24 hs., 1 comprimido cada 20 kg de peso (5 mg/kg), durante no menos de 4 semanas o hasta la remisión del cuadro.

Presentación: Caja premium por 10 comprimidos y caja hospitalaria de 12 flow packs por 10 comprimidos.

→ Único en el mercado argentino.

→ Único apto para el tratamiento por pulsos.

ANTIMICÓTICOS



**ACCIÓN
INMEDIATA**



**ACCIÓN
PULGUICIDA**



**EFFECTO
AMBIENTAL**



**LARGA
DURACIÓN**



Palatable 



2 a 4 kg

4 a 9 kg

9 a 18 kg

18 a 36 kg

36 a 70 kg

Spinosad 27% + Lufenurón 10%

Spinomax Dúo

Comprimido Antipulgas



30. SPINOMAX DÚO COMPRIMIDOS

Antiparasitario externo comprimidos.



Fórmula: Spinosad 27%, lufenurón 10%.

Indicaciones: Pulguicida. Combina la rápida acción adulticida del Spinosad con la actividad del Lufenurón sobre el ciclo ambiental de la pulga.

Dosis: Caninos: 1 o 2 comprimidos juntos por animal, según peso. Intervalo entre dosis: 30 días.

Duración del tratamiento: Se recomienda administrar desde 1 mes antes del período de mayor actividad de las pulgas y continuar mensualmente hasta el final de la temporada de pulgas.

Presentación: Cajas individuales según kilaje (Caninos de 2 a 4 kg; de 4 a 9 kg; de 9 a 18 kg; de 18 a 36 kg y de 36 a 70 kg).

→ Elimina las pulgas durante 30 días.

→ Efecto ambiental.

→ Efecto antimiásico por 30 días.

→ Antimiásico curativo y preventivo.

ANTIPARASITARIOS EXTERNOS COMPRIMIDOS



31. TRATAMIENTO INTEGRAL CANINO

Antiparasitario externo – Sistémico - comprimido + pipeta.

 **COMPRIMIDO + PIPETA**

Fórmula: Presentación de 4 a 9 kg contiene 1 comprimido de 115 mg de lufenurón + 1 pipeta de 1,50 ml con fluazurón, imidacloprid, permetrina.

Presentación de 9 a 24 kg: 2 comp. de 115 mg de Lufenurón + 1 pipeta de 4 ml con fluazurón, imidacloprid, permetrina.

Presentación de 24 a 40 kg: 2 comp. de 400 mg de Lufenurón + 1 pipeta de 6,70 ml con fluazurón, imidacloprid, permetrina.

Presentación de 40 a 60 kg: 2 comp. de 400 mg de Lufenurón + 1 pipeta de 10 ml con fluazurón, imidacloprid, permetrina.

Indicaciones: Pulgicida y garrapaticida. Repelente de moscas y mosquitos.

Vía de administración: Aplicar una pipeta (vía tópica) y conjuntamente se administran 1 o 2 comprimidos (vía oral) de acuerdo al peso de cada animal. Intervalo entre dosis: Cada 30 días.

Presentación: Cajas individuales con pipeta y comprimido/s, según corresponda por kilaje.

→ Único en el mercado.

→ Gran efecto repelente de moscas y mosquitos.

ANTIPARASITARIOS EXTERNOS COMPRIMIDOS + PIPETAS



32. P.I. PIPETA IMIDACLOPRID

Insecticida – Pulguicida – Piojicida



TÓPICO SPOT ON

Fórmula: Imidacloprid 10%.

Indicaciones: Pulguicida para perros y gatos.

Dosis: 1 pipeta por animal, según peso. Intervalo entre dosis: 21 días.

Vía de administración: Tópica en forma spot on.

Presentación: Caja premium con 1 pipeta de 0,48 ml (pequeños) o 1 pipeta de 0,96 ml (grandes) según corresponda.

→ Excelente relación costo-beneficio-calidad.

→ Gran efecto repelente de moscas, mosquitos, flebótomos.



33. P.I.P. PLUS

Antiparasitario externo – Sistémico



TÓPICO SPOT ON

Fórmula: Imidacloprid 8%, permetrina 30%.

Indicaciones: Pulguicida y garrapaticida, para caninos. Repelente de moscas y mosquitos.

Dosis: 1 pipeta por animal, según peso. Intervalo entre dosis: Una dosis protege durante 21 días para el control de garrapatas y 30 días para el control de pulgas.

Vía de administración: Tópica en forma spot on.

Presentación: Cajas premium (según kilaje) con 1 pipeta de 0,48 ml o 1,2 ml o 3 ml o 4,8 ml o 7,2 ml.

→ Excelente relación costo-beneficio-calidad.

→ Gran efecto repelente de moscas, mosquitos, flebótomos.

ANTIPARASITARIOS EXTERNOS PIPETAS



34. PETS PROTECTOR SPOT ON

Antiparasitario externo

 TÓPICO SPOT ON

Fórmula: Fipronil 10%, metopreno 10%.

Indicaciones: Antiparasitario externo. Para el control y tratamiento de infestaciones por pulgas y garrapatas en perros y gatos.

Dosis: Una pipeta por animal según el peso. Intervalo entre dosis: 1 aplicación cada 28 días.

Vía de administración: Tópica en forma de spot on.

Presentación: Pack por 10 cajas individuales de pipetas, según kilaje (Caninos: de 2 a 5 kg; de 5 a 10 kg; de 10 a 20 kg; de 20 a 40 kg y de 40 a 60 kg. Felinos: Hasta 4 kg).

→ La fórmula más completa.

→ Actúa en el ciclo parasitario y en el ciclo ambiental de los ectoparásitos.

→ Animales entre 2 y 70 kg.

35. PETS PROTECTOR SPRAY

Antiparasitario externo

 TÓPICO ROCIADOR

Fórmula: Fipronil 0,25%, metopreno 0,25%.

Indicaciones: Antiparasitario externo, pulgucida, garrapaticida para perros y gatos adultos y cachorros. Para el control y tratamiento de infestaciones por formas adultas e inmaduras de Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis y Rhipicephalus sanguineus, controlando la reinfestación durante 7 semanas para pulgas y 4 semanas para garrapatas.

Dosis y vía de administración: Uso externo. De 3 a 6 ml (7 a 15 mg) / kg, equivalente a 3 gatilladas por kg de peso. Esta válvula provee de 1,6 ml por cada descarga. Rociar la totalidad del cuerpo del animal, (incluso orejas, abdomen, axilas, dedos). Abrir el pelo, procurando que el producto haga contacto con la piel.

Presentación: Frasco por 100 y 250 ml.

→ Gran poder de volteo.

→ Especial para combatir infestaciones agudas.

→ Cómodo dosificador.

ANTIPARASITARIOS EXTERNOS PIPETAS Y SPRAY



36.

ROCHY CURABICHERAS CREMA

Antiparasitario externo – Curabicheras Antimicrobiano.



TÓPICO

Fórmula: Fipronil 0,25 g, clorhexidina acetato 0,50 g. Vehículo con aceite de pino y pasta de aluminio c.s.p. 100 g.

Indicaciones: Tratamiento de miasis en los animales domésticos. Evita la contaminación bacteriana secundaria gracias a su actividad antiséptica.

Dosis: Aplicar el producto en cantidad suficiente como para cubrir la herida o bichera y aproximadamente 5 cm alrededor de la misma.

Intervalo entre dosis y duración del tratamiento:

En tratamiento: repetir cada 24 hs hasta la eliminación del total de los parásitos y cicatrización de la herida. En prevención: se puede aplicar en dosis única, o repetir cada 24 hs hasta la cicatrización de la herida (recomendable en épocas estivales).

Presentación: Pomo de 15 g.

→ **Excelentes resultados para el tratamiento de la mosca de la punta de la oreja en perros y gatos.**



37.

ROCHY CURABICHERAS AEROSOL

Antiparasitario externo – Curabicheras Antimicrobiano.



TÓPICO AEROSOL

Fórmula: Cada aerosol de 267 g contiene: fipronil 1,372 g, clorhexidina acetato 0,17 g. Vehículo con citronella, pasta de aluminio y propelente.

Indicaciones: Prevención y el tratamiento de miasis en los animales domésticos. Posee acción residual y evita las reinfestaciones y contaminación bacteriana secundaria gracias a su actividad antiséptica.

Dosis e intervalo entre dosis, duración del tratamiento:

Aplicar el producto desde una distancia de 10 cm en cantidad suficiente como para cubrir uniformemente la herida o bichera y aproximadamente 5 cm alrededor de la misma.

Intervalo entre dosis: En tratamiento: Repetir cada 24 horas hasta la eliminación del total de los parásitos y cicatrización de la herida. En prevención: Se puede aplicar en dosis única o repetir cada 24 hs, hasta la cicatrización de la herida (recomendable en épocas estivales).

Presentación: Aerosol por 267 g.

→ **Apto para uso en felinos.**

→ **Fórmula única con citronela (repelente).**

→ **El fipronil asegura una larga duración.**

→ **Uso post quirúrgico.**

ANTIPARASITARIOS EXTERNOS CURABICHERAS



38.

ECTOCAN

Antiparasitario externo – Piretroide Organofosforado.



TÓPICO

Fórmula: Clorpirifós 3,5%, cipermetrina 0,5%.

Indicaciones: Indicado para el control de pulgas y garrapatas en caninos.

Dosis: Para el control de parásitos sobre el animal: Preparar una dilución en agua, a razón de 10 ml de Ectocan, por cada 500 ml de agua. Para el control de parásitos en el ambiente: Preparar una dilución en agua, a razón de 10 ml de Ectocan, por cada 1.000 ml de agua. Con esta solución moje los pisos y paredes de los caniles, "cuchas" y otros ambientes en los que habite el perro.

Presentación: Exhibidora de 12 frascos por 100 ml.

→ Ideal para el control ambiental de ectoparásitos.

→ El tratamiento ambiental (95% de las pulgas) complementa los tratamientos sobre el animal (5% de las pulgas) con pipetas y/o comprimidos.

Línea de Antiparasitarios Externos

PETS PROTECTOR MAX

efecto ambiental



Garrapaticida – Pulguicida

GATOS

hasta 4 kg



Clase II - Producto moderadamente peligroso - NOCIVO



Clase II - Producto moderadamente peligroso - NOCIVO

PERROS

2 a 5kg

5 a 10kg

10 a 20kg

20 a 40kg

40 a 60kg

SPOT ON y SPRAY



39. ALBEX

Antiparasitario interno de amplio espectro.



Fórmula: Cada comprimido de 650 mg contiene: albendazol 500 mg, praziquantel 50 mg y saborizante.

Indicaciones: Tratamiento de parasitosis internas producidas por nematodos y cestodos. No administrar en hembras en el primer mes de preñez.

Dosis: 1 comprimido cada 10 kg de peso (50 mg/kg de Albendazol y 5 mg/kg de Praziquantel). Intervalo entre dosis: Cada 24 horas.

Duración del tratamiento: Caninos: 2 días consecutivos. Repetir a los 15 días de igual forma. Felinos: 2 días consecutivos. En caso de trichuriasis administrar durante 3 a 5 días.

Presentación: Caja hospitalaria de 30 flow packs por 10 comprimidos.

→ **Amplio espectro parasitario.**

→ **Alta actividad en tenias.**

→ **Especial para animales grandes, criaderos y camadas numerosas.**



40. TRIVERMEX COMPRIMIDOS

Antiparasitario interno de amplio espectro.



Fórmula: Presentación para 20 kg: cada comprimido contiene: fenbendazol 250 mg, pamoato de pirantel 25 mg, praziquantel 25 mg. Presentación para 40 kg y 60 kg: cada comprimido contiene: praziquantel 50 mg, fenbendazol 500 mg, pamoato de pirantel 50 mg.

Indicaciones: Parasitosis internas producidas por nematodos gastrointestinales y cestodos.

Dosis: Presentación para 20 kg: 1 comprimido cada 5 kg de peso. Presentación para 40 kg y 60 kg: 1 comprimido cada 10 kg de peso.

Duración del tratamiento: Una única toma. En trichuriasis: Una toma cada 24 horas durante 3 días.

Presentación: Cajas premium: 20 kg (4 comprimidos), 40 kg (4 comprimidos) y 60 kg (6 comprimidos). Caja hospitalaria por 12 flow packs de 40 kg (4 comprimidos) y 60 kg (6 comprimidos).

→ **Tratamiento de nemátodos y cestodos gastrointestinales.**

→ **Disponible en una presentación para cada necesidad.**



41. TRIVERMEX SUSPENSIÓN

Antiparasitario interno de amplio espectro.



 ORAL

Fórmula: Fenbendazol 5%, pamoato de pirantel 1,45% y praziquantel 0,5%.

Indicaciones: Parasitosis internas producidas por nematodos y cestodos gastrointestinales. No usar en hembras en primer tercio de gestación.

Dosis: 1 ml cada 1 kg de peso (50 mg/kg de Fenbendazol, 14,5 mg/kg de Pirantel Pamoato y 5 mg/kg de Praziquantel).

Duración del tratamiento: Una toma única. En cachorros repetir a los 14 o 21 días.

Presentación: Frasco por 15 ml y frasco multidosis por 100 ml.

→ **Con Praziquantel.**

→ **La presentación de 100 ml es ideal para uso en desparasitaciones en el consultorio.**

→ **Se puede utilizar en perros y gatos de 20 días.**

→ **Disponible en una presentación para cada necesidad.**

ANTIPARASITARIOS INTERNOS

Eficacia
comprobada
en una sola
toma



TRIVERMEX

Fenbendazol - Pirantel Pamoato - Praziquantel

Antiparasitario interno de amplio espectro



42. BUCAL VET

Enjuague bucal para perros y gatos.



Fórmula: Xylitol 0,5%, clorhexidina digluconato (al 20%) 0,01%.

Indicaciones: Enjuague bucal para adiconar al agua de bebida o aplicación directa facilitando la higiene oral diaria.

Dosis: Gatos: 2,5 ml en 1/4 litro de agua de bebida. Perros hasta 10 kg: 5 ml en 1/2 litro de agua de bebida. Perros 10-25 kg: 10 ml en 1 litro de agua de bebida. Perros más de 25 kg: 15 ml en 1,5 litros de agua de bebida. Una cucharada sopera contiene 10 ml. Renovar cada 24 horas. Opcionalmente se puede rociar en la cavidad bucal.

Presentación: Exhibidora de 10 frascos por 100 ml y exhibidora de 6 frascos por 250 ml.

→ Único con dos drogas y 2 presentaciones.

→ Se adapta a todas las necesidades.

→ Uso preventivo y curativo.



43. SHAMPOO CON CLORHEXIDINA

Shampoo belleza – Hipoalergénico con clorhexidina.



Fórmula: Clorhexidina digluconato (al 20%) 8%.

Indicaciones: Tratamiento y prevención de dermatitis seborreicas, complicadas o no con infección bacteriana secundaria.

Dosis: 30 ml de shampoo para un perro de tamaño mediano. Intervalo entre dosis y duración del tratamiento: El intervalo es variable, dependiendo de la gravedad de la patología y respuesta al tratamiento. Se recomienda un intervalo inicial de 3 días, espaciando luego los tratamientos de acuerdo con la mejoría observada y criterio del profesional veterinario actuante.

Presentación: Frasco por 350 ml.

→ Favorece la restauración de la piel dañada, reduce el prurito y la inflamación.



44. **SHAMPOO AP**

Antiparasitario externo.



Fórmula: Cipermetrina 0,2%, butóxido de piperonilo 0,2%.
Indicaciones: Higiene de la piel y pelo. Pulguicida, piojicida y garrapaticida para caninos.
Dosis: 30 ml de shampoo para un perro de tamaño mediano.
Presentación: Pomo por 250 ml (pack por 6 unidades), frasco por 350 ml.

→ Para lograr un efectivo control de las pulgas tratar también el ambiente donde habitan las mascotas.



45. **SHAMPOO BELLEZA**



Fórmula: Lauril sulfato de sodio (70%) 7,8%, betaina cocoamida 3%.
Indicaciones: Shampoo hipoalergénico de belleza para la higiene de la piel y pelo de perros y gatos.
Dosis y forma de uso: 30 ml de shampoo para un perro de tamaño mediano y 5 a 10 ml de shampoo para un gato adulto.
Presentación: Frasco por 350 ml y bidón por 5 litros.



46. SINCELAR COMPRIMIDOS

Anticonceptivo



COMPRIMIDO

Fórmula: Cada comprimido de 100 mg contiene: Clormadinona Acetato 2 mg.

Indicaciones: Interrupción del estro. Posponer el estro, metrorragias, ninfomanías, alteraciones del ciclo ovárico, pseudogestación, hipersexualidad en el macho (en caninos). No utilizar en hembras preñadas, animales sexualmente inmaduros ni caninos con malformaciones genitales o tumores hormonodependientes.

Dosis: Posponer el estro: 1 comprimido cada 10 kilos de peso (0,2 mg/kg) cada 24 horas durante 4 semanas. Supresión del estro: 1 comprimido cada 5 kilos de peso (0,1 mg/kg) cada 24 horas durante 8 - 10 días.

Vías de administración: Oral.

Presentación:

Caja hospitalaria de 40 flow packs por 10 comprimidos.

→ Para suprimir o posponer el celo y alteraciones del ciclo ovárico.



47. SINCELAR INYECTABLE

Anticonceptivo inyectable



INYECTABLE

Fórmula: Medroxiprogesterona Acetato 5%.

Indicaciones: Prevención del estro en caninos y felinos (hembras) en anestro.

Dosis: Caninos pequeños/medianos y felinos (hembras): 1 ml (50 mg) dosis total y única. Caninos grandes (de más de 30 kg de peso): 1,5 ml (75 mg) dosis total y única. Repetir cada 5 - 6 meses.

Vías de administración: Subcutánea.

Presentación:

Caja de 10 ampollas por 1 ml o 1,5 ml y frasco multidosis por 10 ml.

→ Prevención de la gestación, anticonceptivo inyectable de aplicación semestral.

→ Envase multidosis, ideal para el uso en consultorios.

HORMONALES

Innovación en salud - bienestar animal - biodiversidad +

Palatable

T.I.U.

Comprimidos
Estríol 1 mg



TRATAMIENTO PARA LA INCONTINENCIA URINARIA



48. T.I.U.

Tratamiento para la Incontinencia Urinaria.



COMPRIMIDO

Formula: Cada comprimido contiene: estril 1 mg.

Indicaciones: Para el tratamiento y prevención de las incontinencias urinarias en perras de origen hormono privas.

Dosis: Se aconseja comenzar administrando 1 comprimido diario (1 mg de estril) durante 7 días. En caso de que el tratamiento sea efectivo, reducir la dosis hasta un mínimo de medio comprimido diario (0,5 mg de estril) durante una semana y evaluar la respuesta clínica. En caso de que el tratamiento inicial no sea efectivo, incrementar la dosis hasta un máximo de 2 comprimidos diarios (2 mg de estril) durante 7 días y evaluar respuesta clínica. En ambos casos, la dosis efectiva para el paciente debe ser la más baja posible. La dosis mínima no debe ser menor a 0,5 mg de estril por día.

Duración del tratamiento: Se recomienda un mínimo de 15 días.

Presentación: Caja premium conteniendo 3 blísters por 10 comprimidos.

→ **Indicado para tratamientos prolongados.**

HORMONALES



49. ARTROVET

Antiartrosico regenerador de cartilago.



Fórmula: Cada comprimido contiene: condroitín sulfato 200 mg, saborizante y excipientes c.s.p. 500 mg.

Indicaciones: Tratamiento de procesos degenerativos articulares en general. Coadyuvante en la reparación de ligamentos y tendones, fracturas óseas y cartilaginosas. Prevención y tratamiento de la displasia de cadera.

Dosis: Caninos y felinos: Hasta 15 kilos de peso: 1 comprimido diario (200 mg de condroitín sulfato). Entre 15 y 30 kilos de peso: 2 comprimidos juntos (400 mg de condroitín sulfato). Más de 30 kilos de peso: 3 comprimidos juntos (600 mg de condroitín sulfato). Intervalo entre dosis: Cada 24 horas.

Duración del tratamiento: Según la patología a tratar y grado de alteración.

Presentación: Caja hospitalaria de 9 flow packs por 10 comprimidos.

→ **Indicado en perros y gatos gerontes.**



50. ARTROVET PLUS

Condroprotector.



Fórmula:

Glucosamina sulfato 500 mg, sulfato de manganeso 10 mg, excipiente palatable c.s.p. 1000 mg.

Indicaciones: Tratamiento de artritis, artrosis, artropatías degenerativas, condropatías y tendinitis. Ayuda en la prevención de la displasia de cadera en cachorros de razas grande cada 30 kg de peso. Curativa: 1,5 a 2 comprimidos por post cirugía osteoarticular.

Dosis: Caninos: 1 comprimido cada 15 kg de peso. Felinos: 1/4 comprimido cada 5 kg de peso. Intervalo entre dosis: Cada 24 horas.

Duración del tratamiento: Depende del grado de artrosis, intensidad de los factores condicionantes de la artrosis secundaria y a la capacidad individual de respuesta.

Presentación: Caja hospitalaria de 30 flow pack por 5 comprimidos.

→ **La fórmula más completa.**

→ **Palatable.**

→ **Preventivo de artropatías en razas predisuestas.**

SUPLEMENTOS MINERALIZANTES



51. TOTAL VET COMPRIMIDOS

Complejo condromineral con vitaminas y aminoácidos.



Contiene: Vitaminas: A, D3, E, B1, B2, B6, B12, B15, D, pantenol (B5), nicotinamida (B3), ácido fólico. Minerales: manganeso, zinc, hierro, cobre, magnesio, cobalto, calcio, selenio; potasio, fósforo. Condroprotectores: glucosamina sulfato; condroitín sulfato. Aminoácidos: DL metionina, L lisina, citrato de colina.

Indicaciones: Tratamiento y prevención de osteoartropatías. Coadyuvante en procesos inflamatorios de las articulaciones, además de corregir las deficiencias vitamínicas, minerales y de aminoácidos, tanto durante el crecimiento como en animales adultos.

Dosis: Preventiva: 1 comprimido pequeño cada 10 kg de peso o 1 comprimido mediano cada 20 kg de peso o 1 comprimido o 1 comprimido mediano cada 20 kg de peso o 1 comprimido animal (según peso).

Presentación: 30 f. por 10 comp. (CHICO), 8 comp. (MEDIANO), 5 comp. (GRANDE).

→ **Fórmula única con 11 minerales, 11 vitaminas, 2 condroprotectores y 3 aminoácidos.**

→ **Se recomienda su uso en animales gerontes y convalecientes.**

→ **Con condroitín sulfato y Glucosamina.**

→ **Recomendado para hembras en lactancia y/o en recuperación post destete.**



52. VITA PLUS

Complemento dietario.



Fórmula: Aceite con alto contenido de ácidos grasos omega 3, ginseng, ginkgo biloba, adenosín trifosfato, arándano, tiamina clorhidrato, piridoxina clorhidrato, cianocobalamina, ácido fólico, selenito de sodio, zinc gluconato y vitamina E.

Dosis y vía de administración: Administrar por vía oral la cantidad de comprimidos necesarios según el peso del animal. Iniciar con administraciones cada 24 horas durante 30 días. Luego continuar cada 48 horas durante 15 días adicionales. Como mantenimiento se sugiere la administración cada 72 a 96 hs. Comprimidos chicos: 1 cada 10 kg de peso. Comprimidos medianos: 1 cada 20 kg de peso. Comprimidos grandes: 1 cada 30 kg de peso.

Presentación: Caja premium: Chicos (20 comprimidos de 500 mg en 2 blísters), medianos (20 comprimidos de 1000 mg en 4 blísters) y grandes (21 comprimidos de 2000 mg en 7 blísters).

→ **El ginseng estimula el metabolismo de los animales gerontes y el Ginkgo Biloba favorece la circulación cerebral.**

→ **El mejor tratamiento para perros gerontes.**

→ **Contiene ATP que genera un shock de energía celular.**

→ **Perros gerontes, shock energético, antioxidante, estimulante general.**

SUPLEMENTOS MINERALIZANTES

podcast

Sintonía Veterinaria ▶

Dirigidos a veterinarios y aquellos interesados en conocer en profundidad nuestros productos destacados para animales de compañía y las patologías a las que aplican.



Escúchalos
AQUÍ



Juntos más allá de la Salud Animal



ceva.com.ar
zoovet.com.ar



adaptil.com.ar
feliway.com.ar