VADEMÉCUM 2022

zoovet®

GRANDES ANIMALES

LARGE ANIMALS CATALOG

Nuestra empresa

Un larga historia en el mercado veterinario

ESP

En *Zoovet* tenemos como misión, brindar el mejor servicio y ofrecer productos de calidad, agregando valor a través del asesoramiento comercial de nuestros representantes, asumiendo el compromiso de jerarquizar la labor del Médico Veterinario como profesional de la sanidad.

Our company

A long story in the veterinary market

ENG

At Zoovet our mission is to provide the best service and producing quality products, adding value through commercial advice that our representatives provide, assuming the commitment to prioritize the work of the Veterinarian as a professional of health.

Antifúngicos / Antifungals

Ioduro zoovet 07
Iodide zoovet

Antibióticos - Quimioterápicos clásicos y combinados / Antibiotics - classic & combined chemotherapeutics

Actinomicina 09
Amoxivet 10
ATB 5 11
ATB fenac 12
ATB listo / ATB ready 13
ATB PRO 11 millones 14
ATB PRO 11 millions
Broncomicina 15
Cefafur inyectable Zoovet 16
Cefafur injectable Zoovet
Cefafur secado / Cefafur drying 17
Cefafur Mastitis Aguda 18
Cefafur Acute Mastitis
Cefafur 75-K 19
Cefavet 20
Cefatenol MV 21
Cloxampi M.A. 22
Cloxasec 23
Di-Oxi-Forte 24
Enroplus I 25
Enroplus oral 26
Floxa Max 10% 27
Idocarb 12 28
Linco 300 29
Linco MAS 30
MAS D3 31
MAS P3 intramamaria 32
MAS P3 intramammary
Multipen inyectable 33
Multipen injectable
Neumoxina 34
Oxifenac L.A. 35
Oxisol 36
Oxisol L.A. Zoovet 37
Parenteril inyectable 38
Parenteril injectable
Prexican 39
Sulfaderm aerosol 40
Sulfaderm spray
Sulfavet 41
T.B.O. Zoovet 42
TDF 35 43
Tilmicovet 44
Tilmicofull dúo inyectable 45
Tilmicofull duo injectable
Tilmicofull 46
Ziflor fenac 47
Ziflor crema cicatrizante 48
Ziflor healing cream
Ziflor mucolítico oral 49
Ziflor oral mucolytic

Antiparasitarios internos
Internal antiparasitics

Diclazuril aves zoovet 51
Diclazuril poultry zoovet
Hematomidium 52
Triclazol dúo 53
Triclazol duo
Vermex inyectable 54
Vermex injectable
Vermex-L 55
Vermex oral 3,8% 56
Vermex oral 3.8%
Vermex oral 10% 57
Zuricox suspensión 58
Zuricox suspension

Antiparasitarios externos
External antiparasitics

Delta 50 60
Ecto 2 A Plus 61
Ecto-2 Pour on Zoovet 62
Ecto-thion 63
Ecto tak 64
Rochy curabicheras aerosol 65
Rochy spray
Rochy curabicheras crema 66
Rochy cream
Rochy curabicheras pasta 67
Rochy paste
Rochy curabicheras líquido 68
Rochy liquid
Rochy curabicheras polvo 69
Rochy powder

Anestésicos - Tranquilizantes Analgésicos / Anesthetics - Tranquilizers Analgsics

Algidol inyectable 71
Algidol injectable
Eutanásico zoovet 72
Euthanasic zoovet
Plano 3 / Plane 3 73
Xilazina zoovet / Xylazine zoovet 74

Antidiarreicos - Hipersecretores
Antidiarrheals - Hypersecretors

Duosecretina inyectable 76
Duosecretina injectable

Enteroplus cápsulas 77
Enteroplus capsules

Enteroplus jarabe 78
Enteroplus syrup

Entero Relax Dúo 79
Entero Relax Duo

Methionil inyectable 80
Methionil injectable

Antiinflamatorios - Antipiréticos Analgésicos / Anti-inflammatories Antipyretics - Analgesics

Algicam 82

Algimine zoovet 83

Algitocina 84

Dexa 21-Vet 85

Duo-Dexa-Fenac 86

Edemax 87

Triavet 88

Endectocidas / Endectocides

DRM 1% 90

Endection 3,15% 91
Endection 3.15%

Endectomicin ADE 4% 92

Injection I 93

Ivermex jga 94

Ivermex plus 95

Vaquero Pour-On 96

Hormonales / Hormonals

Aplicador Pro-Ciclar P4 Zoovet 98
Pro-ciclar P4 Zoovet applicator

Benzoato de estradiol zoovet 99
Zoovet estradiol benzoate

Benzoato zoovet 0,65% 100
Benzoate zoovet 0.65%

Buserelina zoovet 101

Ciclar 102

Cipionato zoovet 103
Cypionate zoovet

Contractina zoovet 104

CUT 5 105

Diprogest 600/1200 106
Procigest 600/1200

Foli-Rec líquido 107
Foli-Rec liquid

Kit Diprogest 1200 leche - 50 dosis 108
Kit diprogest 1200 milk - 50 doses

Kit J-Synch Diprogest 600 109

Kit J-Synch Pro-Ciclar 750 110

Kit Reproductivo Diprogest 600 - 50 dosis 111
Reproductive Kit Diprogest 600 - 50 doses

Kit Reproductivo 50 dosis 112
Zoovet Reproductive Kit 50 doses

Pro-ciclar P4 zoovet 113

Progesterona zoovet 2,85% 114
Progesterone zoovet 2.85%

Mineralizantes / Mineralizers

Bifos-D 116

Cuzinc 117

Electrolac 118

Kit sinergia engorde 119
Kit sinergy fattening

Kit sinergia lactancia 120
Kit sinergy lactation

Kit sinergia recría 121
Kit sinergy rearing

Lipovit 122

Magnezinc plus 123

Oleovet ADE inyectable 124
Oleovet ADE injectable

Once (7+4) con selenio 125
Once (7+4) with selenium

Policalcio B12 zoovet 126
Polycalcium B12 zoovet

Powermin ADE 127

Selevit energy 128

Total-vet 129

V.C.C. 130

● *Antisépticos y otros*
Antiseptics and others

A4 zoovet	132
Antiverrugas	133
Hemoshock	134

● *Sólo expotación* / *Only for export*

Amoxivet dúo / *Amoxivet duo*	136
Cobremas	137
Endection ADE oleoso *Endection ADE oily*	138
Gentaten	139
Oxisol Plus Zoovet	140
Plano 3 MAX / *Plane 3 MAX*	141
Ractonabol	142
Selevit zoovet ADE	143
Vitanabol AD$_3$E engorde *Vitanabol AD$_3$E fattening*	144
Zeramectina 3,5% *Zeramectina 3.5%*	145
Zilpaterol zoovet	146

zoovet

ESP

IODURO *ZOOVET*

Quimioterápico - Antimicótico

Fórmula: Ioduro de sodio al 60%.

Indicaciones: Tratamiento de fibrosis y/o granulomas de etiología diversa (Actinomicosis, Actinobacilosis y Post-traumáticos) para bovinos.

Dosis: 12 ml cada 100 kg de peso (70 mg/kg). Intervalo entre dosis: Cada 7-10 días, pudiendo variar según gravedad del caso y/o criterio profesional. Duración del tratamiento: Se recomiendan de 1 a 3 tratamientos.

Vía de administración: Endovenosa.

Presentación: Frasco por 50 ml.

ENG

IODIDE *ZOOVET*

Chemotherapeutic - Antimycotic

Formula: *Sodium Iodide 60%.*

Indications: *Treatment of fibrosis, and/or granuloma of diverse etiology (Actinomycosis, Actinobacillosis and post-traumatic) in cattle.*

Dosage: *12 ml every 100 kg bw (70 mg/kg). Interval between doses: Every 7 to 10 days; it can vary according to the severity and/or professional criterion. Treatment duration: 1 to 3 treatments are recommended.*

Administration: *Intravenous.*

Presentation: *50 ml vial.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

Only available for Argentina and countries without registration

ESP

ACTINOMICINA

Antibiótico - Aminoglucósido inyectable

Fórmula: Estreptomicina Sulfato 25%.

Indicaciones: Tratamiento y prevención de infecciones producidas por microorganismos sensibles a la estreptomicina. Útil en: Actinobacilosis, leptospirosis, campilobacteriosis, shigelosis de los potrillos, disentería hemorrágica del cerdo, etc.

Dosis: 1 ml cada 25 kg de peso (10 mg/kg). Intervalo entre dosis: Cada 12 a 24 horas según criterio del profesional actuante. Duración del tratamiento: Realizar un mínimo de 3 dosis, no más de 3 días.
Para tratamientos específicos o complejos: Ver envase del producto.

Vías de administración: Intramuscular, subcutánea o tópica (en lavajes).

Presentación:
Frasco por 40 ml.

ENG

ACTINOMICINA

Antibiotic - Injectable aminoglycoside

Formula: *Streptomycin Sulfate 25%.*

Indications: *Treatment and prevention of infections caused by microorganisms sensitive to streptomycin. For example: Actinobacillosis, leptospirosis, campylobacteriosis, colt shigella, swine bleeding disentery, etc.*

Dosage: *1 ml every 25 kg bw (10 mg/kg). Interval between doses: Every 12 to 24 hours according to the acting professional criterion. Treatment duration: Administer at least 3 doses, no more than 3 days.*
For specific or complicated treatments: See product package.

Administration: *Intramuscular, subcutaneous or topical (in lavages).*

Presentation: *40 ml vial.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

ESP

AMOXIVET

Antibiótico inyectable - Betalactámico
Larga acción

Fórmula: Amoxicilina 15%.

Indicaciones: Tratamiento de las enfermedades infecciosas de las vías respiratorias, urogenitales, tracto digestivo, de la piel y tejidos blandos y de todas las enfermedades producidas por microorganismos sensibles a la Amoxicilina. Prevención de infecciones post operatorias.

Dosis: Todas las especies: 1 ml cada 10 kg de peso (15 mg/kg). Intervalo entre dosis: Cada 48 horas. Duración del tratamiento: 3 a 5 días.

Vía de administración: Intramuscular.

Restricciones: Pre ordeño: 48 horas.

Presentación: Frasco por 100 ml.

ENG

AMOXIVET

Injectable antibiotic - Beta Lactam
Long acting

Formula: *Amoxicillin 15%.*

Indications: *Treatment of infectious diseases of the respiratory, urogenital, and gastrointestinal tract, skin and soft tissue and all diseases caused by microorganisms sensitive to Amoxicillin. Prevention of post-surgical infections.*

Dosage: *All species: 1 ml every 10 kg bw (15 mg/kg). Interval between doses: Every 48 hours. Treatment duration: 3 to 5 days.*

Administration: *Intramuscular.*

Restrictions: *Pre-milking: 48 hours.*

Presentation: *100 ml vial.*

SUSPENSIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SUSPENSION

✓ ***De fácil disolución y permite la utilización de agujas finas***

✓ *Easy dissolution, it allows the use of thin needles.*

ESP

ATB 5

Antimicrobiano de amplio espectro

Fórmula: Penicilina G Sódica 2.500.000 UI, Penicilina G Benzatínica 2.500.000 UI, Estreptomicina 2 g, Excipientes c.s.p. 20 ml.

Indicaciones: Combate infecciones mixtas causadas por bacterias Gram (+), aerobias y anaerobias y Gram (-).

Dosis: Bovinos, porcinos y ovinos: 1 ml cada 25 kg de peso (10.000 UI/kg de Penicilina G Sódica y Benzatínica y 4 mg/kg de Estreptomicina Sulfato). Intervalo entre dosis: Cada 48 o 72 horas.

Vía de administración: Intramuscular profunda.

Presentación: Caja individual con 2 frascos (polvo y diluyente) y caja hospitalaria con 12 cajas individuales.

ENG

ATB 5

Broad spectrum antimicrobial

Formula: *Penicillin G Sodium 2,500,000 IU, Penicillin G Benzathine 2,500,000 IU, Streptomycin 2 g, Excipients q.s. 20 ml.*

Indications: *It attacks mixed infections caused by Gram (+) bacteria, aerobic and anaerobic and Gram (-) bacteria.*

Dosage: *Cattle, swine and sheep: 1 ml every 25 kg bw (10,000 IU/kg of Penicillin G Sodium and Benzathine, 4 mg/kg of Streptomycin Sulfate). Interval between doses: Every 48 or 72 hours.*

Administration: *Deep intramuscular.*

Presentation: *Individual box with 2 vials (powder and diluent) and presentation in bulk containing 12 individual boxes.*

POLVO PARA RECONSTITUIR
POWDER TO RECONSTITUTE

ESP

ATB FENAC

Antimicrobiano - Antiinflamatorio
Para reconstituir

Fórmula: Cada frasco con polvo contiene: Penicilina G Benzatínica 2.500.000 UI, Penicilina G Sódica 2.500.000 UI y Estreptomicina 2 g.
Cada frasco con diluyente contiene: Diclofenac 1,25 g, Agua c.s.p. 20 ml.

Indicaciones: Combatir infecciones mixtas causadas por bacterias Gram (+), aerobias y anaerobias, y Gram (-). Potente agente antiinflamatorio y analgésico.

Dosis: 1 ml cada 25 kg de peso (10.000 UI/kg de Penicilina; 4 mg/kg de Estreptomicina y 2,5 mg/kg de Diclofenac). Intervalo entre dosis: Cada 24 horas. Duración del tratamiento: 3 días.

Vía de administración: Intramuscular profunda.

Presentación: Caja individual con 2 frascos (polvo y diluyente) y caja hospitalaria con 12 cajas individuales.

ENG

ATB FENAC

Antimicrobial - Anti inflammatory
To reconstitute

Formula: *Every vial with powder contains: Penicillin G Benzathine 2,500,000 IU, Penicillin G Sodium 2,500,000 IU, and Streptomycin 2 g. Every vial with diluent contains: Diclofenac 1.25 g, Water q.s. 20 ml.*

Indications: *To attack mixed infections caused by Gram (+) bacteria, aerobic and anaerobic and Gram (-) bacteria. Powerful anti-inflammatory and analgesic agent.*

Dosage: *1 ml every 25 kg bw (10,000 IU/kg of Penicillin; 4 mg/kg of Streptomycin, and 2.5 mg/kg of Diclofenac). Interval between doses: Every 24 hours. Treatment duration: 3 days.*

Administration: *Deep intramuscular.*

Presentation: *Individual box with 2 vials (powder and diluent) and presentation in bulk containing 12 individual boxes.*

I+D
R&D

POLVO PARA RECONSTITUIR
POWDER TO RECONSTITUTE

- ✓ ***Único penicilínico con diclofenac***
- ✓ *The only penicillin with diclofenac*

ESP

ATB LISTO

Antimicrobiano de amplio espectro
Larga acción

Fórmula: Cada 100 ml contiene:
Penicilina G procaínica 15.000.000 UI, Penicilina G benzatínica 15.000.000 UI, Dihidroestreptomicina 14.208.000 UI.

Indicaciones: Tratamiento y prevención de procesos infecciosos producidos por microorganismos sensibles a la Penicilina G, Dihidroestreptomicina y/o su combinación.

Dosis: 1 ml cada 15 kg de peso (20.000 UI/kg de Penicilina G y 9.400 UI/kg de Dihidroestreptomicina). Intervalo entre dosis: Cada 48 o 72 horas. Duración del tratamiento: 2 a 3 aplicaciones según patología.

Vía de administración: Intramuscular profunda.

Presentación: Frasco por 100 ml.

ENG

ATB READY

Broad spectrum and long acting antimicrobial

Formula: *Every 100 ml contains:*
Penicillin G Procaine 15,000,000 IU, Penicillin G Benzathine 15,000,000 IU, Dihydrostreptomycin 14,208,000 IU.

Indications: *Treatment and prevention of infectious processes caused by microorganisms sensitive to Penicillin G, Dihydrostreptomycin and/or their combination.*

Dosage: *1 ml every 15 kg bw (20,000 IU/kg of Penicillin G and 9,400 IU/kg of Dihydrostreptomycin). Interval between doses: Every 48 or 72 hours. Treatment duration: 2 to 3 applications according to pathology.*

Administration: *Deep intramuscular.*

Presentation: *100 ml vial.*

SUSPENSIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SUSPENSION

- ✓ ***1 ml cada 15 kilos***
- ✓ ***Fácil disolución***
- ✓ ***50% más de penicilina que la competencia***
- ✓ ***Repetir cada 48 horas***
- ✓ *1ml every 15 kg*
- ✓ *Easy dissolution*
- ✓ *50% more of penicillin than others*
- ✓ *Repeat every 48 hours*

ESP

ATB PRO 11 MILLONES

Antimicrobiano - Antibiótico - Betalactámico

Fórmula: Cada frasco con polvo contiene: Penicilina G procaínica 11.000.000 UI.
Cada frasco con diluyente contiene: Agua para inyectable c.s.p. 45 ml.

Indicaciones: Antibiótico bactericida. Tratamiento de infecciones producidas por microorganismos sensibles a la Penicilina, tales como neumonías y bronconeumonías, carbunclo bacteriano, infecciones del tracto urinario, leptospirosis, infecciones uterinas, pietín, tétanos, mastitis, castración, descole, actinomicosis, infecciones de piel, etc.

Dosis: 1 ml cada 37 kg de peso. Intervalo entre dosis: Cada 24 horas. Duración del tratamiento: 3 días consecutivos.

Vía de administración: Intramuscular profunda.

Restricciones: Pre ordeño: 72 horas.

Presentación: Caja individual con 2 frascos (polvo y diluyente).

ENG

ATB PRO 11 MILLIONS

Antimicrobial - Antibiotic - Beta lactam

Formula: *Every powder vial contains: Penicillin G Procaine 11,000,000 IU.*
Every diluent vial contains: Water for injection q.s. 45 ml.

Indications: *Bactericidal antibiotic. Treatment of infections produced by microorganisms sensitive to Penicillin, such as pneumonias, bronchopneumonia, bacterial anthrax, urinary tract infections, leptospirosis, uterine infections, foot rot, tetanus, mastitis, castration, tail-docking, actinomycosis, skin infections, etc.*

Dosage: *1 ml every 37 kg bw. Interval between doses: Every 24 hours. Treatment duration: 3 consecutive days.*

Administration: *Deep intramuscular.*

Restrictions: *Pre-milking: 72 hours.*

Presentation: *Individual box with 2 vials (powder and diluent).*

I+D
R&D

POLVO PARA RECONSTITUIR
POWDER TO RECONSTITUTE

- ✓ ***Ideal para mastitis parenquimatosas.***
- ✓ *Ideal for parenchymatous mastitis.*

ESP

BRONCOMICINA

Antibiótico - Antiinflamatorio - Antipirético
Mucolítico

Fórmula: Tilmicosina 30%; Flunixin Meglumine 6,6%; Bromhexina Clorhidrato 1%.

Indicaciones: Tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas producidas por microorganismos sensibles a la Tilmicosina.

Dosis: Patologías respiratorias: 1 ml cada 30 kg de peso (10 mg/kg de Tilmicosina, 2,2 mg/kg de Flunixin Meglumine, 0,35 mg/kg de Bromhexina Clorhidrato). Se recomienda continuar luego con la administración de Flunixin Meglumine durante 3 a 5 días o hasta remisión de la signología. Queratoconjuntivitis y pododermatitis infecciosa (pietín): 1 ml cada 60 kg de peso (5 mg/kg de Tilmicosina, 1,1 mg/kg de Flunixin Meglumine). Duración del tratamiento: Dosis única.

Vía de administración: Subcutánea.

Presentación: Frasco por 100 y 250 ml.

ENG

BRONCOMICINA

Antibiotic - Anti inflammatory - Antipyretic
Mucolytic

Formula: *Tilmicosin 30%; Flunixin Meglumine 6.6%; Bromhexine Hydrochloride 1%.*

Indications: *Treatment and prevention of infections caused by microorganisms sensitive to Tilmicosin.*

Dosage: *Respiratory pathologies: 1 ml every 30 kg bw (10 mg/kg of Tilmicosin, 2.2 mg/kg of Flunixin Meglumine, 0.35 mg/kg of Bromhexine Hydrochloride). We suggest to continue this treatment with the administration of Flunixin Meglumine for 3 to 5 days or until symptoms remission. Keratoconjunctivitis, and infectious foot rot: 1 ml every 60 kg bw (5 mg/kg of Tilmicosin, 1.1 mg/kg of Flunixin Meglumine). Treatment duration: Single dose.*

Administration: *Subcutaneous.*

Presentation: *100 and 250 ml vial.*

I+D
R&D

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

- ✓ ***Ideal para prevención y tratamiento de procesos respiratorios***
- ✓ ***Único en su tipo***
- ✓ ***Tres activos que se potencian***

- ✓ *Ideal for prevention and treatment of respiratory diseases*
- ✓ *One of a kind*
- ✓ *Every active enhance each other*

ESP

CEFAFUR INYECTABLE *ZOOVET*

Antimicrobiano - Antibiótico - Betalactámico

Fórmula: Ceftiofur Clorhidrato 5 %.

Indicaciones: Tratamiento de procesos infecciosos causados por gérmenes sensibles al Ceftiofur, principalmente neumonías, fiebre del embarque, pietín y endometritis.

Dosis: Bovinos: 1 ml cada 22 a 45 kg de peso (1,1 a 2,2 mg/kg). Porcinos: 1 ml cada 10 a 17 kg de peso (2,9 a 5,0 mg/kg). Intervalo entre dosis: Cada 24 horas. Duración del tratamiento: 3 días consecutivos.

Vía de administración: Intramuscular profunda.

Restricciones: Pre faena: 2 días. Pre ordeño: 0 horas.

Presentación: Frasco por 100 y 250 ml.

ENG

CEFAFUR INJECTABLE *ZOOVET*

Antimicrobial - Antibiotic - Beta lactam

Formula: *Ceftiofur Hydrochloride 5 %.*

Indications: *Treatment of infectious processes caused by germs sensitive to Ceftiofur, mainly pneumonias, shipping fever, foot rot and endometritis.*

Dosage: *Cattle: 1 ml every 22 to 45 kg bw (1.1 to 2.2 mg/kg) Swine: 1 ml every 10 to 17 kg bw (2.9 to 5.0 mg/kg). Interval between doses: Every 24 hours. Treatment duration: 3 consecutive days.*

Administration: *Deep intramuscular.*

Restrictions: *Pre-slaughter: 2 days. Pre-milking: 0 hours.*

Presentation: *100 and 250 ml vial.*

SUSPENSIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SUSPENSION

- ✓ ***Retiro en leche ¡0 horas!***
- ✓ ***Fácil aplicación gracias a su rápida resuspensión***
- ✓ *Withdrawal in milk, 0 hours!*
- ✓ *Easy dosing thanks to its fast resuspension!*

ESP

***CEFAFUR** SECADO*

Antibiótico intramamario

Fórmula: Cada inyector de 5 g contiene: Cefalexina Monohidrato: 300 mg; Ceftiofur Clorhidrato: 200 mg.

Indicaciones: Prevención y tratamiento de mastitis en bovinos, producidas durante el período de vaca seca por microorganismos sensibles a la Cefalexina, Ceftiofur o su combinación.

Dosis: Aplicar una jeringa por cuarto mamario en dosis única.

Vía de administración: Intramamaria.

Restricciones: Pre ordeño: 0 horas, siempre que el parto se produzca como mínimo 30 días (periodo de secado) después de la aplicación del producto.

Presentación: Caja individual con 36 inyectores. Contenedor plástico con 180 inyectores.

ENG

***CEFAFUR** DRYING*

Intramammary antibiotic

***Formula:** Each 5 g syringe contains: Cephalexin Monohydrate: 300 mg; Ceftiofur Hydrochloride: 200 mg.*

***Indications:** Prevention and treatment of mastitis during the dry-off period, in cattle, produced by microorganisms sensitive to Cephalexin, Ceftiofur or their combination.*

***Dosage:** Apply one syringe in each mammary quarter, in a single dose.*

***Administration:** Intramammary.*

***Restrictions:** Pre-milking: 0 hour, as long as the calving is at least 30 days (dry-off) after the product application.*

***Presentation:** Individual box with 36 syringes. Plastic container with 180 syringes.*

I+D
R&D

APLICACIÓN INTRAMAMARIA
INTRAMAMMARY APPLICATION

- ✓ ***Fórmula única para un eficaz secado***
- ✓ *Unique formulation for an effective drying*

ESP

CEFAFUR MASTITIS AGUDA

Antibiótico antiinflamatorio intramamario

Fórmula: Cada inyector de 5 g contiene: Cefalexina Monohidrato 100 mg; Ceftiofur Clorhidrato 100 mg; Prednisolona 5 mg.

Indicaciones: Tratamiento de mastitis producidas por microorganismos sensibles a la Cefalexina, Ceftiofur o su combinación, durante la lactancia en bovinos.

Dosis: Aplicar una jeringa por cuarto mamario. Intervalo entre dosis: Cada 12 o 24 horas. Duración del tratamiento: Se recomienda un mínimo de 2 dosis.

Vía de administración: Intramamaria.

Restricciones: Pre ordeño: 48 horas.

Presentación: Caja con 36 inyectores individuales y contenedor plástico con 180 inyectores.

Exportación: Caja con 12 inyectores individuales.

ENG

CEFAFUR ACUTE MASTITIS

Intramammary anti inflammatory antibiotic

Formula: *Each 5 g syringe contains: Cephalexin Monohydrate 100 mg; Ceftiofur Hydrochloride 100 mg; Prednisolone 5 mg.*

Indications: *For treatment of mastitis caused by microorganisms sensitive to Cephalexin, Ceftio-fur or their combination, during lactation in cattle.*

Dosage: *Apply one syringe per mammary quarter. Interval between doses: Every 12 or 24 hours. Treatment duration: At least 2 administrations are recommended.*

Administration: *Intramammary.*

Restrictions: *Pre-milking: 48 hours.*

Presentation: *Box with 36 individual syringes and plastic container with 180 syringes.*

For export: Box with 12 individual syringes.

I+D
R&D

APLICACIÓN INTRAMAMARIA
INTRAMAMMARY APPLICATION

- ✓ ***¡Sólo 48 horas de retiro en leche!***
- ✓ ***Antibiótico con prednisolona combinado***
- ✓ *Only 48 hours pre-milking withdrawal!*
- ✓ *Antibiotic in combination with prednisolone*

ESP

CEFAFUR 75-K

Antimicrobiano - Antibiótico antiinflamatorio

Fórmula: Ceftiofur Clorhidrato 7,5 %; Ketoprofeno 10%.

Indicaciones: Tratamiento de procesos infecciosos causados por gérmenes sensibles al Ceftiofur, procesos inflamatorios asociados a hipertermia y/o dolor, principalmente neumonías, fiebre del embarque, pietín y endometritis.

Dosis: Bovinos: 1 ml cada 33 a 66 kg de peso (1,1 - 2,2 mg/kg de Ceftiofur Clorhidrato). Porcinos: 1 ml cada 25 kg de peso (3 mg/kg de Ceftiofur Clorhidrato). Intervalo entre dosis: Cada 24 horas. Duración del tratamiento: 3 días consecutivos.

Vía de administración: Intramuscular profunda.

Restricciones: Pre ordeño: 0 horas.

Presentación: Frasco por 100 y 250 ml.

ENG

CEFAFUR 75-K

Antimicrobial - Anti inflammatory antibiotic

Formula: *Ceftiofur Hydrochloride 7.5 %; Ketoprofen 10%.*

Indications: *Treatment of infectious processes caused by germs sensitive to Ceftiofur, inflammatory processes associated with hyperthermia and/or pain, mainly pneumonias, shipping fever, foot rot and endometritis.*

Dosage: *Cattle: 1 ml every 33 to 66 kg bw (1.1 to 2.2 mg/kg of Ceftiofur Hydrochloride). Swine: 1 ml every 25 kg bw (3 mg/kg of Ceftiofur Hydrochloride). Interval between doses: Every 24 hours. Treatment duration: 3 consecutive days.*

Administration: *Deep intramuscular.*

Restrictions: *Pre-milking: 0 hours.*

Presentation: *100 and 250 ml vials.*

SUSPENSIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SUSPENSION

- ✓ ***50% más de activo por mililitro***
- ✓ ***Efecto potenciado por sus 2 activos***
- ✓ ***De elección en tambo***
- ✓ *50% more active ingredients per milliliter*
- ✓ *Enhanced effect due to its two actives*
- ✓ *Of choice in dairy farms*

ESP

CEFAVET

Cefalosporina inyectable de amplio espectro

Fórmula: Cefalexina Monohidrato 20%, excipiente oleoso.

Indicaciones: Antimicrobiano bactericida para el tratamiento y control de afecciones causadas por gérmenes sensibles a la Cefalexina.

Dosis: Bovinos y equinos: 1 ml cada 25 kg de peso (8 mg/kg). Porcinos: 1 ml cada 20 kg de peso (10 mg/kg). Intervalo entre dosis: Cada 24 horas. Duración del tratamiento: Se recomienda un mínimo de 5 días.

Vía de administración: Intramuscular o subcutánea.

Restricciones: Pre faena: 4 días.
Pre ordeño: 0 horas.

Presentación: Frasco por 100 ml.

Exportación: Frasco por 250 ml.

ENG

CEFAVET

Broad spectrum injectable cephalosporin

Formula: *Cephalexin Monohydrate 20%, oily excipient.*

Indications: *Antimicrobial and bactericide for treatment and control of diseases caused by germs sensitive to Cephalexin.*

Dosage: *Cattle and horses: 1 ml every 25 kg bw (8 mg/kg). Swine: 1 ml every 20 kg bw (10 mg/kg). Interval between doses: Every 24 hours. Treatment duration: At least 5 applications are recommended.*

Administration: *Intramuscular or subcutaneous.*

Restrictions: *Pre-slaughter: 4 days. Pre-milking: 0 hour.*

Presentation: *100 ml vial.*

For export: 250 ml vial.

SUSPENSIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SUSPENSION

- ✓ ***Fácil disolución***
- ✓ ***Permite la utilización de agujas finas***
- ✓ ***Retiro en leche ¡cero horas!***
- ✓ *Easy dissolution*
- ✓ *It allows the use of thin needles*
- ✓ *Pre-milking withdrawal, 0 days!*

ESP

CEFATENOL MV

Antibiótico de amplio espectro - Hormonal

Fórmula: Frasco A: D+Cloprostenol Sódico 0,0003%. Frasco B: Ceftiofur Sódico 600 mg.

Indicaciones: Producto especialmente diseñado para el tratamiento de las metritis y endometritis de las hembras bovinas.

Dosis: Bovinos: Intrauterina: 25 ml por animal de la solución reconstituida (0,075 mg de D+Cloprostenol Sódico y 300 mg de Ceftiofur Sódico). Intramuscular: 50 ml por animal de la solución reconstituida (0,15 mg de D+Cloprostenol Sódico y 600 mg de Ceftiofur Sódico). Intervalo entre dosis: Cada 24 horas. Duración del tratamiento: 3 días consecutivos o según criterio del médico veterinario.

Vías de administración: Intramuscular o intrauterina.

Restricciones: Pre ordeño: 0 horas.

Presentación: Caja con: Frasco A: 50 ml de solución. Frasco B: 600mg de polvo para reconstituir.

ENG

CEFATENOL MV

Broad spectrum antibiotic - Hormone

Formula: *A vial: D+Cloprostenol Sodium 0.0003%. B vial: Ceftiofur Sodium 600 mg.*

Indications: *Product specially designed for the treatment of metritis and endometritis of cattle.*

Dosage: *Intrauterine: 25 ml per animal of the reconstituted solution (0.075 mg of D+Cloprostenol Sodium and 300 mg of Ceftiofur Sodium). Intramuscular: 50 ml per animal of the reconstituted solution (0.15 mg of D+Cloprostenol Sodium and 600 mg of Ceftiofur Sodium). Interval between doses: Every 24 hours. Treatment duration: 3 consecutive days or according to acting veterinarian criterion.*

Administration: *Intramuscular or intrauterine.*

Restrictions: *Pre-milking: 0 hours.*

Presentation: *Box with: A vial with 50 ml of solution and B vial with 600 mg powder for reconstitution.*

I+D
R&D

POLVO PARA RECONSTITUIR
POWDER FOR RECONSTITUTION

- ✓ ***Aplicación multivía ¡doble acción!***
- ✓ ***Retiro en leche ¡cero horas!***
- ✓ ***Increíble acción terapéutica en endometritis***
- ✓ *Multi-route administration, double action!*
- ✓ *Pre-milking withdrawal, 0 hours!*
- ✓ *Incredible therapeutic action in endometritis*

ESP

CLOXAMPI M.A.

Antibiótico intramamario para mastitis aguda

Fórmula: Cada inyector de 4,5 g contiene: Cloxacilina Sódica 200 mg, Ampicilina Sódica 75 mg, excipientes en base a gel de rápida difusión.

Indicaciones: Suspensión antibiótica intramamaria para el tratamiento de mastitis aguda en bovinos.

Dosis: Aplicar un inyector por cuarto afectado. Intervalo entre dosis: Cada 12 horas. Duración del tratamiento: 3 días.

Vía de administración: Intramamario.

Restricciones: Pre ordeño: 48 horas.

Presentación: Caja de 36 jeringas y contenedor plástico con 180 jeringas.

ENG

CLOXAMPI M.A.

Intramammary antibiotic for acute mastitis

Formula: *Each 4.5 g syringe contains: Cloxacilin Sodium 200 mg, Ampicillin Sodium 75 mg, excipients as a fast diffusion gel.*

Indications: *Intramammary antibiotic suspension for the treatment of acute mastitis in cattle.*

Dosage: *Administer one syringe per affected quarter. Interval between doses: Every 12 hours. Treatment duration: 3 days.*

Administration: *Intramammary.*

Restrictions: *Pre-milking: 48 hours.*

Presentation: *Box containing 36 syringes and plastic container with 180 syringes.*

APLICACIÓN INTRAMAMARIA
INTRAMAMMARY APPLICATION

Only available for Argentina and countries without registration

✓ ***Retiro en leche ¡sólo 48 horas!***
✓ *Pre-milking withdrawal, only 48 hours!*

ESP

CLOXASEC

Antibiótico intramamario para secado

Fórmula: Cada inyector de 4,5 g contiene: Cloxacilina Benzatínica 500 mg, Ampicilina Trihidrato 255 mg en suspensión de biodisponibilidad prolongada.

Indicaciones: Suspensión antibiótica intramamaria para la prevención y el tratamiento de la mastitis bovina subclínica durante el período de secado.

Dosis: Dosis única. Aplicar un inyector por cada cuarto mamario, luego del último ordeñe previo al período de secado.

Restricciones: Pre ordeño: 72 horas, siempre que el parto se produzca como mínimo 30 días (período de secado) después de la aplicación del producto.

Presentación: Caja de 36 jeringas y contenedor plástico con 180 jeringas.

ENG

CLOXASEC

Intramammary antibiotic for drying off

Formula: *Each 4.5 g syringe contains: Cloxacilin Benzathine 500 mg, Ampicillin Trihydrate 255 mg in a long-term bioavailability suspension.*

Indications: *Intramammary antibiotic suspension for the prevention and treatment of cattle subclinic mastitis during the dry-off period.*

Dosage: *Single dose. Apply one syringe per mammary quarter, after the last milking prior to the dry-off period.*

Restrictions: *Pre-milking: 72 hours, as long as the calving is at least 30 days (dry-off) after the product administration.*

Presentation: *Box containing 36 syringes and plastic container with 180 syringes.*

APLICACIÓN INTRAMAMARIA
INTRAMAMMARY APPLICATION

- ✓ ***¡Dos activos!***
- ✓ ***Acción retardada***
- ✓ ***Mayor cobertura antibiótica***
- ✓ *Two actives!*
- ✓ *Delayed action*
- ✓ *Better antimicrobial spectrum*

ESP

DI-OXI-FORTE

Antibiótico de amplio espectro
Hemoparasiticida

Fórmula: Oxitetraciclina Clorhidrato 7%, Diminazene Diaceturato 3,5%.

Indicaciones: Tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas y parasitarias producidas por microorganismos sensibles a los principios activos Oxitetraciclina y Diminazene, especialmente Anaplasmosis, Piroplasmosis, otras Ricketsiosis y Babesiosis.

Dosis: 1 ml cada 10 kg de peso (7 mg/kg de oxitetraciclina Clorhidrato y 3,5 mg/kg de Diminazene Diaceturato). Intervalo entre dosis: Cada 24 horas. Duración del tratamiento: Se recomiendan 1 o 2 dosis de acuerdo al criterio profesional.

Vías de administración: Intramuscular.

Presentación: Frasco por 100 ml y 250 ml.

ENG

DI-OXI-FORTE

Broad spectrum antibiotic - Hemoparasiticide

Formula: *Oxytetracycline Hydrochloride 7%, Diminazene Diaceturate 3.5%.*

Indications: *Treatment and prevention of infectious and parasitic diseases caused by microorganisms sensitive to the active principles Oxytetracycline and Diminazene, especially Anaplasmosis, Piroplasmosis, other Ricketsiosis and Babesiosis.*

Dosage: *1 ml every 10 kg bw (7 mg/kg of Oxytetracycline Hydrochloride and 3.5 mg/kg of Diminazene Diaceturate). Interval between doses: Every 24 hours. Treatment duration: We suggest 1 to 2 doses according to the professional criterion.*

Administration: *Intramuscular.*

Presentation: *100 and 250 ml vials.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

- ✓ ***Uso preventivo y curativo***
- ✓ ***No importa la etiología de la tristeza***
- ✓ ***Único en el mercado***
- ✓ *Preventive and curative use*
- ✓ *Useful in bovine sadness, no matter the etiology*
- ✓ *Unique in the market*

ESP

ENROPLUS I

Antimicrobiano de amplio espectro
Quinolona

Fórmula: Enrofloxacina 5%.

Indicaciones: Control de infecciones provocadas por bacterias Gram (+), Gram (-), Mycoplasmas y Clamidias. No administrar en animales en crecimiento, hembras preñadas ni lactantes.

Dosis: Todas las especies: 1 ml cada 10 kg de peso (5 mg/kg). Intervalo entre dosis: Cada 24 horas. Duración del tratamiento: 3 a 5 días.

Vía de administración: Subcutánea o intramuscular.

Presentación: Frasco por 100 ml.

ENG

ENROPLUS I

Broad spectrum antimicrobial - Quinolone

Formula: *Enrofloxacin 5%.*

Indications: *Control of infections caused by Gram (+) and Gram (-) bacteria, Mycoplasma and Chlamydias.*
Do not administrate in animals during growth, pregnant females or lactating animals.

Dosage: *All species: 1 ml every 10 kg bw (5 mg/kg). Interval between doses: Every 24 hours. Treatment duration: 3 to 5 days.*

Administration: *Subcutaneous or intramuscular.*

Presentation: *100 ml vial.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

✓ ***¡Ideal para el tratamiento de infecciones del tracto urinario, gastrointestinal y respiratorio!***

✓ *Ideal for treatment of infections in the urinary, gastrointestinal and respiratory tract!*

ESP

ENROPLUS ORAL

Antibiótico de amplio espectro

Fórmula: Enrofloxacina 10%.

Indicaciones: Control de infecciones causadas por bacterias Gram (+) y Gram (-). No utilizar en rumiantes adultos.

Dosis: Terneros y cerdos: 1 a 2 ml cada 40 kg de peso (2,5 a 5 mg/kg). Intervalo entre dosis: Cada 24 horas. Duración del tratamiento: 3 días. Aves: 0,5 ml/litro de agua (10 mg/kg por día en el agua de bebida). La solución se debe preparar a diario. Duración del tratamiento: 5 días.

Vía de administración: Oral.

Presentación: Frasco por 1 litro.

ENG

ENROPLUS ORAL

Broad spectrum antibiotic

Formula: *Enrofloxacin 10%.*

Indications: *It controls infections caused by Gram (+) and Gram (-) bacteria. Do not use in adult ruminants.*

Dosage: *Calves and swine: 1 to 2 ml every 40 kg bw (2.5 to 5 mg/kg). Interval between doses: Every 24 hours. Treatment duration: 3 days. Poultry: 0.5 ml/liter of water (10 mg/kg per day in the drinking water). The solution must be prepared daily. Treatment duration: 5 days.*

Administration: *Oral.*

Presentation: *1 liter vial.*

ORAL / *ORAL*

✓ ***¡Ideal para utilización en aves!***
✓ *Ideal for use in poultry!*

ESP

FLOXA MAX 10%

Antibiótico de amplio espectro - Quinolona

Fórmula: Enrofloxacina 10%.

Indicaciones: Control de infecciones provocadas por bacterias Gram (+), Gram (-), micoplasmas y clamidias.

Dosis: Dosis menor: 1 ml cada 40 kg de peso (2,5 mg/kg). Intervalo entre dosis: Cada 24 horas. Duración del tratamiento: 3 dosis. Dosis mayor: 7,5 ml cada 100 kg de peso (7,5 mg/kg). Intervalo entre dosis: Cada 72 horas. Duración del tratamiento: 1 o 2 dosis, de acuerdo al criterio profesional.

Vías de administración: Intramuscular o endovenosa.

Presentación: Frasco por 100 ml.

ENG

FLOXA MAX 10%

Broad spectrum antibiotic - Quinolone

Formula: *Enrofloxacin 10%.*

Indications: *Control of infections caused by Gram (+) and Gram (-) bacteria, Mycoplasma and chlamydias.*

Dosage: *Lower dose: 1 ml every 40 kg bw (2.5 mg/kg). Interval between doses: Every 24 hours. Treatment duration: 3 doses. Higher dose: 7.5 ml every 100 kg bw (7.5 mg/kg). Interval between doses: Every 72 hours. Treatment duration: 1 or 2 doses, according to professional criterion.*

Administration: *Intramuscular or intravenous.*

Presentation: *100 ml vial.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

- ✓ ***Aplicar 50 ml intramuscular en el momento de secado***
- ✓ ***¡Potencia la acción de pomos intramamarios!***
- ✓ ***Ideal para usar al ingreso al feed lot***
- ✓ *Administer 50 ml intramuscularly at the moment of drying*
- ✓ *It enhances the action of intramammary tubes*
- ✓ *Ideal for using prior to entering the feed lot*

ESP

IDOCARB 12

Hemoparasiticida

Fórmula: Imidocarb Dipropionato 12%, Cianocobalamina 0,005%.

Indicaciones: Tratamiento y prevención de anaplasmosis y piroplasmosis.

Dosis: Bovinos: Piroplasmosis: 1 ml cada 100 kg de peso (1,2 mg/kg de Imidocarb). Anaplasmosis o Tristeza bovina: 2,5 ml cada 100 kg de peso (3 mg/kg de Imidocarb). Prevención de Piroplasmosis, Anaplasmosis y tristeza bovina: consultar en el envase del producto. Equinos: Tratamiento de infecciones por Babesia caballi: 2 ml cada 100 kg de peso (2,4 mg/kg de Imidocarb). Repetir a las 48 horas. Tratamiento de infecciones por Babesia equi: 5 ml cada 150 kg de peso (4 mg/kg de Imidocarb). Repetir cada 72 horas, totalizando 4 aplicaciones.

Vía de administración: Subcutánea o intramuscular.

Presentación: Frasco de 100 y 20 ml.

ENG

IDOCARB 12

Hemoparasiticide

Formula: *Imidocarb Dipropionate 12%, Cyanocobalamin 0.005%.*

Indications: *Treatment and prevention of anaplasmosis and piroplasmosis.*

Dosage: *Cattle: Piroplasmosis: 1 ml every 100 kg bw (1.2 mg/kg of Imidocarb). Anaplasmosis or Bovine sadness: 2.5 ml every 100 kg bw (3 mg/kg of Imidocarb). Prevention of piroplasmosis, anaplasmosis and bovine sadness: see product package. Horses: Treatment of infections caused by Babesia caballi: 2 ml every 100 kg bw (2.4mg/kg of Imidocarb). Repeat 48 hours after. Treatment of infections caused by Babesia equi: 5 ml every 150 kg bw (4mg/kg of Imidocarb). Repeat every 72 hours, totaling 4 applications.*

Administration: *Subcutaneous or intramuscular.*

Presentation: *100 and 20 ml vials.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

- ✓ ***Preventivo y curativo***
- ✓ ***Único con vitamina B12***
- ✓ ***¡Excelentes resultados!***

- ✓ *Preventive and curative treatment*
- ✓ *Only with vitamin B12*
- ✓ *Excellent results*

ESP

LINCO 300

Antibiótico - Lincosamida

Fórmula: Lincomicina (como Clorhidrato) 30 %.

Indicaciones: Infecciones por gérmenes Gram (+) del tracto respiratorio, genitourinario, piel y tejidos blandos, huesos y articulaciones.

Dosis: Porcinos: 1 ml cada 20 kg de peso (15 mg/kg). Bovinos: 1 a 2 ml cada 60 kg de peso (5 a 10 mg/kg). Intervalo entre dosis: Cada 24 horas. Duración del tratamiento: Porcinos: 3 a 7 días. Bovinos: 3 a 4 días.

Vía de administración: Intramuscular.

Restricciones: Pre ordeño: 48 horas.

Presentación: Frasco por 100 ml.

ENG

LINCO 300

Antibiotic - Lincosamide

Formula: *Lincomycin (as Hydrochloride) 30%.*

Indications: *Infections of the respiratory, genito-urinary tract, skin, soft tissues, bones and joints, caused by Gram (+) germs.*

Dosage: *Swine: 1 ml every 20 kg bw (15 mg/kg). Cattle: 1 to 2 ml every 60 kg bw (5 to 10 mg/kg). Interval between doses: Every 24 hours. Treatment duration: Swine: 3 to 7 days. Cattle: 3 to 4 days.*

Administration: *Intramuscular.*

Restrictions: *Pre-milking: 48 hours.*

Presentation: *100 ml vial.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

- ✓ ***Combinación ideal de pomos en mastitis grado 2 y 3***
- ✓ ***Retiro en leche: 48 hs***
- ✓ *Ideal combination for mastitis grade 2 and 3*
- ✓ *Milk withdrawal: 48 hours*

¡PRÓXIMAMENTE! - COMING SOON!

ESP

LINCO MAS

Antibiótico intramamario

Fórmula: Cada inyector de 10 ml contiene: Lincomicina Clorhidrato 400 mg, Gentamicina sulfato 100 mg, Prednisolona Fosfato Sódica 6,72 mg.

Indicaciones: Tratamiento de mastitis producidas por microorganismos sensibles a la lincomicina, gentamicina o su combinación, durante la lactancia.

Dosis: Aplicar una jeringa por cuarto mamario. Intervalo entre dosis: 12 horas. Duración del tratamiento: Se recomiendan 4 dosis como mínimo por cuarto mamario o según criterio profesional veterinario.

Vías de administración: Intramamaria.

Restricciones: Pre faena: 8 días.
Pre ordeño: 84 hs.

Presentación: Caja por 20 inyectores, contenedor plástico por 100 inyectores y frasco multidosis por 120 ml.

ENG

LINCO MAS

Intramammary antibiotic

Formula: *Each 10 ml injector contains Lincomycin hydrochloride 400 mg, Gentamicin sulfate 100 mg, Prednisolone sodium phosphate 6.72 mg.*

Indications: *Treatment of mastitis produced by microorganisms sensitive to Lincomycin, Gentamicin or their combination, during lactation.*

Dose: *Apply one syringe per mammary quarter. Interval between doses: 12 hours. Treatment duration: At least 4 doses per mammary quarter are recommended or according to veterinarian criterion.*

Administration: *Intramammary.*

Restrictions: *Pre-slaughter: 8 days. Pre milking: 84 hours.*

Presentation: *Box with 20 individual syringes, 120 ml multidose vial and plastic container with 100 syringes.*

I+D
R&D

APLICACIÓN INTRAMAMARIA
INTRAMAMMARY APPLICATION

- ✓ ***Fórmula única***
- ✓ ***Retiro en leche: 84 hs***
- ✓ *Unique formula*
- ✓ *Milk withdrawal: 84 hours*

ESP

MAS D3

Antibiótico antiinflamatorio - Vitamínico Intramamario

Fórmula: Cada inyector de 10 ml contiene: Espiramicina Adipato 300 mg; Gentamicina 200 mg; Flumetasona 2,5 mg; Vitamina D3 0,1 mg.

Indicaciones: Tratamiento de mastitis producidas por microorganismos sensibles a la Espiramicina o Gentamicina, durante la lactancia en bovinos. Con un nuevo concepto de inmunoestimulación local por el aporte vitamínico.

Dosis: Aplicar una jeringa o 10 ml por cuarto mamario. Intervalo entre dosis: Cada 12 o 24 horas. Duración del tratamiento: Mínimo de 2 días o según criterio profesional veterinario.

Vía de administración: Intramamaria.

Restricciones: Pre ordeño: 96 horas.

Presentación: Caja por 20 inyectores, contenedor plástico por 100 inyectores y frasco multidosis por 120 ml.

ENG

MAS D3

Anti inflammatory antibiotic - Vitamin Intramammary

Formula: *Each 10 ml syringe contains: Spiramycin Adipate 300 mg; Gentamicin 200 mg; Flumethasone 2.5 mg; Vitamin D3 0.1 mg.*

Indications: *Treatment of mastitis caused by microorganisms sensitive to Spiramycin or Gentamicin, during lactation in cattle. With a new concept in local immunostimulation due to the vitamin intake.*

Dosage: *Apply one syringe or 10 ml per mammary quarter. Interval between doses: Every 12 or 24 hours. Treatment duration: At least 2 days or according to veterinarian's criterion.*

Administration: *Intramammary.*

Restrictions: *Pre-milking: 96 hours.*

Presentation: *Box with 20 individual syringes, 120 ml multidose vial and plastic container with 100 syringes.*

I+D
R&D

APLICACIÓN INTRAMAMARIA
INTRAMAMMARY APPLICATION

✓ ***¡Único pomo con el agregado de estimulante de la inmunidad mamaria!***

✓ *The only tube with mammary immunostimulant!*

¡PRÓXIMAMENTE! - COMING SOON!

ESP

MAS P3 INTRAMAMARIA

Antibiótico antiinflamatorio

Fórmula: Cada inyector de 10 ml contiene: Espiramicina Adipato 300 mg; Gentamicina Sulfato 241 mg; Prednisolona fosfato sódica 6,71 mg.

Indicaciones: Tratamiento de mastitis producidas por microorganismos sensibles a la espiramicina, gentamicina o su combinación, durante la lactancia.

Dosis: Aplicar una jeringa por cuarto mamario. Intervalo entre dosis: Repetir cada 12 o 24 horas, dependiendo de la gravedad del caso clínico y el criterio del profesional Veterinario. Duración del tratamiento: Dos dosis como mínimo. La duración total del tratamiento dependerá del criterio del profesional Veterinario.

Administración: Intramamaria.

Restricciones de uso: No administrar en animales destinados a la producción de carne para el consumo humano. Tiempo de retiro pre-ordeño: 96 horas.

Presentación: Caja por 20 jeringas y contenedor plástico por 100 jeringas.

ENG

MAS P3 INTRAMAMMARY

Anti inflammatory antibiotic

Formula: *Each 10 ml syringe contains: Spiramycin Adipate 300 mg; Gentamicin sulfate 241 mg; Prednisolone sodium phosphate 6.71 mg.*

Indications: *Treatment of mastitis produced by microorganisms sensitive to Spiramycin, Gentamicin or their combination, during lactation.*

Dosage: *Apply one syringe per mammary quarter. Interval between doses: 12 or 24 hours, depending on the severity of the clinical case and veterinarian criterion. Treatment duration: At least two doses are recommended. The total duration will depend on the severity of the clinical case and veterinarian's criterion.*

Administration: *Intramammary.*

Restrictions: *Pre-slaughter: Do not use in animals destined for human consumption. Pre-milking: 96 hours.*

Presentation: *Box with 20 syringes and 100 syringes plastic container.*

APLICACIÓN INTRAMAMARIA
INTRAMAMMARY APPLICATION

- ✓ ***Mejor actividad antibiótica***
- ✓ ***Formulación de alto nivel terapéutico***
- ✓ ***Fórmula única***
- ✓ ***Retiro en leche: 96 horas***
- ✓ ***Alta seguridad de uso***
- ✓ *Best antibiotic activity*
- ✓ *Formulation with high therapeutic level*
- ✓ *Unique formula*
- ✓ *Milk withdrawal: 96 hours*
- ✓ *High safety of use*

ESP

MULTIPEN INYECTABLE

Antibiótico betalactámico penicilínico
Aminoglucósido - Antiinflamatorio
no esteroide

Fórmula: *5.000.000 UI: Cada frasco con polvo contiene:* Penicilina G sódica 1.250.000 UI, Penicilina G procaína 1.250.000 UI; Penicilina G benzatina 2.500.000 UI, Gentamicina sulfato 2,5 g, Flunixin meglumine 0,275 g, Tripsina 90.000 UI, Quimotripsina 15.000 UI Cada frasco con diluyente contiene: Diluyente estéril 20 ml.
10.000.000 UI: Cada frasco con polvo contiene: Penicilina G sódica 2.500.000 UI, Penicilina G procaína 2.500.000 UI; Penicilina G benzatina 5.000.000 UI, Gentamicina sulfato 5,0 g, Flunixin meglumine 0,55 g, Tripsina 180.000 UI, Quimotripsina 30.000 UI Cada frasco con diluyente contiene: Diluyente estéril 40 ml.

Indicaciones: tratamiento de infecciones producidas por bacterias sensibles a la penicilina G, gentamicina o su combinación.

Dosis: 1 ml cada 12,5 kg o 25 kg de peso. Intervalo entre dosis: 48 a 72 hs. Duración del tratamiento: Se recomienda un mínimo de 2 aplicaciones, o según criterio del profesional veterinario.

Vías de administración: Intramuscular.

Presentación: 10 millones ó 5 millones de Penicilina G. Cada uno con frasco conteniendo diluyente estéril.

I+D
R&D

ENG

MULTIPEN INJECTABLE

Beta lactam antibiotic - Penicillin
Aminoglycoside non steroidal
antiinflammatory

Formula: *5,000,000 IU: Each powder vial contains: Penicillin G Sodium 1,250,000 IU; Penicillin G Procaine 1,250,000 IU; Penicillin G Benzathine 2,500,000 IU; Gentamicin Sulfate 2.5 g; Flunixin meglumine 0.275 g; Trypsin 90.000 IU, Chymotrypsin 15,000 IU. Each vial with diluent: Sterile diluent 20 ml.*
10,000,000 IU: Each powder vial contains: Penicillin G Sodium 2,500,000 IU; Penicillin G Procaine 2,500,000 IU; Penicillin G Benzathine 5,000,000 IU; Gentamicin Sulfate 5 g; Flunixin meglumine 0.55 g; Trypsin 180.000 IU, Chymotrypsin 30,000 IU. Each vial with diluent: Sterile diluent 40 ml.

Indications: *Treatment of infections sensitive to penicillin G, gentamicin or their combination.*

Dosage: *1 ml every 12.5 kg or 25 kg bw. Interval between doses: 48 to 72 hours. Treatment duration: A minimum of 2 applications are recommended, but it will depend on the veterinarian's criterion.*

Administration: *Intramuscular.*

Presentation: *10,000,000 or 5,000,000 of Penicillin G. Vial containing sterile diluent.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

- ✓ ***Fórmula balanceada de larga duración***
- ✓ ***48 horas de protección en una sola aplicación***
- ✓ ***Enzimas y flunixin***
- ✓ ***Sinergia total entre activos***
- ✓ ***Único en el mercado***
- ✓ *Long acting and balanced formula*
- ✓ *48 hours protection in a single dose*
- ✓ *Enzymes and flunixin*
- ✓ *Total synergy between actives*
- ✓ *Unique in the market*

ESP

NEUMOXINA

Antibiótico macrólido de larga acción

Fórmula: Tulatromicina 10%

Indicaciones: Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio asociada a Pasteurella spp., Histophilus somni y Mycoplasma bovis. Tratamiento de queratoconjuntivitis infecciosa bovina asociada a Moraxella bovis. Porcinos: Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio asociadas a Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Bordetella bronchiseptica y Haemophilus parasuis. Intervalo entre dosis: Aplicación única.

Dosis: 1 ml cada 40 kg de peso, equivalente a 2,5 mg/kg.

Vías de administración: Bovinos: subcutánea. Porcinos: intramuscular.

Restricciones de uso: No administrar en animales productores de leche destinada al consumo humano.

Presentación: Frasco multidosis por 50 ml.

ENG

NEUMOXINA

Long acting macrolide antibiotic

Formula: *Tulathromycin 10%.*

Indications: *Treatment of infections of the respiratory tract associated with Pasteurella spp., Histophilus somni and Mycoplasma bovis. Treatment of bovine infectious keratoconjunctivitis caused by Moraxella bovis. Swine: Treatment of infections of the respiratory tract associated with Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Bordetella bronchiseptica and Haemophilus parasuis. Interval between doses: single application.*

Dosage: *1 ml every 40 kg bw, equivalent to 2.5 mg/kg.*

Administration: *Cattle: subcutaneous. Swine: intramuscular.*

Restrictions: *Do not administer to animals whose milk is destined to human consumption.*

Presentation: *50 ml multidose vial.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

- ✓ ***Excelente biodisponibilidad y eficacia***
- ✓ ***Larga acción***
- ✓ ***Monodosis***
- ✓ *Excellent bioavailability and efficacy*
- ✓ *Long action*
- ✓ *Single-dose*

ESP

OXIFENAC L.A.

Antibiótico de amplio espectro
Antiinflamatorio - Analgésico y antipirético de accción prolongada

Fórmula: Oxitetraciclina Clorhidrato 20%, Diclofenac Sódico 2,5%.

Indicaciones: Enfermedades causadas por microorganismos sensibles a la Oxitetraciclina, por ejemplo: Diarrea de los terneros, fiebre del transporte, pietín, queratoconjuntivitis, neumonía, etc.

Dosis: 1 ml cada 10 kg de peso (20 mg/kg de Oxitetraciclina y 2,5 mg/kg de Diclofenac). Intervalo entre dosis: Cada 72 a 96 horas.

Vía de administración: Intramuscular profunda.

Presentaciones: Frascos por 50 ml, 100 ml, 250 ml y 500 ml.

ENG

OXIFENAC L.A.

Broad spectrum antibiotic - Long term
Anti-inflammatory - Analgesic and antipyretic

Formula: *Oxytetracycline Hydrochloride 20%, Diclofenac Sodium 2.5%.*

Indications: *Conditions caused by microorganisms sensitive to Oxytetracycline, for example: Diarrheas in calves, shipping fever, foot rot, keratoconjunctivitis, pneumonia, etc.*

Dosage: *1 ml every 10 kg bw (20 mg/kg of Oxytetracycline and 2.5 mg/kg of Diclofenac). Interval between doses: Every 72 to 96 hours.*

Administration: *Deep intramuscular.*

Presentations: *50 ml, 100 ml, 250 ml and 500 ml vials.*

I+D
R&D

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

✓ ***Único con la dosis terapéutica de diclofenac del mercado (2,5%)***

✓ *The only one with the therapeutic dose of diclofenac (2.5%)*

ESP

OXISOL

Antibiótico inyectable de amplio espectro

Fórmula: Oxitetraciclina Clorhidrato 5,7%.

Indicaciones: Tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas producidas por microorganismos sensibles a la Oxitetraciclina.

Dosis: 1 a 2 ml cada 10 kg de peso (6 a 11 mg/kg). Intervalo entre dosis: 12 horas. Duración del tratamiento: 3 a 4 días.

Vías de administración: Intramuscular, subcutánea o endovenosa.

Presentación: Frascos 100 ml y 250 ml.

Exportación: Frasco por 50 ml.

ENG

OXISOL

Broad spectrum injectable antibiotic

Formula: *Oxytetracycline Hydrochloride 5.7%.*

Indications: *Treatment and prevention of infectious conditions caused by microorganisms sensitive to Oxytetracycline.*

Dosage: *1 to 2 ml every 10 kg bw (6 to 11 mg/kg). Interval between doses: 12 hours. Treatment duration: 3 to 4 days.*

Administration: *Intramuscular, subcutaneous or intravenous route.*

Presentation: *100 ml and 250 ml vials.*

For export: 50 ml vial.

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

✓ ***Uso Intravenoso***
✓ *Intravenous use*

ESP

OXISOL L.A. *ZOOVET*

Antibiótico de amplio espectro
Acción prolongada

Fórmula: Oxitetraciclina Clorhidrato 20%, excipiente larga acción.

Indicaciones: Tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas producidas por microorganismos sensibles a la Oxitetraciclina.

Dosis: 1 ml cada 10 kg de peso (20 mg/kg). Intervalo entre dosis: Cada 48 a 96 horas. Duración del tratamiento: Se puede repetir la dosis de acuerdo al criterio profesional veterinario.

Vías de administración: Intramuscular profunda. En lechones se recomienda la vía subcutánea.

Presentación: Frascos por 100 ml, 250 ml y 500 ml.

Exportación: Frasco por 50 ml.

ENG

OXISOL L.A. *ZOOVET*

Broad spectrum antibiotic - Long term action

Formula: *Oxytetracycline Hydrochloride 20%, long-acting excipient.*

Indications: *Treatment and prevention of infectious conditions caused by microorganisms sensitive to Oxytetracycline.*

Dosage: *1 ml every 10 kg bw (20 mg/kg). Interval between doses: Every 48 to 96 hours. Treatment duration: Dosage can be repeated according to the veterinarian criterion.*

Administration: *Deep intramuscular.*
In piglets, the subcutaneous route is preferred.

Presentation: *100 ml, 250 ml and 500 ml vials.*

For export: 50 ml vial.

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

ESP

PARENTERIL INYECTABLE

Antibiótico - Antiinflamatorio - Antipirético
Analgésico

Fórmula: Espiramicina Adipato 5,5%, Gentamicina Sulfato 7,2 %, Flunixin Meglumine 2,5%.

Indicaciones: Tratamiento de infecciones producidas por gérmenes sensibles a la Espiramicina y/o Gentamicina. Preventivo de complicaciones bacterianas en afecciones virales.

Dosis: 1 ml cada 12 kg de peso (18.400 UI /kg de Espiramicina Adipato, 6 mg/kg de Gentamicina Sulfato y 2,1 mg/kg de Flunixin Meglumine). Intervalo entre dosis: 24 horas. Duración del tratamiento: Mínimo dos dosis.

Vía de administración: Intramuscular o endovenosa lenta.

Restricciones: Pre ordeño: 96 horas.

Presentación: Frasco de 100 ml.

ENG

PARENTERIL INJECTABLE

Antibiotic - Anti-inflammatory - Antipyretic Analgesic

Formula: *Spiramycin Adipate 5.5%, Gentamicin Sulfate 7.2 %, Flunixin Meglumine 2.5%.*

Indications: *Treatment of infections produced by germs sensitive to Spiramycin and/or Gentamicin. Prevention of bacterial complication in viral infections.*

Dosage: *1 ml every 12 kg bw (18,400 IU/kg of Spiramycin Adipate, 6 mg/kg of Gentamicin Sulfate and 2.1 mg/kg of Flunixin Meglumine). Interval between doses: 24 hours. Treatment duration: Minimum 2 doses.*

Administration: *Intramuscular or slow intravenous.*

Restrictions: *Pre-milking: 96 hours.*

Presentation: *100 ml vial.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

- ✓ ***Moderna formulación lista para usar***
- ✓ ***Sinergia antibiótica y antiinflamatoria***
- ✓ ***Una nueva herramienta para control de mastitis grado 2 y 3***
- ✓ *Modern formulation ready to use*
- ✓ *Antibiotic and antiinflammatory synergy*
- ✓ *A novel tool to control mastitis grade 2 and 3*

ESP

PREXICAN

Antibiótico de amplio espectro
Antiinflamatorio no esteroide

Fórmula: Penicilina G Procaínica 5.000.000 UI, Estreptomicina (como dihidroestreptomicina sulfato) 2 g, Piroxicam 0,15 g, excipientes c.s.p. 25 ml.

Indicaciones: Tratamiento de infecciones mixtas causadas por bacterias Gram (+), aerobias y anaerobias, y Gram (-). Potente agente antiinflamatorio, analgésico y antipirético, no esteroide.

Dosis: 1 ml cada 20 kg de peso (10.000 UI de Penicilina; 4 mg/kg de Estreptomicina y 0,3 mg/kg de Piroxicam). Intervalo entre dosis: 24 horas. Duración del tratamiento: 3 días.

Vía de administración: Intramuscular profunda.

Restricciones: Pre Faena: 30 días. Pre Ordeño: 72 horas.

Presentación: Frasco por 25 ml.

ENG

PREXICAN

Broad spectrum antibiotic
Non-steroidal anti-inflammatory

Formula: *Penicillin G Procaine 5,000,000 IU Streptomycin 2 g (as dihydrostreptomycin sulphate), Piroxicam 0.15 g, excipients q.s. 25 ml.*

Indications: *Treatment of mixed infections caused by Gram (+) bacteria, aerobic and anaerobic and Gram (-) bacteria. Powerful anti-inflammatory, analgesic and antipyretic, non-steroidal agent.*

Dosage: *1 ml every 20 kg bw (10,000 IU/kg of Penicillin; 4 mg/kg of Streptomycin, and 0.3 mg/kg of Piroxicam). Interval between doses: 24 hours. Treatment duration: 3 days.*

Administration: *Deep intramuscular.*

Restrictions: *Pre-slaughter: 30 days. Pre-milking: 72 hours.*

Presentation: *25 ml vial.*

I+D
R&D

SUSPENSIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SUSPENSION

- ✓ ***Bajo tiempo de retiro en leche***
- ✓ ***Poderoso antiinflamatorio***
- ✓ ***Sinergia antibiótica***
- ✓ ***Excelente para mastitis***
- ✓ *Short milk withdrawal period*
- ✓ *Powerful antiinflammatory*
- ✓ *Antimicrobial synergy*
- ✓ *Excellent for mastitis*

ESP

SULFADERM *AEROSOL*

Antibiótico - Anestésico - Antiinflamatorio

Fórmula: Sulfadiazina de plata 0,1%, Lidocaína clorhidrato 0,2 %, Hidrocortisona 0,2%.

Indicaciones: Tratamiento de heridas de cualquier origen.

Dosis y forma de aplicación: Aplicar hasta cubrir la herida y aproximadamente 4 cm alrededor de la misma. Intervalo entre dosis: Cada 12 horas. Duración del tratamiento: Aplicar un mínimo de 3 dosis.

Vía de administración: Rociado tópico.

Presentación: Aerosol de 240 ml.

ENG

SULFADERM *SPRAY*

Antibiotic - Anesthetic - Anti-inflammatory

Formula: *Silver Sulfadiazine 0.1%, Lidocaine Hydrochloride 0.2%, Hydrocortisone 0.2%.*

Indications: *Treatment of wounds of any origin.*

Dosage and application method: *Apply to cover the wound and about 4 cm around it. Interval between doses: Every 12 hours. Treatment duration: Apply a minimum of 3 doses.*

Administration: *Topical spray.*

Presentation: *240 ml spray.*

I+D
R&D

ROCIADO TÓPICO
TOPICAL FOAM

- ✓ ***Único en el mercado***
- ✓ ***Excelente cicatrizante***
- ✓ ***Recomendado su uso como post quirúrgico***
- ✓ ***Excelentes resultados en parches calientes***
- ✓ ***Ideal para piel y mucosa ocular***
  ¡sin solventes irritantes!

- ✓ *The only one in the market*
- ✓ *Excellent healing*
- ✓ *Recommended for post-surgical use*
- ✓ *Excellent results in hot spots*
- ✓ *Ideal for skin and ocular mucose, non-irritating foam!*

ESP

SULFAVET

Quimioterápico - Antimicrobiano

Fórmula: Sulfametazina Sódica 20%; Trimetoprim 4%.

Indicaciones: Septicemias, neumonías, traqueítis, rinitis, coccidiosis, infecciones gastrointestinales, urogenitales mixtas, complicaciones bacterianas de enfermedades virales.

Dosis: 1 ml cada 10 a 20 kg de peso (10 a 20 mg/kg de Sulfametazina y 2 a 4 mg/kg de Trimetoprim). Para Coccidiosis: 1 ml cada 10 a 20 kg de peso (20 mg/kg de Sulfametazina y 4 mg/kg de Trimetoprim). Intervalo entre dosis: 24 horas. Duración del tratamiento: Mínimo 3 aplicaciones.

Vías de administración: Subcutánea, intramuscular o endovenosa.

Presentación: Frasco por 100 ml.

ENG

SULFAVET

Chemotherapeutic - Antimicrobial

Formula: *Sulfametazine sodium 20%; Trimethoprim 4%.*

Indications: *Septicemias, pneumonias, tracheitis, rhinitis, coccidia, gastrointestinal or mixed urogenital infections, bacterial complications of viral conditions.*

Dosage: *1 ml every 10 to 20 kg bw (10 to 20 mg/kg of Sulfametazine and 2 to 4 mg/kg of Trimethoprim). For Coccidia: 1 ml every 10 to 20 kg bw (20 mg/kg of Sulfametazine and 4 mg/kg of Trimethoprim). Interval between doses: 24 hours. Treatment duration: At least 3 applications.*

Administration: *Subcutaneous, intramuscular or intravenous.*

Presentation: *100 ml vial.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

- ✓ ***Sinergia antimicrobiana***
- ✓ ***Multivía***
- ✓ ***Alta eficacia en coccidiosis***

- ✓ *Antimicrobial synergy*
- ✓ *Multiple administration routes*
- ✓ *High efficacy in coccidia*

ESP

T.B.O. *ZOOVET*

Antibiótico de amplio espectro y mucolítico de uso oral

Fórmula: Tilmicosina 25%; Bromhexina Clorhidrato 0,42 %.

Indicaciones: Tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas, principalmente procesos infecciosos respiratorios. Bromhexina es un agente expectorante y mucolítico que coadyuva en la eliminación de la secreción traqueobronquial.

Dosis y preparación del producto: Aves: En clima frío: Diluir 120 ml de producto en 100 lt de agua (Tilmicosina 30 mg/kg; Bromhexina 0,5 mg/kg). En clima caluroso: Diluir 60 ml de producto en 100 lt de agua (Tilmicosina 15 mg/kg; Bromhexina 0,25 mg/kg). Cerdos: Diluír 80 ml de producto en 100 lt de agua (Tilmicosina 20 mg/kg; Bromhexina 0,33 mg/kg). Intervalo entre dosis: 24 horas. Duración del tratamiento: Se recomiendan entre 3 y 5 días consecutivos de tratamiento. Si luego de este lapso no hay mejoría, rever el diagnóstico.

Vía de administración: Oral.

Presentación: Frasco por 1 lt.

ENG

T.B.O. *ZOOVET*

Broad spectrum antibiotic and mucolytic for oral use

Formula: *Tilmicosin 25%; Bromhexine Hydrochloride 0.42 %.*

Indications: *Treatment and prevention of infectious conditions, mainly infectious respiratory processes. Bromhexine is a mucolytic and expectorant agent that helps to eliminate the tracheobronchial secretion.*

Doses and product preparation: *Poultry: In cold weather: Dilute 120 ml of the product in 100 lt of water (Tilmicosin 30 mg/kg; Bromhexine 0.5 mg/kg). In hot weather: Dilute 60 ml of the product in 100 lt of water (Tilmicosin 15 mg/kg; Bromhexine 0.25 mg/kg). Swine: Dilute 80 ml of the product in 100 lt of water (Tilmicosin 20 mg/kg; Bromhexine 0.33 mg/kg). Interval between doses: 24 hours. Treatment duration: 3 to 5 consecutive days of treatment are recommended. If there is no improvement after this period, check the diagnosis.*

Administration: *Oral.*

Presentation: *1 liter vial.*

I+D
R&D

PARA DILUIR: ORAL
TO DILUTE: ORAL ADMINISTRATION

✓ ***¡Mejor efecto expectorante gracias a la Bromhexina!***

✓ *Better expectorant effect due to Bromhexine!*

ESP

TDF 35

Antibiótico - Macrólido - Antiinflamatorio

Fórmula: Tilmicosina 30%, Diclofenac Sódico 7,5%, Dexametasona Fosfato Sódico 0,12%.

Indicaciones: Tratamiento y prevención en bovinos de enfermedades respiratorias, queratoconjuntivitis y pododermatitis infecciosas producidas por microorganismos sensibles a la Tilmicosina, así como de la inflamación, dolor y/o hipertermia asociadas.

Dosis: Enfermedades respiratorias: 1 ml cada 30 kg de peso (10 mg/kg de Tilmicosina; 2,5 mg/kg de Diclofenac y 0,04 mg/kg de Dexametasona Fosfato). Pietín y queratoconjuntivitis: 1 ml cada 60 kg de peso. Intervalo entre dosis y duración del tratamiento: Dosis única. Si en 48 horas no hay mejoría, revisar diagnóstico.

Vía de administración: Subcutánea.

Presentación: 100 ml.

ENG

TDF 35

Antibiotic - Macrolide - Anti-inflammatory

Formula: *Tilmicosin 30%, Diclofenac Sodium 7.5%, Dexamethasone Sodium Phosphate 0.12%.*

Indications: *Treatment and prevention of respiratory diseases, infectious keratoconjunctivitis and foot rot in cattle, caused by microorganisms sensitive to Tilmicosin, as well as the inflammatory process, pain and/or hyperthermia associated with these conditions.*

Dosage: *Respiratory diseases: 1 ml every 30 kg bw (10 mg/kg of Tilmicosin; 2.5 mg/kg of Diclofenac and 0.04 mg/kg of Dexamethasone Phosphate). Foot rot and keratoconjuntivitis: 1 ml every 60 kg bw. Interval between doses and treatment duration: Single dose. If there is no improvement in 48 hours, check diagnosis.*

Administration: *Subcutaneous.*

Presentation: *100 ml.*

I+D
R&D

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

- ✓ ***¡Antibiótico de una sola dosis!***
- ✓ ***¡Calma el dolor y desinflama!***
- ✓ ***Antialérgico y antipirético***
- ✓ *Single dose antibiotic!*
- ✓ *It soothes pain and reduces inflammation!*
- ✓ *Anti-allergic and antipyretic*

ESP

TILMICOVET

Antibiótico - Antimicrobiano - Macrólido

Fórmula: Tilmicosina 30 %.

Indicaciones: Tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas producidas por microorganismos sensibles a la Tilmicosina, principalmente procesos espiratorios en bovinos. Actúa contra Gram (+), (espectro similar a las penicilinas naturales), y algunos Gram (-) causantes de la neumonía del bovino.

Dosis: En neumonía: 1 ml cada 30 kg de peso. En queratoconjuntivitis: 1 ml cada 60 kg de peso. En pietín: 1 ml cada 60 kg de peso. Duración del tratamiento: Dosis única, si en 48 horas no hay mejoría, revisar diagnóstico.

Vía de administración: Subcutánea exclusivamente.

Presentación: Frascos por 100 ml.
Exportación: Frasco por 10 ml.

ENG

TILMICOVET

Antibiotic - Antimicrobial - Macrolide

Formula: *Tilmicosin 30 %.*

Indications: *Treatment and prevention of infectious conditions caused by microorganisms sensitive to Tilmicosin, mainly respiratory processes in cattle. Tilmicosin acts against Gram (+), (similar spectrum to natural penicillin), and some Gram (-) that cause cattle pneumonia.*

Dosage: *In pneumonia: 1 ml every 30 kg bw. In keratoconjunctivitis: 1 ml every 60 kg bw. In foot rot: 1 ml every 60 kg bw. Treatment duration: Single dose, if there is no improvement in 48 hours, check diagnosis.*

Administration: *Only subcutaneous.*

Presentation: *100 ml vial.*
For export: 10 ml vial.

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

ESP

TILMICOFULL DÚO *INYECTABLE*

Antibiótico - Macrólido - Antiinflamatorio no esteroide - Antipirético - Analgésico

Fórmula: Tilmicosina 30%, Flunixin 3,9%.

Indicaciones: Tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por microorganismos Gram (+), Gram (-) y micoplasmas sensibles a la Tilmicosina.

Dosis: Neumonías: 1 ml cada 30 kg de peso. Pietín: 1 ml cada 60 kg de peso. Queratoconjuntivitis: 1 ml a 2 ml cada 60 kg de peso. Dosis mayores de 10 ml se deben administrar en dos puntos diferentes de inyección para reducir el malestar ocasional transitorio o la reacción en el lugar de aplicación.

Vía de administración: Subcutánea, en el cuello o por detrás de la paleta.

Presentación: Frasco por 100 y 250 ml.

ENG

TILMICOFULL DUO *INJECTABLE*

Antibiotic - Macrolide - Non-steroidal anti-inflammatory - Antipyretic - Analgesic

Formula: *Tilmicosin 30%, Flunixin 3.9%.*

Indications: *Treatment of infectious diseases caused by Gram (+), Gram (-) microorganisms and mycoplasmas sensitive to Tilmicosin.*

Dosage: *Pneumonia: 1 ml every 30 kg bw. Foot rot: 1 ml every 60 kg bw. Keratoconjunctivitis: 1 ml to 2 ml every 60 kg bw. Doses higher than 10 ml must be administered in two different injection points to reduce temporary discomfort or reaction in the application site.*

Administration: *Subcutaneous, in the neck, or behind the shoulder blades.*

Presentation: *100 and 250 ml vials.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

ESP

TILMICOFULL

Antimicrobiano - Antiinflamatorio - Anestésico

Fórmula: Tilmicosina 2,5%, Flunixin Meglumine 0,2%, Lidocaína Corhidrato 0,1%, Violeta de Genciana 0,0064%.

Indicaciones: Tratamiento de la queratocojuntivitis infecciosa en bovinos.

Dosis: 1 a 3 descargas o aspersiones en cada ojo a una distancia aproximada de 20 cm. Intervalo entre dosis: 12 horas. Duración del tratamiento: Se recomienda un mínimo de 4 días continuados de tratamiento. La posterior continuidad del mismo dependerá del criterio del profesional Veterinario.

Vías de administración: Oftálmica. Bajar el párpado inferior del paciente al realizar la aplicación. Tópica: rociar hasta cubrir la totalidad de la herida y dejar secar.

Presentación: Frasco spray por 200 ml.

ENG

TILMICOFULL

Antimicrobial - Anti-inflammatory - Anaesthetic

Formula: *Tilmicosin 2.5%, Flunixin Meglumine 0.2%, Lidocaine Hydrochloride 0.1%, Gentian Violet 0.0064%.*

Indications: *Treatment of infectious keratocojuntivitis in cattle.*

Dosage: *1 to 3 discharges or sprays in each eye at an approximate distance of 20 cm. Interval between doses: 12 hours. Treatment duration: At least 4 continuous days are recommended. The continuation of the treatment after this period will depend on the veterinarian criterion.*

Administration: *Ophthalmic. Move down the lower eyelid of the patient for the application. Topical: Spray to completely cover the wound and let dry.*

Presentation: *200 ml spray.*

I+D
R&D

ROCIADO TÓPICO / *TOPICAL SPRAY*

- ✓ ***Infecciones y heridas de piel y mucosas***
- ✓ ***Doble acción germicida***
- ✓ ***Analgésico-antiinflamatorio***
- ✓ ***Anestésico local***

- ✓ *Infections, skin and mucose wounds*
- ✓ *Double germicidal effect*
- ✓ *Analgesic- Anti-inflammatory*
- ✓ *Local anesthetic*

ESP

ZIFLOR FENAC

Antimicrobiano - Antibiótico
Antiinflamatorio no esteroide

Fórmula: Florfenicol 30 %, Diclofenac 3,75 %.

Indicaciones: Tratamiento de afecciones causadas por gérmenes sensibles al Florfenicol. La incorporación de Diclofenac en la formulación lo convierte en un potente agente antiinflamatorio, analgésico y antipirético.

Dosis: 1 ml cada 15 kg de peso (20 mg/kg de Florfenicol y 2,5 mg/kg de Diclofenac). Intervalo entre dosis: Cada 48 horas. Duración del tratamiento: 2 aplicaciones.

Vía de administración: Intramuscular, preferentemente en la tabla del cuello.

Presentación: Frasco por 100 y 250 ml.

ENG

ZIFLOR FENAC

Antimicrobial - Antibiotic - Non-steroidal anti-inflammatory

Formula: *Florfenicol 30 %, Diclofenac 3.75 %.*

Indications: *Treatment of conditions caused by germs sensitive to Florfenicol. The addition of Diclofenac makes it a powerful anti-inflammatory, analgesic and antipyretic agent.*

Dosage: *1 ml every 15 kg bw (20 mg/kg of Florfenicol and 2.5 mg/kg of Diclofenac). Interval between doses: Every 48 hours. Treatment duration: 2 applications.*

Administration: *Intramuscular, preferably in the base of the neck.*

Presentation: *100 and 250 ml vial.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

✓ ***Calma el dolor mientras actúa el antibiótico***

✓ *It soothes the pain while the antibiotic gets into action*

ESP

ZIFLOR *CREMA CICATRIZANTE*

Antimicrobiano - Antiinflamatorio
Antialérgico - Anestésico

Fórmula: Florfenicol 1,5%, Difenhidramina Clorhidrato 1%, Lidocaína Clorhidrato 0,5%, Bencidamina Clorhidrato 0,2%, Cloruro de benzalconio 1%.

Indicaciones: Tratamiento de patologías oculares, prevención y curación de lesiones de piel. Indicado en queratoconjuntivitis, queratitis, conjuntivitis y blefaritis, escoriaciones, heridas traumáticas o quirúrgicas y pododermatitis.

Dosis: Aplicar una pequeña cantidad de gel en el saco conjuntival o en la zona a tratar y extender suave y uniformemente. Duración del tratamiento e intervalo entre dosis: Según criterio del profesional veterinario.

Vías de administración: Tópica u oftalmológica.

Presentación: Pomo por 150 g.

ENG

ZIFLOR *HEALING CREAM*

Antimicrobial - Anti-inflammatory
Anti-allergic - Anaesthetic

Formula: *Florfenicol 1.5%; Diphenhydramine Hydrochloride 1%; Lidocaine Hydrochloride 0.5%; Benzydamine Hydrochloride 0.2%; Benzalkonium Chloride 1%.*

Indications: *Treatment of ocular pathologies, prevention and healing of skin injuries. Indicated in keratoconjunctivitis, keratopathy, conjunctivitis and blepharitis, excoriation, traumatic or surgical wounds and foot rot.*

Dosage: *Apply a small amount of gel in the conjunctival sac or in the area to treat, and spread smooth and evenly. Treatment duration and interval between doses: According to the veterinary criterion.*

Administration: *Topic or ophthalmologic.*

Presentation: *150 g tubes.*

TÓPICA U OFTALMOLÓGICA
TOPICAL OR OPHTHALMOLOGIC

- ✓ ***Balanopostitis***
- ✓ ***Queratoconjuntivitis***
- ✓ ***Heridas cutáneas***
- ✓ *Balanoposthitis*
- ✓ *Keratoconjunctivitis*
- ✓ *Skin wounds*

I+D
R&D

ESP

ZIFLOR *MUCOLÍTICO ORAL*

Antibiótico de amplio espectro - Espectorante Mucolítico

Fórmula: Florfenicol 10%, Bromhexina 0,26%.

Indicaciones: Tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas producidas por microorganismos sensibles al Florfenicol.

Dosis: Aves: En clima frío: Diluir 200 ml de producto en 100 lt de agua (Florfenicol 20 mg/kg; Bromhexina 0,5 mg/kg). En clima caluroso: Diluír 100 ml de producto en 100 lt de agua (Florfenicol 20 mg/kg; Bromhexina 0,5 mg/kg).Cerdos: Diluir 200 ml de producto en 100 lt de agua (Florfenicol: 20 mg/kg; Bromhexina 0,5 mg/kg). Intervalo entre dosis: 24 horas. Duración del tratamiento: 3 a 5 días. Si luego de este lapso no hay mejoría, revisar diagnóstico.

Vías de administración: Oral.

Presentación: Frasco por 1 lt.

ENG

ZIFLOR *ORAL MUCOLYTIC*

Broad spectrum antibiotic - Expectorant Mucolytic

Formula: *Florfenicol 10%, Bromhexine 0.26%.*

Indications: *Treatment and prevention of infectious conditions caused by microorganisms sensitive to Florfenicol.*

Dosage: *Poultry: In cold weather: Dilute 200 ml of the product in 100 lt of water (Florfenicol 20 mg/kg; Bromhexine 0.5 mg/kg). In hot weather: Dilute 100 ml of the product in 100 lt of water (Florfenicol 20 mg/kg; Bromhexine 0.5 mg/kg). Swine: Dilute 200 ml of the product in 100 lt of water (Florfenicol 20 mg/kg; Bromhexine 0.5 mg/kg). Interval between doses: 24 hours. Treatment duration: 3 to 5 days. If there is no improvement after this period, check the diagnosis.*

Administration: *Oral.*

Presentation: *1 liter vial.*

I+D
R&D

PARA DILUIR: ORAL
TO DILUTE: ORAL ADMINISTRATION

✓ ***¡Mejor efecto expectorante gracias a la bromhexina!***

✓ *Better expectorant effect due to Bromhexine!*

zoovet

ESP

DICLAZURIL *AVES ZOOVET*

Antiparasitario interno - Coccidiostático

Fórmula: Diclazuril 1%.

Indicaciones: Prevención y tratamiento de Coccidiosis.

Dosis: Para la profilaxis: Administrar 0,1 ml por cada litro de agua de bebida (1 ppm). Para la cura de animales con síntomas: Administrar 0,5 ml por cada litro de agua de bebida (5 ppm). Intervalo entre dosis: Depende del consumo de agua de las aves. Se debe lograr que el producto se mantenga en la concentración declarada durante todo el tratamiento. Duración del tratamiento: Para la profilaxis: Se puede extender durante toda la crianza. Para la cura de animales con síntomas: Mínimo de 48 horas.

Vía de administración: Oral.

Presentación: Frasco por 1 lt.

ENG

DICLAZURIL *POULTRY ZOOVET*

Internal antiparasitic - Coccidiostatic

Formula: *Diclazuril 1%.*

Indications: *Prevention and treatment of coccidiosis.*

Dosage: *For prophylaxis: Administer 0.1 ml per each liter of drinking water (1 ppm). To cure animals with symptoms: Administer 0.5 ml for each liter of drinking water (5 ppm). Interval between doses: It depends on the water consumption in poultry. The product must be kept with the stated concentration during the whole treatment. Treatment duration: For prophylaxis: It can be extended during all the rearing. To cure animals with symptoms: At least 48 hours.*

Administration: *Oral.*

Presentation: *1 liter vial.*

PARA DILUIR: ORAL
TO DILUTE: ORAL ADMINISTRATION

ESP

HEMATOMIDIUM

Tripanosomicida

Fórmula de la solución reconstituída: Cloruro de isometamidium 2%.

Indicaciones: Tratamiento de tripanosomiasis, entre ellos Tripanosoma vivax, T. evansi, T. congolense y T. brucei.

Dosis: Preventiva: Aplicar 2,5 ml cada 50 kg, equivalente a 1 mg/kg, por vía intramuscular. Proporciona de 2 a 6 meses de prevención efectiva, dependiendo del desafío ambiental. Curativa: Aplicar 1,25 ml cada 50 kg, equivalente a 0,5 mg/kg, por vía intramuscular. Dosis única. No aplicar más de 15 ml por punto de aplicación.

Vía de administración: Intramuscular en tabla del cuello.

Presentación: Frasco de polvo por 0,5 g con frasco por 25 ml de diluyente, frasco de polvo por 2 g con frasco por 100 ml de diluyente y frasco de polvo por 4 g con frasco por 200 ml de diluyente

ENG

HEMATOMIDIUM

Trypanocidal agent

Formula of the reconstituted solution: *Isometamidium chloride 2%.*

Indications: *Treatment and prevention of trypanosomiasis, among them Tripanosoma vivax, T. evansi, T. congolense y T. brucei.*

Preparation and dosage: *Preventive: 2,5 ml every 50 kg bw (1 mg/kg). Provides 2-6 months of effective prevention, depending on the ambient challenge. Curative: 1,25 ml every 50 kg bw (0.5 mg/kg). Single-dose. Do not apply more than 15 ml per injection site.*

Administration: *Intramuscularly, in the neck.*

Presentation: *Powder vial for 0.5 g with 25 ml diluent vial, powder vial for 2 g with 100 ml diluent vial and powder vial for 4 g with 200 ml diluent vial.*

POLVO PARA RECONSTITUIR
POWDER FOR RECONSTITUTION

✓ ***Larga duración del tratamiento preventivo***
✓ ***Alta eficacia tripanosomicida***
✓ ***Sin resistencia en el país***

✓ *Long-term preventive treatments*
✓ *High trypanosomicidal efficacy*
✓ *Low frequency of resistance for the active substance*

¡PRÓXIMAMENTE! - COMING SOON!

ESP

TRICLAZOL DÚO

Antiparasitario interno - Nematodicida
Trematodicida

Fórmula: Triclabendazol 14,4%; Levamisol 9,6%.

Indicaciones: Antiparasitario interno contra nematodes gastrointestinales: Ostertagia spp, Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., Cooperia spp., Bunostomum phlebotomum, Oesphagostomum spp.) y trematodes (Fasciola hepatica).

Dosis: Bovinos: 1 ml/12 kg de peso. Ovinos: 1 ml/14 kg de peso (14,4 mg/kg de triclabendazol y 9,6 mg/kg de levamisol).
Dosis única. No aplicar más de 10 ml en el mismo punto de aplicación.

Vías de administración: Subcutáneo.

Presentación: Frasco por 500 ml.

ENG

TRICLAZOL DUO

Internal antiparasitic - Nematocide
Trematodicide

Formula: *Triclabendazole 14,4 %; Levamisol 9,6%.*

Indications: *Internal antiparasitic against Gastrointestinal nematodes: Ostertagia spp, Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., Cooperia spp., Bunostomum phlebotomum, Oesphagostomum spp.), cestodes (Moniezia spp.) and trematodes (Fasciola hepatica).*

Dosage: *Cattle: 1 ml/12 kg bw. Sheep: 1 ml/14 kg bw (14.4 mg/kg of triclabendazole and 9.6 mg/kg of levamisol).*
Single dose. Do not apply more than 10 ml per injection site.

Administration: *Subcutanous.*

Presentation: *500 ml vial.*

I+D
R&D

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

- ✓ ***Fasciolicida de alta eficacia***
- ✓ ***Actúa contra formas maduras e inmaduras de Fasciola***
- ✓ ***Nematodicida apto para rotaciones***

- ✓ *High efficacy fasciolicide*
- ✓ *It acts against Fasciola mature and immature stages*
- ✓ *Nematocide suitable for rotation*

ESP

VERMEX INYECTABLE

Antiparasitario interno - Nematodicida
Bencimidazol

Fórmula: Ricobendazol 15%.

Indicaciones: Antihelmíntico (parásitos gastrointestinales y pulmonares) para bovinos.

Dosis: 1 ml cada 40 kg de peso (3,75 mg/kg). En casos de ostertagiosis: 1 ml cada 20 kg de peso (7,5 mg/kg). Duración del tratamiento: Dosis única o según criterio profesional veterinario. No administrar en hembras en los primeros 45 días de gestación.

Vía de administración: Subcutánea.

Presentación: Frasco por 500 y 1000 ml.

ENG

VERMEX INJECTABLE

Internal antiparasitic - Nematocide
Benzimidazole

Formula: *Ricobendazole 15%.*

Indications: *Anthelmintic (gastrointestinal and pulmonary parasites) for cattle.*

Dosage: *1 ml every 40 kg bw (3.75 mg/kg). In cases of ostertagiasis: 1 ml every 20 kg bw (7.5 mg/kg). Treatment duration: Single dose or according to the veterinarian criterion. Do not administer to females during the first 45 days of pregnancy.*

Administration: *Subcutaneous.*

Presentation: *500 and 1000 ml vial.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

✓ ***Menor irritación al contener agua destilada y menos solventes en su elaboración***

✓ *Less irritation as it contains distilled water and less solvents in its manufacture*

ESP

VERMEX-L

Antiparasitario interno - Nematodicida
Imidazotiazol

Fórmula: Levamisol Clorhidrato 18%.

Indicaciones: Tratamiento de parasitosis gastrointestinales y broncopulmonares, causadas por estadios adultos y larvarios en bovinos.

Dosis: 1 ml cada 22,75 kg de peso (8 mg/kg). Paraguay y Bolivia: 1ml cada 45 kg de peso. Duración del tratamiento: Dosis única o según criterio profesional veterinario.

Vía de administración: Subcutánea, detrás de la paleta.

Presentación: Frasco por 500 ml.

ENG

VERMEX-L

Internal antiparasitic - Nematocide
Imidazothiazole

Formula: *Levamisole Hydrochloride 18%.*

Indications: *Treatment of gastrointestinal and bronchopulmonary parasitosis caused by adult and larval stages in cattle.*

Dosage: *1 ml every 22.75 kg bw (8 mg/kg). Paraguay and Bolivia: 1ml every 45 kg bw. Treatment duration: Single dose or according to the veterinarian criterion.*

Administration: *Subcutaneous, behind the shoulder blade.*

Presentation: *500 ml vial.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

- ✓ ***Sin resistencia en nematodes bovinos***
- ✓ ***Inmunomodulador***
- ✓ *Without bovine nematods resistence*
- ✓ *Immune modulator*

ESP

VERMEX ORAL 3,8%

Antiparasitario interno - Nematodicida
Bencimidazol

Fórmula: Albendazol 3,8%.

Indicaciones: Tratamiento de la gastroenteritis verminosa, teniasis y fascilosis en ovinos.

Dosis: Para el tratamiento contra nematodes y cestodes: 1 ml cada 10 kg de peso (3,8 mg/kg). Para el tratamiento de Ostertagia inhibida: 2 ml cada 10 kg de peso (7,5 mg/kg). Para el tratamiento contra Fasciola hepática adulta: 2,6 ml cada 10 kg de peso (10 mg/kg). Duración del tratamiento: Dosis única. No administrar en hembras preñadas en los primeros 45 días de gestación.

Vía de administración: Oral.

Presentación: Frasco por 1lt.

ENG

VERMEX ORAL 3.8%

Internal antiparasitic - Nematocide
Benzimidazole

Formula: *Albendazole 3.8%.*

Indications: *Treatment of verminous gastroenteritis, teniasis and fasciolasis in sheep.*

Dosage: *For treatment against nematodes and cestodes: 1 ml every 10 kg bw (3.8 mg/kg). For the treatment of inhibited Ostertagia: 2 ml every 10 kg bw (7.5 mg/kg). For the treatment against adult liver fluke: 2.6 ml every 10 kg bw (10 mg/kg). Treatment duration: Single dose. Do not administer to females during the first 45 days of pregnancy.*

Administration: *Oral.*

Presentation: *1 liter vial.*

ORAL / *ORAL ADMINISTRATION*

Only available for Argentina and countries without registration

ESP

VERMEX ORAL 10%

Antiparasitario interno - Nematodicida
Bencimidazol

Fórmula: Albendazol 10%.

Indicaciones: Tratamiento de la gastroenteritis verminosa, teniasis y fasciolosis en bovinos.

Dosis: Para el tratamiento contra nematodes y cestodes: 5 ml cada 100 kg de peso (5 mg/kg). Para el tratamiento de Ostertagia inhibida: 7,5 ml cada 100 kg de peso (7,5 mg/kg). Para el tratamiento contra Fasciola hepática adulta: 10 ml cada 100 kg de peso (10 mg/kg). Intervalo entre dosis: Dosis única.

Vía de administración: Oral.

Presentación: Bidón de 1 y 5 litros.

ENG

VERMEX ORAL 10%

Internal antiparasitic - Nematocide
Benzimidazole

Formula: *Albendazole 10%.*

Indications: *Treatment of verminous gastroenteritis, taeniasis and fasciolosis in cattle.*

Dosage: *For treatment against nematodes and cestodes: 5 ml every 100 kg bw (5 mg/kg). For the treatment of inhibited Ostertagia: 7.5 ml every 100 kg bw (7.5 mg/kg). For treatment against adult liver fluke: 10 ml every 100 kg bw (10 mg/kg). Interval between doses: Single dose.*

Administration: *Oral.*

Presentation: *1 and 5 lt drum.*

ORAL */ ORAL ADMINISTRATION*

Only available for Argentina and countries without registration

ESP

ZURICOX SUSPENSIÓN

Coccidicida

Fórmula: Toltrazuril 5%.

Indicaciones: Tratamiento y prevención de coccidiosis en todas las etapas intracelulares causada por: Eimeria bovis, Eimeria zurnii (en bovinos) y por Isospora suis (en porcinos).

Dosis: Bovinos: 3 ml por cada 10 kg de peso (equivalente a 15 mg/kg) en única dosis. Lechones: preventivo: entre el 3 y 5 días de vida, 0,4 ml/kg de peso (equivalente a 20 mg/kg) en dosis única. Curativo: igual dosis y tratamiento.
Se puede repetir a los 15 - 20 días del primer tratamiento, según la epidemiología local o el criterio del profesional veterinario.

Vía de administración: Oral.

Presentación: 100 y 500 ml.

ENG

ZURICOX SUSPENSION

Coccidicidal

Formula: *Toltrazuril 5%.*

Indications: *Treatment and prevention of coccidiosis in all intracellular stages caused by: Eimeria bovis, Eimeria zurnii (in cattle) and by Isospora suis (in swine).*

Dosage: *Cattle: 3 ml every 10 kg bw (equivalent to 15 mg/kg) in single dose.*
Piglets: preventive: between 3 and 5 days old, 0.4 ml/kg bw (equivalent to 20 mg/kg) in a single dose. Curative: same dose and treatment.
It can be repeated 15-20 days after the first treatment, according to local epidemiology or professional criterion.

Administration: *Oral.*

Presentation: *100 and 500 ml.*

ORAL / *ORAL ADMINISTRATION*

zoovet

ESP

DELTA 50

Antiparasitario externo - Piretroide

Fórmula: Deltametrina 50%.

Indicaciones: Solución concentrada para diluir en agua indicada para la desinsectación de todo tipo de locales e instalaciones.

Forma de preparación y administración: Diluir el producto en agua: 10 ml en 15 lt de agua (1 en 1500). Para realizar una correcta dilución, utilizar la tapa dosificadora provista, la cual tiene capacidad de 10 ml cuando se llena hasta el tope. Se aplica por aspersión en el ambiente.

Presentación: Frasco por 100 ml.

ENG

DELTA 50

External antiparasitic - Pyrethroid

Formula: *Deltamethrin 50%.*

Indications: *Concentrated solution to dilute in water for disinsection of all types of facilities and premises.*

Preparation and administration method: *Dilute the product in water: 10 ml in 15 lt of water (1 in 1500). For a proper dilution, use the dosage cap provided with the product, which has a capacity of 10 ml to the top. To be applied by spraying the area.*

Presentation: *100 ml vial.*

PARA DILUIR
TO DILUTE

- ✓ ***Mejor costo beneficio de dosis***
- ✓ *Better cost-benefit ratio in dose*

ESP

ECTO 2 A PLUS

Antiparasitario externo por aspersión

Fórmula: Clorpirifós 41,6%; Cipermetrina 16%.

Indicaciones: Tratamiento y control de las siguientes familias de insectos: Muscidae, Cullicidae y Tabanidae.

Dosis: Dilución a razón de 200 ml por cada 200 litros de agua. La cantidad de producto diluido a utilizar por animal va a depender del tamaño del animal y la carga parasitaria. La dosis orientativa es la siguiente: Bovinos y equinos adultos: 1 a 3 litros/animal. Porcinos: 1 a 2 litros/animal. Duración del tratamiento: Dosis única. Se puede repetir a los 15 a 30 días dependiendo de la carga de insectos presente.

Vías de administración: Se aplica por aspersión sobre el cuerpo del animal. Puede aplicarse en todo tipo de locales e instalaciones.

Presentación: Exhibidor de 6 frascos por 200 ml.

Exportación: Botella por 1 litro.

ENG

ECTO 2 A PLUS

External antiparasitic by spraying

Formula: *Chlorpyrifos 41.6%, Cypermethrin 16%.*

Indications: *Treatment and control of the following insect families: Muscidae, Cullicidae and Tabanidae.*

Dosage: *Dilute at a rate of 200 ml every 200 lt of water. The amount of product to use per animal will depend on the animal size and the parasitic load. The estimate dosage is as follows: Adult cattle and horses: 1 to 3 liters/animal. Swine: 1 to 2 liters/animal. Treatment duration: Single dose. It can be repeated at 15 or 30 days depending on the insect load found.*

Administration: *To be applied by spraying the animal body. It can be used in all types of facilities and premises.*

Presentation: *Display of 6 x 200 ml vials.*

Export: 1 liter bottle.

TÓPICO / TOPICAL

✓ ***Doble efecto insecticida***
✓ *Double insecticide effect*

ESP

ECTO-2 POUR ON ZOOVET

Antiparasitario externo - Piretroide

Fórmula: Cipermetrina 5%, Butóxido de piperonilo 5%.

Indicaciones: Tratamiento y control de ectoparásitos sensibles a la Cipermetrina.

Dosis: Bovinos: 10 ml cada 400 kg de peso (1,25 mg/kg de Cipermetrina). En toros y animales mayores de 400 kg de peso, no administrar más de 20 ml. Intervalo entre dosis: 21 días. Duración del tratamiento: Según criterio profesional veterinario.

Vías de aplicación: Por derrame tópico (pour on).

Presentación: Bidón por 1 lt con dosificador.

ENG

ECTO-2 POUR ON ZOOVET

External antiparasitic - Pyrethroid

Formula: *Cypermethrin 5%, Piperonyl Butoxide 5%.*

Indications: *Treatment and control of ectoparasites sensitive to Cypermethrin.*

Dosage: *Cattle: 10 ml every 400 kg bw (1.25 mg/kg of Cypermethrin). In bulls and animals heavier than 400 kg bw, do not administer more than 20 ml. Interval between doses: 21 days. Treatment duration: According to the veterinarian criterion.*

Application: *By topical leakage (pour on).*

Presentation: *1 lt drum with dispenser.*

TÓPICO / *TOPICAL*

ESP

ECTO-THION

Antiparasitario externo - Piretroide Organofosforado

Fórmula: Etión 15%, Cipermetrina 5%.

Indicaciones: Tratamiento y control de ectoparasitosis producidas por parásitos sensibles a Etión y/o Cipermetrina en bovinos.

Dosis: Terneros a partir de 100 kg: 5 ml por animal. Adultos: 10 ml cada 400 kg de peso. En toros y animales mayores de 400 kg de peso: No administrar más de 20 ml (1,25 mg/kg de Cipermetrina y 3,75 mg/kg de Etión). Intervalo entre dosis: 21 días. Duración del tratamiento: Según criterio profesional veterinario.

Vías de administración: Por derrame tópico (pour on).

Restricciones de uso: Deben transcurrir 40 días entre su uso y la faena para consumo humano. No utilizar en vacas lecheras en producción.

Presentación: Bidón por 1 lt con dosificador y por 5 lt.

ENG

ECTO-THION

External antiparasitic - Pyrethroid Organophosphate

Formula: *Ethion 15%, Cypermethrin 5%.*

Indications: *Treatment and control of ectoparasitosis caused by parasites sensitive to Ethion and/or Cypermethrin in cattle.*

Dosage: *Calves as from 100 kg: 5 ml per animal. Adults: 10 ml every 400 kg bw. In bulls and animals heavier than 400 kg: Do not administer more than 20 ml (1.25 mg/kg of Cypermethrin and 3.75 mg/kg of Ethion). Interval between doses: 21 days. Treatment duration: According to the veterinarian criterion.*

Administration: *By topical leakage (pour on).*

Restrictions: *40 days should elapse between the usage and slaughter for human consumption. Do not use in lactating cattle.*

Presentation: *1 lt drum with dispenser and 5 lt drum.*

TÓPICO / *TOPICAL*

ESP

ECTO TAK

Antiparasitario externo - Garrapaticida sistémico pour on

Fórmula: Fluazurón 2,5%.

Indicaciones: Antiparasitario externo, garrapaticida sistémico para bovinos. Actúa inhibiendo la síntesis de la quitina.

Dosis: 10 ml cada 100 kg de peso (2,5 mg/kg de Fluazurón). Intervalo entre dosis y duración del tratamiento: La primera dosis conviene aplicarla 2-3 semanas antes de la presentación habitual de las garrapatas. Luego aplicar cada 1 a 3 meses de acuerdo a la carga parasitaria de los animales o según criterio del profesional veterinario.

Vía de administración: Derrame tópico (Pour-on).

Presentación: Bidón por 1 y 5 lt.

ENG

ECTO TAK

External antiparasitic - Systemic - Pour on Tick-killer

Formula: *Fluazuron 2.5%.*

Indications: *External antiparasitic, protection against ticks in cattle. It acts by inhibiting the chitin synthesis.*

Dosage: *10 ml every 100 kg bw (2.5 mg/kg of Fluazuron). Interval between doses and treatment duration: It is convenient to apply the first dose 2 to 3 weeks before the usual ticks onset. After that, apply every 1 to 3 months depending on the parasitic load in animals or the veterinarian criterion.*

Administration: *Topical leakage (pour on).*

Presentation: *1 and 5 lt drum.*

I+D
R&D

TÓPICO / *TOPICAL*

- ✓ ***Aprobado por SENASA como garrapaticida***
- ✓ ***Aprobados por SENASA para limpieza de campos***
- ✓ *Approved by SENASA as tick-killer agent*
- ✓ *Approved by SENASA for field clean-up*

ESP

ROCHY CURABICHERAS *SPRAY*

Antiparasitario externo - Curabicheras
Antimicrobiano - Cicatrizante

Fórmula: Cada aerosol de 267 g contiene: Fipronil 1,372 g; Clorhexidina Acetato 0,17 g. Excipiente con citronella, pasta de aluminio y propelente.

Indicaciones: Prevención y el tratamiento de miasis. Posee acción residual y evita las reinfestaciones y contaminación bacteriana secundaria.

Dosis e intervalo entre dosis, duración del tratamiento: Aplicar desde una distancia de 10 cm en cantidad suficiente para cubrir la herida o bichera y 5 cm alrededor de la misma. Intervalo entre dosis: En tratamiento: Repetir cada 24 hs hasta la eliminación de los parásitos y cicatrización de la herida. En prevención: Dosis única o repetir cada 24 hs, hasta la cicatrización de la herida (recomendable en épocas estivales).

Vías de administración: Aplicación externa (tópica).

Restricciones de uso: Tiempo de retiro prefaena: 7 días; No aplicar en animales en producción de leche para consumo humano.

Presentación: Aerosol 267 g.

I+D
R&D

ENG

ROCHY *SPRAY*

External antiparasitic - Anti myiasis
Antimicrobial - Healing

Formula: *Each 267 g spray contains: Fipronil 1.372 g; Chlorhexidine Acetate 0.17 g. Excipient with citronella, aluminum paste and propellant q.s. 267 g.*

Indications: *Prevention and treatment of myiasis. With residual action, it prevents reinfestation and bacterial secondary contamination.*

Dosage, interval between doses and treatment duration: *Spray at a distance of 10 cm and in enough quantity to cover the wound or myiasis, and 5 cm around it. Interval between doses: In treatment: Repeat every 24 hours until the total elimination of parasites and wound healing. In prevention: It can be administered as single dose or every 24 hours, until wound healing (recommended in summer times).*

Administration: *External application (topical).*

Restrictions: *Pre-slaughter: 7 days; Do not apply on animals producing milk for human consumption.*

Presentation: *267 g spray.*

ROCIADO TÓPICO / *TOPICAL SPRAY*

- ✓ ***Eficacia y poder residual***
- ✓ ***Fórmula única y repelente con citronella***
- ✓ ***Mata y cicatriza como ninguno***
- ✓ *Efficacy and residual power*
- ✓ *Unique formulation and repellent with citronella*
- ✓ *It kills and heals like none*

ESP

ROCHY CURABICHERAS *CREMA*

Antiparasitario externo - Curabicheras
Antimicrobiano - Cicatrizante

Fórmula: Fipronil 0,25 g, Clorhexidina acetato 0,50 g. Excipiente con aceite de pino y pasta de aluminio c.s.p. 100 g.

Indicaciones: Tratamiento de miasis. Evita la contaminación bacteriana secundaria.

Dosis: Aplicar el producto en cantidad suficiente como para cubrir la herida o bichera y aproximadamente 5 cm alrededor de la misma. Intervalo entre dosis y duración del tratamiento: En tratamiento: repetir cada 24 hs hasta la eliminación total de los parásitos y cicatrización de la herida. En prevención: se puede aplicar en dosis única, o cada 24 hs hasta la cicatrización de la herida (recomendable en épocas estivales).

Vías de administración: Aplicación externa (tópica).

Restricciones: Pre faena: 7 días. No administrar en hembras en producción de leche para consumo humano o industrialización.

Presentación: Pomo por 200 g.

ENG

ROCHY *CREAM*

External antiparasitic - Anti myiasis
Antimicrobial - Healing

Formula: *Fipronil 0.25 g, Chlorhexidine acetate 0.5 g. Excipient with pine oil and aluminum paste q.s.100 g.*

Indications: *Treatment of myiasis. Prevents bacterial secondary contamination.*

Dosage: *Administer in enough quantity to cover the wound or myiasis, and approximately 5 cm around it. In case of deep myiasis it is recommended to ensure product penetration. Interval between doses and treatment duration: In treatment: Repeat every 24 hours until the total elimination of parasites and wound healing. In prevention: It can be administered as single dose or every 24 hours, until wound healing (recommended in summer times).*

Administration: *External application (topical).*

Restrictions: *Pre-slaughter: 7 days; Do not apply on animals producing milk for human consumption.*

Presentation: *200 g tube.*

TÓPICO / *TOPICAL*

I+D
R&D

- ✓ ***Buena adherencia***
- ✓ ***Increíble respuesta***
- ✓ ***Único en el mundo***

- ✓ *Good adherence*
- ✓ *Incredible response*
- ✓ *Unique in the world*

ESP

ROCHY CURABICHERAS PASTA

Antiparasitario externo - Curabicheras
Antimicrobiano - Cicatrizante

Fórmula: Fipronil 0,25 g, Clorhexidina acetato 0,50 g. Excipiente con aceite de pino y pasta de aluminio c.s.p. 100 g.

Indicaciones: Prevención y tratamiento de miasis. Evita las reinfestaciones y contaminación bacteriana secundaria.

Dosis: Aplicar el producto en cantidad suficiente para cubrir la herida o bichera y aproximadamente 5 cm alrededor de la misma. Intervalo entre dosis y duración del tratamiento: En tratamiento: repetir cada 24 hs hasta la eliminación total de los parásitos y cicatrización de la herida. En prevención: se puede aplicar en dosis única, o repetir cada 24 hs hasta la cicatrización de la herida (recomendable en épocas estivales).

Vías de administración: Aplicación externa (tópica).

Restricciones: Pre faena: 7 días. No administrar en hembras en producción de leche para consumo humano o industrialización.

Presentación: Potes de polietileno contenido neto: 450 o 900 g.

ENG

ROCHY PASTE

External antiparasitic - Anti myiasis
Antimicrobial - Healing

Formula: *Fipronil 0.25 g, Chlorhexidine acetate 0.5 g. Excipient with pine oil and aluminum paste q.s.100 g*

Indications: *Prevention and treatment of myiasis. Prevents reinfestation and bacterial secondary contamination.*

Dosage: *Administer in enough quantity to cover the wound or myiasis, and approximately 5 cm around it. Interval between doses and treatment duration: In treatment: Repeat every 24 hours until the total elimination of parasites and wound healing. In prevention: It can be administered as single dose or every 24 hours, until wound healing (recommended in summer times).*

Administration: *External application (topical).*

Restrictions: *Pre-slaughter: 7 days; Do not apply on animals producing milk for human consumption.*

Presentation: *450 or 900 g polyethylene jar.*

I+D
R&D

TÓPICO / *TOPICAL*

- ✓ ***La nueva pasta curabichera del mercado***
- ✓ ***Activos y formulación perfecta***
- ✓ ***Moderno y único***

- ✓ *The new antimyiasis paste in the market*
- ✓ *Perfect formulation and actives*
- ✓ *Modern and unique*

ESP

ROCHY CURABICHERAS *LÍQUIDO*

Antiparasitario externo - Curabicheras
Antimicrobiano - Cicatrizante

Fórmula: Fipronil 0,25 g, Clorhexidina acetato 0,50 g. Excipiente con aceite de pino y pasta de aluminio c.s.p. 100 ml.

Indicaciones: Prevención y tratamiento de miasis. Evita las reinfestaciones y contaminación bacteriana secundaria.

Dosis: Aplicar el producto en cantidad suficiente para cubrir la herida o bichera y aproximadamente 5 cm alrededor de la misma. Intervalo entre dosis y duración del tratamiento: En tratamiento: Repetir cada 24 hs hasta la eliminación total de los parásitos y cicatrización de la herida. En prevención: en dosis única, o cada 24 hs hasta la cicatrización de la herida (recomendable en épocas estivales).

Vías de administración: Aplicación externa (tópica).

Restricciones: Pre faena: 7 días. No administrar en hembras en producción de leche para consumo humano o industrialización.

Presentación: Envase por 250 o 1000 ml de producto.

I+D
R&D

ENG

ROCHY *LIQUID*

External antiparasitic - Anti myiasis
Antimicrobial - Healing

Formula: *Fipronil 0.25 g, Chlorhexidine acetate 0.5 g. Excipient with pine oil and aluminum paste q.s.100 ml.*

Indications: *Prevention and treatment of myiasis. Prevents reinfestation and bacterial secondary contamination.*

Dosage: *Administer in enough quantity to cover the wound or myiasis, and approximately 5 cm around it. Interval between doses and treatment duration: In treatment: Repeat every 24 hours until the total elimination of parasites and wound healing. In prevention: It can be administered as single dose or every 24 hours, until wound healing (recommended in summer times).*

Administration: *External application (topical).*

Restrictions: *Pre-slaughter: 7 days; Do not apply on animals producing milk for human consumption or industrialization.*

Presentation: *250 or 1000 ml bottle.*

- ✓ ***Alta penetración en heridas profundas***
- ✓ ***Fluidez perfecta***
- ✓ ***Altamente eficaz***
- ✓ ***Único, moderno y el mejor***
- ✓ *High penetration to deep wounds*
- ✓ *Perfect fluidity*
- ✓ *Highly effective*
- ✓ *Unique, modern and the best!*

ESP

ROCHY CURABICHERAS POLVO

Antiparasitario externo - Curabicheras
Antimicrobiano - Cicatrizante

Fórmula: Fipronil 0,25 g, Clorhexidina acetato 0,50 g. Excipiente con esencia de eucalipto c.s.p. 100 g.

Indicaciones: Prevención y tratamiento de miasis (bicheras). Evita contaminación bacteriana.

Dosis: Aplicar el producto en cantidad suficiente como para cubrir la herida o bichera y aproximadamente 5 cm alrededor de la misma. Intervalo entre dosis y duración del tratamiento: En tratamiento: repetir cada 24 hs hasta la eliminación del total de los parásitos y cicatrización de la herida. En prevención: se puede aplicar en dosis única, o cada 24 hs hasta la cicatrización de la herida (recomendable en épocas estivales).

Vías de administración: Aplicación externa (tópica).

Restricciones: Pre faena: 7 días. No administrar en hembras en producción de leche para consumo humano o industrialización.

Presentación: Talquera por 200 y 1000 g.

I+D
R&D

ENG

ROCHY POWDER

External antiparasitic - Anti myiasis
Antimicrobial - Healing

Formula: *Fipronil 0.25 g, Chlorhexidine acetate 0.5 g. Excipient with eucalyptus essence q.s. 100 g.*

Indications: *Prevention and treatment of myiasis. Prevents reinfestation and bacterial secondary contamination.*

Dosage: *Administer in enough quantity to cover the wound or myiasis, and approximately 5 cm around it. Interval between doses and treatment duration: In treatment: Repeat every 24 hours until the total elimination of parasites and wound healing. In prevention: It can be administered as single dose or every 24 hours, until wound healing (recommended in summer times).*

Administration: *External application (topical).*

Restrictions: *Pre-slaughter: 7 days; Do not apply on animals producing milk for human consumption.*

Presentation: *200 and 1000 g bottle.*

- ***Innovación en un gran producto***
- ***Supera todo lo conocido***
- ***Cura y repele***

- *Innovation in a great product*
- *It overcomes everything known*
- *It heals and repels*

ESP

ALGIDOL INYECTABLE

Analgésico

Fórmula: Tramadol Clorhidrato 5%.

Indicaciones: Tratamiento y prevención del dolor, tanto de tipo visceral como somático, de moderado a severo, agudo o crónico. Alivio del dolor post quirúrgico.

Dosis: Equinos: 2 ml cada 100 kg de peso (1 mg/kg). Intervalo entre dosis: 8 a 12 horas con un máximo de 10 mg/kg totales por día excepto para la vía epidural (6 horas).
Duración del tratamiento: Dependerá del tipo de dolor a tratar y del criterio del profesional veterinario actuante.

Vía de administración: Equinos: Inyectable endovenosa lenta (10 minutos como mínimo) o epidural.

Presentación: Frasco por 20 y 50 ml.

ENG

ALGIDOL INJECTABLE

Analgesic

Formula: *Tramadol Hydrochloride 5%.*

Indications: *Treatment and prevention of pain, either visceral or somatic, moderate or severe, acute or chronic. Post-surgical relief.*

Dosage: *Horses: 2 ml every 100 kg bw (1 mg/kg). Interval between doses: 8 to 12 hours with a total maximum of 10 mg/kg per day, except by epidural route (6 hours).Treatment duration: It will depend on the pain to treat and the acting veterinarian criterion.*

Administration: *Horses: Slow intravenous injection (10 minutes at least) or epidural route.*

Presentation: *20 and 50 ml vial.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

ESP

EUTANÁSICO ZOOVET

Barbitúrico - Agente eutanásico

Fórmula: Pentobarbital Sódico 39%, Difenilhidantoina 5%.

Indicaciones: Provocar una humanitaria, indolora y rápida eutanasia.

Dosis: Equinos: 8,8 ml por cada 50 kg de peso.

Vías de administración: Endovenosa o intracardíaca. La inyección intravenosa es la ruta preferible de administración. La inyección intracardíaca puede utilizarse cuando la vía intravenosa es impracticable. La dosis calculada debe ser aplicada en forma de bolo, en una sola aplicación.

Presentación: Frasco por 100 ml.

ENG

EUTHANASIC ZOOVET

Barbiturate - Euthanasia agent

Formula: *Pentobarbital Sodium 39%, Diphenylhydantoin 5%.*

Indications: *To cause a humanitarian, painless and fast euthanasia.*

Dosage: *Horses: 8.8 ml every 50 kg bw.*

Administration: *Intravenous or intracardiac. The intravenous injection is the preferred administration route. The intracardiac injection can be used when the intravenous route is not feasible. The calculated dose should be administered as bolus, in a single application.*

Presentation: *100 ml vial.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

ESP

PLANO 3

Anestésico disociativo

Fórmula: Ketamina (como clorhidrato) 5 %.

Indicaciones: Inducción y mantenimiento de la anestesia.

Dosis: Ovinos: Endovenosa: 3 mg/kg. Intramuscular: 10 a 20 mg/kg. Porcinos: Endovenosa: 5 mg/kg. Intramuscular: 15 a 20 mg/kg. Bovinos: Endovenosa: 5 mg/kg. Intramuscular: 15 mg/kg. Equinos: Endovenosa: 3 a 5 mg/kg. Intramuscular: 15 mg/kg. Camélidos Sudamericanos: Endovenosa: 3,5 mg/kg. Intramuscular: 10 mg/kg. Intervalo entre dosis: Dependerá del criterio del profesional veterinario actuante. Duración del tratamiento: Dosis única.

Vías de administración: Endovenosa, intramuscular o subcutánea.

Precauciones: Se puede observar apnea según la dosis y velocidad de administración. Se recomienda ventilar al animal.

Presentación: Frasco por 50 ml.

ENG

PLANE 3

Dissociative anesthetic

Formula: *Ketamine (as hydrochloride) 5%.*

Indications: *Anesthesia induction and maintenance.*

Dosage: *Sheep: Intravenous: 3 mg/kg. Intramuscular: 10 to 20 mg/kg. Swine: Intravenous: 5 mg/kg. Intramuscular: 15 to 20 mg/kg. Cattle: Intravenous: 5 mg/kg. Intramuscular: 15 mg/kg. Horses: Intravenous: 3 to 5 mg/kg. Intramuscular: 15 mg/kg. South american camelids: Intravenous: 3.5 mg/kg. Intramuscular: 10 mg/kg. Interval between doses: It will depend on the acting veterinarian criterion. Treatment duration: Single dose.*

Administration: *Intravenous, intramuscular or subcutaneous.*

Warnings: *Apnea can be noticed according to dose and administration speed. It is recommended to ventilate the animal.*

Presentation: *50 ml vial.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

ESP

XILAZINA ZOOVET

Sedante - Analgésico - Anestésico
Relajante muscular

Fórmula: Xilazina Clorhidrato 2%.

Indicaciones: Anestésico inyectable, pre-anestésico, sedante, miorrelajante y analgésico.

Dosis y vía de administración: Bovinos: Endovenosa: 0,25 a 0,5 ml cada 100 kg de peso (0,05 hasta 0,1 mg/kg). Intramuscular: 0,5 a 1,5 ml cada 100 kg de peso (0,1 – 0,3 mg/kg). Equinos: Endovenosa: 0,5 ml cada 10 kg de peso (1 mg/kg). Intramuscular: 1 ml cada 10 kg de peso (2 mg/kg).

Presentación: Frasco por 20 ml.

ENG

XYLAZINE ZOOVET

Sedative - Analgesic - Anesthetic
Muscle relaxant

Formula: *Xylazine Hydrochloride 2%.*

Indications: *Injectable anesthetic, pre-anesthetic, sedative, muscle relaxant and analgesic.*

Dosage and application route: *Cattle. Intravenous: 0.25 to 0.5 ml every 100 kg bw (0.05 up to 0.1 mg/kg). Intramuscular: 0.5 to 1.5 ml every 100 kg bw (0.1 up to 0.3 mg/kg). Horses: Intravenous: 0.5 ml every 10 kg bw (1 mg/kg). Intramuscular: 1 ml every 10 kg bw (2 mg/kg).*

Presentation: *20 ml vial.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

ESP

DUOSECRETINA INYECTABLE

Colerético - Colagogo - Hipersecretor pancreático y biliar

Fórmula: Menbutona 7%, Ácido Tióctico 0,5%.

Indicaciones: Patologías en las cuales se desea estimular la función del tracto gastrointestinal y/o proteger el tejido hepático de la injuria, o acelerar su recuperación.

Dosis: 0,7 a 1 ml cada 10 kg de peso (7 a 10 mg/kg de Menbutona y 0,35 a 0,5 mg/kg de Ácido Tióctico). Intervalo entre dosis: Cada 12 a 24 horas. Duración del tratamiento: Se recomienda un mínimo de 3 aplicaciones.

Vías de administración: Intramuscular profunda o intravenosa lenta.

Presentación: 100 ml.

ENG

DUOSECRETINA INJECTABLE

Choleretic - Cholagogue - Pancreatic and biliary hypersecretory

Formula: *Menbutone 7%, Thioctic Acid 0.5%.*

Indications: *Pathologies where it is necessary to stimulate the function of the gastrointestinal tract and/or protect the liver tissue from injury, or to speed up its recovery.*

Dosage: *0.7 to 1 ml every 10 kg bw (7 to 10 mg/kg of Menbutone and 0.35 to 0.5 mg/kg of Thioctic Acid). Interval between doses: Every 12 to 24 hours. Treatment duration: At least 3 administrations are recommended.*

Administration: *Deep intramuscular or slow intravenous route.*

Presentation: *100 ml.*

I+D
R&D

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

- ✓ ***La Menbutona actúa en cólicos hepáticos, estomacales e intestinales***
- ✓ ***El Ácido Tióctico es un potente protector hepático***
- ✓ *Menbutone acts in hepatic, stomach and intestinal colics*
- ✓ *Thioctic Acid is a powerful hepatoprotective*

ESP

ENTEROPLUS *CÁPSULAS*

Bacteriostático intestinal

Fórmula: Cada cápsula contiene: Enrofloxacina 100 mg; Ftalilsulfatiazol 500 mg; Carbón Activado 100 mg.

Indicaciones: Tratamiento de enteritis, gastroenteritis y diarreas inespecíficas en porcinos y terneros.

Dosis: 1 cápsula cada 20 kg de peso (5 mg/kg de Enrofloxacina; 25 mg/kg de Ftalilsulfatiazol y 5 mg/kg de Carbón Activado). Intervalo entre dosis: Cada 24 horas. Duración del tratamiento: Un mínimo de 3 días. En caso de Salmonelosis administrar durante 5 días.

Vía de administración: Oral.

Presentación: Exhibidora con 20 blísters con 5 cápsulas cada uno.

ENG

ENTEROPLUS *CAPSULES*

Intestinal bacteriostatic

Formula: *Each capsule contains: Enrofloxacin 100 mg; Phthalylsulfathiazole 500 mg; Activated Charcoal 100 mg.*

Indications: *Treatment of enteritis, gastroenteritis and non-specific diarrhea in swine and calves.*

Dosage: *1 capsule every 20 kg bw (5 mg/kg of Enrofloxacin; 25 mg/kg of Phthalylsulfathiazole and 5 mg/kg of Activated Charcoal). Interval between doses: Every 24 hours. Treatment duration: At least 3 days are recommended. In case of Salmonellosis, administer during 5 days.*

Administration: *Oral.*

Presentation: *In bulk containing 20 blisters with 5 capsules each one.*



CÁPSULAS / *CAPSULES*

- ✓ ***¡24 horas de acción!***
- ✓ ***Formulación antimicrobiana de amplio espectro asociada a un adsorbente gastrointestinal***
- ✓ ***1 cápsula cada 20 kilos***

- ✓ *24 hours action!*
- ✓ *Broad spectrum, antimicrobial formulation, associated to a gastrointestinal adsorbent*
- ✓ *1 capsule every 20 kilos*

ESP

ENTEROPLUS *JARABE*

Bacteriostático intestinal - Antidiarreico

Fórmula: Enrofloxacina 2,5%; Ftalilsulfatiazol 12,5%; Carbón Activado 2,5%; Dimetilpolisiloxano Activado 5%.

Indicaciones: Tratamiento de diarreas polimicrobianas, colibacilosis, enteritis, gastroenteritis y diversas diarreas de origen inespecífico en terneros y porcinos.

Dosis: 1 ml cada 5 kg de peso (5 mg/kg de Enrofloxacina; 25 mg/kg de Ftalilsulfatiazol; 5 mg/kg de Carbón Activado; 10 mg/kg de Dimetilpolisiloxano Activado; 2,5 g/kg de Dextrosa). Intervalo entre dosis: Cada 24 horas. Duración del tratamiento: 3 días, o bien hasta la desaparición de los signos.

Vía de administración: Oral.

Presentación: Frasco por 500 ml.

ENG

ENTEROPLUS *SYRUP*

Intestinal bacteriostatic - Antidiarreheal

Formula: *Enrofloxacin 2.5%; Phthalylsulfathiazole 12.5%; Activated Charcoal; 2.5%; Activated Dimethylpolysiloxane 5%.*

Indications: *Treatment of polymicrobial diarrhea, colibacillosis, enteritis, gastroenteritis and different kinds of diarrhea of unspecific origin in calves and swine.*

Dosage: *1 ml every 5 kg bw (5 mg/kg of Enrofloxacin; 25 mg/kg of Phthalylsulfathiazole; 5 mg/kg of Activated Charcoal; 10 mg/kg of Activated Dimethylpolysiloxane; 2.5 g/kg of Dextrose). Interval between doses: Every 24 hours. Treatment duration: 3 days, or until the symptoms disappear.*

Administration: *Oral.*

Presentation: *500 ml vial.*

I+D
R&D

ORAL */ ORAL ADMINISTRATION*

✓ ***Único antidiarreico concentrado 5 veces, de rápida respuesta clínica y efecto sistémico***
✓ ***Aplicar cada 24 horas***

✓ *Only antidiarrheal concentrated 5 times, fast clinical response and systemic effect*
✓ *Administer every 24 hours*

ESP

ENTERO RELAX DÚO

Analgésico - Espasmolítico

Fórmula: Hioscina Butilbromuro 0,4%, Flunixin Meglumine 2,2%.

Indicaciones: Control de la diarrea, en particular cuando el dolor o malestar abdominal está presente. Control del dolor asociado con la obstrucción urinaria.

Dosis: 1 ml cada 20 kg de peso (0,2 mg/kg de Hioscina Butilbromuro y 1,1 mg/kg de Flunixin Meglumine). Intervalo entre dosis: Cada 24 horas. Duración del tratamiento: 1 a 3 días.

Vías de administración: Intravenosa o intramuscular.

Presentación: Frasco por 50 ml.

ENG

ENTERO RELAX DUO

Analgesic - Spasmolytic

Formula: *Hyoscine Butylbromide 0.4%, Flunixin Meglumine 2.2%.*

Indications: *Control of diarrhea, specially when there is abdominal pain or discomfort. Control of pain associated with urinary obstruction.*

Dosage: *1 ml every 20 kg bw (0.2 mg/kg of Hyoscine Butylbromide, and 1.1 mg/kg of Flunixin Meglumine). Interval between doses: Every 24 hours. Treatment duration: 1 to 3 days.*

Administration: *Intravenous or intramuscular.*

Presentation: *50 ml vial.*

I+D
R&D

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

- ✓ ***Formulación ideal para cólicos y diarreas***
- ✓ ***Para todas las especies***
- ✓ ***Fórmula moderna***
- ✓ *Ideal formulation for cholic and diarrhea*
- ✓ *For all species*
- ✓ *Modern formulation*

ESP

METHIONIL *INYECTABLE*

Protector estimulante y desintoxicante hepático

Fórmula: Acetil Metionina 6 g; Tiamina Clorhidrato 0,30 g; Ácido Tióctico 0,20 g; Sorbitol 21 g; excipientes c.s.p 100 ml.

Indicaciones: Desintoxicante hepatopancreático, estimulante hepático, aumenta la reserva de glucógeno, prevención de cetosis.

Dosis: Bovinos y equinos: 5 a 10 ml cada 100 kg de peso. Porcinos y ovinos: 5 ml cada 10 kg de peso. Intervalo entre dosis: 24 horas. Duración del tratamiento: 5 días consecutivos. Prevención de cetosis: Aplicar 20 ml 7 y 15 días antes del parto. Repetir dosis al momento del mismo.

Vías de administración: Intramuscular profunda o endovenosa lenta.

Restricciones: No posee tiempo de restricción en animales productores de carne/leche para consumo humano.

Presentación: Frasco por 100 ml.

ENG

METHIONIL *INJECTABLE*

Stimulant, protective and hepatic detoxifier

Formula: *Acetyl Methionine 6 g; Thiamine Hydrochloride 0.30 g; Thioctic Acid 0.20 g; Sorbitol 21 g; Excipients q.s. 100 ml.*

Indications: *Hepatopancreatic detoxifier, stimulator of the hepatic activity, it increases the glycogen reserve and prevents Ketosis.*

Dosage: *Cattle and horses: 5 to 10 ml every 100 kg bw. Swine and sheep: 5 ml every 10 kg bw. Interval between doses: Every 24 hours. Treatment duration: 5 consecutive days. To prevent ketosis: Apply 7 and 15 days before parturition 20 ml. Repeat the dose at parturition time.*

Administration: *Deep intramuscular or slow intravenous.*

Restrictions: *There is no restriction time for animals that produce meat or milk for human consumption.*

Presentation: *100 ml vial.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

zoovet

ESP

ALGICAM

Antiinflamatorio - Analgésico - Antipirético

Fórmula: Meloxicam 2%.

Indicaciones: En bovinos: Tratamiento adyuvante de la mastitis e infección respiratoria aguda, tratamiento de la diarrea en terneros; alivio del dolor postoperatorio tras descorne en terneros. En equinos: Tratamiento del dolor y/o inflamación asociados a trastornos músculo-esqueléticos, alivio del dolor en cólico. En porcinos: Tratamiento de trastornos locomotores de origen no infeccioso. Adyuvante en el tratamiento de la septicemia puerperal y toxemia.

Dosis: Bovinos: 2,5 ml cada 100 kg de peso, dosis única. Para el alivio del dolor en descorne, administrar 20 minutos antes. Equinos: 3 ml cada 100 kg de peso en dosis única. En caso de tratamiento de dolor músculo-esquelético se puede realizar una segunda administración después de 24 horas. Porcinos: 2 ml cada 100 kg de peso. Se puede realizar una segunda administración después de 24 horas.

Vías de administración: Intramuscular y endovenosa.

Presentación: Frascos por 20 y 50 ml.

ENG

ALGICAM

Anti-inflammatory - Analgesic - Antipyretic

Formula: *Meloxicam 2%.*

Indications: *It is indicated in: Cattle: Adjuvant treatment of acute mastitis or acute respiratory syndrome; treatment of diarrhea in calves; post-surgical pain relief after dehorning in calves. Horse: Treatment of pain and/ or inflammation associated with musculoskeletal disorders; pain relief in colic. Swine: Treatment of locomotor disorders of non-infectious origin. Adjuvant in the treatment of puerperal septicemia and toxemia.*

Dosage: *Cattle: Administer 2.5 ml every 100 kg bw. Apply as a single dose. In case of administration to relief pain related to dehorning procedures, it is suggested to administer 20 minutes before it. Horse: Administer 3 ml every 100 kg bw as a single dose. In case of treating musculoskeletal pain, a second dose can be administered 24 hours after the first dose. Swine: Administer 2 ml every 100 kg bw. If needed, a second dose can be administered 24 hours after the first dose.*

Administration: *Intramuscular and intravenous*

Presentation: *20 and 50 ml vial.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

- ✓ ***Alta actividad antiinflamatoria***
- ✓ ***Sin reacciones colaterales***
- ✓ ***Muy buena aplicabilidad***
- ✓ ***Todas las especies***
- ✓ ***Excelente para vacas en producción***
- ✓ *High anti-inflammatory activity*
- ✓ *No side effects*
- ✓ *Very good applicability*
- ✓ *For all species*
- ✓ *Excellent for lactating cattle*

ESP

ALGIMINE *ZOOVET*

Antiinflamatorio no esteroide - Analgésico Antipirético

Fórmula: Flunixín Meglumine 5%.

Indicaciones: Inflamaciones del aparato locomotor. Tratamiento del dolor agudo post quirúrgico y traumático. Alivio del dolor visceral en casos de cólicos. Coadyuvante en procesos infecciosos (Metritis/Mastitis/Agalactia de los porcinos). Infecciones del aparato respiratorio y diarreas neonatales de los terneros, mastitis aguda por coliformes y shock endotóxico.

Dosis: Bovinos y porcinos: 1 ml cada 23 kg de peso (2,2 mg/kg). En diarreas neonatales: 2 a 3 ml por ternero. Equinos: 1 ml cada 45 kg de peso (1,1 mg/kg). Intervalo entre dosis: Puede repetirse cada 24 horas. Duración del tratamiento: No más de 3 días consecutivos.

Vías de administración: Intramuscular o endovenosa.

Presentación: Frascos por 25, 50, 100 y 250 ml.

ENG

ALGIMINE *ZOOVET*

Non-steroidal anti-inflammatory - Analgesic Antipyretic

Formula: *Flunixin Meglumine 5%.*

Indications: *Musculoskeletal system inflammations. Treatment of acute post-surgical and traumatic pain. Relief of visceral pain in case of colics. Adjuvant in infectious processes. (Metritis/Mastitis/Agalactia in swine). Respiratory tract infections, and neonatal diarrheas in calves, acute mastitis caused by coliforms and endo toxic shock.*

Dosage: *Cattle and swine: 1 ml every 23 kg bw (2.2 mg/kg). In neonatal diarrheas: 2 to 3 ml per calf. Horses: 1 ml every 45 kg bw (1.1 mg/kg). Interval between doses: It can be repeated every 24 hours. Treatment duration: No more than 3 consecutive days.*

Administration routes: *Intramuscular or intravenous.*

Presentation: *25, 50, 100 and 250 ml vials.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

ESP

ALGITOCINA

Antiinflamatorio no esteroide - Hormonal

Fórmula: Oxitocina 400 UI; Flunixín Meglumine 11 g, excipientes c.s.p. 100 ml.

Indicaciones: Tratamiento y/o coadyuvante en mastitis agudas que cursan con agalactia en bovinos y porcinos. Tratamiento coadyuvante en casos de metritis post parto.

Dosis: Bovinos: Metritis post-parto: 1 ml cada 50 kg de peso cada 24 horas durante 3 días consecutivos, vía endovenosa (*). Mastitis agudas: 5 ml totales. Se puede repetir a las 8 horas en caso de remitir los signos, vía endovenosa(*). Porcinos: Metritis post-parto y Mastitis agudas: 5 ml totales cada 12 horas, 2 dosis consecutivas como máximo, vía endovenosa o intramuscular(*). Equinos: Metritis post-parto: 1 ml cada 100 kg de peso. cada 24 horas durante 3 días consecutivos, vía endovenosa o intramuscular(*).
(*) Para equivalencias, ver envase del producto.

Presentación: Frasco por 100 ml.

ENG

ALGITOCINA

Non-steroidal anti-inflammatory - Hormone

Formula: *Oxytocin 400 IU; Flunixin Meglumine 11 g, excipients q.s. 100 ml.*

Indications: *Treatment and/or adjuvant in acute mastitis that produce agalactia in cattle and swine. Adjuvant treatment in cases of post-parturition metritis.*

Dosage: *Cattle: Post-parturition metritis: 1 ml every 50 kg bw every 24 hours during 3 consecutive days, by intravenous route(*). Acute mastitis: a total of 5 ml. It can be repeated at 8 hours in case of symptom remission, by intravenous route (*). Swine: Post-parturition metritis and acute Mastitis: A total of 5 ml every 12 hours, a maximum of 2 consecutive doses, by intravenous or intramuscular route(*). Horses: Post-parturition metritis: 1 ml every 100 kg bw every 24 hours during 3 consecutive days, by intravenous or intramuscular route (*).*
(*) For equivalences, see product package.

Presentation: *100 ml vial.*

I+D
R&D

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

✓ ***Novedoso y único tratamiento preventivo-curativo de mastitis y metritis***

✓ *Novel and unique treatment to prevent and cure mastitis and metritis*

ESP

DEXA 21-VET

Antiinflamatorio esteroide - Antialérgico

Fórmula: Dexametasona Fosfato Sódico 0,2%.

Indicaciones: Manifestaciones alérgicas o inflamatorias de diversa índole.

Dosis: En casos de shock: 2,2 - 4,4 mg/kg vía endovenosa. Dosis antiinflamatorias sugeridas: Equinos, bovinos, ovinos y porcinos: 1,25 a 5 ml cada 50 kg de peso (0,05 a 0,2 mg/kg). Intervalo entre dosis: Puede repetirse a las 24 horas en caso de ser necesario, según criterio del profesional actuante.

Vías de administración: Intramuscular, subcutánea o endovenosa.

Presentación: Frasco por 100 ml, pack de 5 frascos por 20 ml y pack de 25 frascos por 10 ml.

ENG

DEXA 21-VET

Steroidal anti-inflammatory and antiallergic

Formula: *Dexamethasone Sodium Phosphate 0.2%.*

Indications: *Allergic and inflammatory manifestations from different sources.*

Dosage: *In case of shock: 2.2 - 4.4 mg/kg by intravenous route. Anti-inflammatory dosage suggested: Horses, cattle, sheep and swine: 1.25 to 5 ml every 50 kg bw (0.05 to 0.2 mg/kg). Interval between doses: It can be repeated in 24 hours in case of need, according to professional criterion.*

Administration: *Intramuscular, subcutaneous or intravenous.*

Presentation: *100 ml vial; pack with 5 vials x 20 ml; pack with 25 vials x 10 ml.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

ESP

DUO-DEXA-FENAC

Tratamiento de la inflamación
Antiinflamatorio

Fórmula: Dexametasona Fosfato Sódico 0,2%; Diclofenac Sódico 5%.

Indicaciones: Patologías inflamatorias, dolorosas y/o hipertermias. En bovinos y ovinos: Patologías podales o respiratorias, metritis post parto, mastitis aguda o hiperaguda, prevención y tratamiento del dolor post quirúrgico, etc. En equinos: Artritis, bursitis, tendinitis, mialgias, como antipirético junto a tratamiento antibiótico en procesos infecciosos, etc. En porcinos: Procesos inflamatorios pulmonares, podales y enteritis, etc.

Dosis: En todas las especies: 1 ml cada 20 kg de peso (0,1mg/kg de Dexametasona 21 fosfato y 2,5 mg/kg de Diclofenac sódico). Intervalo entre dosis: Cada 24 horas. Duración del tratamiento: 1 a 3 dosis, dependiendo su continuidad al tipo de patología a tratar y del criterio del profesional veterinario.

Vía de administración: Intramuscular profunda.

Presentación: Frasco por 100 ml.

ENG

DUO-DEXA-FENAC

Inflammation treatment - Anti-inflamatory

Formula: *Dexamethasone Sodium Phosphate 0.2%; Diclofenac Sodium 5%.*

Indications: *Inflammatory, painful pathologies and/or hyperthermia. In cattle and sheep: Foot or respiratory pathologies, post-parturition metritis, acute or hyper acute mastitis, prevention and treatment of post-surgical pain, etc. In horses: Arthritis, bursitis, tendinitis, myalgias, as antipyretic along with antibiotic treatment in infectious processes, etc. In swine: Inflammatory, pulmonary and foot processes, enteritis, etc.*

Dosage: *In all species: 1 ml every 20 kg bw (0.1 mg/kg of Dexamethasone 21 phosphate and 2.5 mg/kg of Sodium Diclofenac). Interval between doses: Every 24 hours. Treatment duration: 1 to 3 doses, depending on the continuity of the pathology to treat, and the veterinarian criterion.*

Administration: *Deep intramuscular.*

Presentation: *100 ml vial.*

I+D
R&D

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

✓ ***Único en Argentina, rápida acción analgésica y antiinflamatoria***

✓ *Unique in Argentina, fast analgesic and anti-inflammatory action*

ESP

EDEMAX

Antiinflamatorio esteroide - Diurético

Fórmula: Dexametasona Fosfato Sódico 0,06%, Triclormetiazida 1%.

Indicaciones: Bovinos y ovinos: Congestión y edema de ubre. Persistencia del edema de lactación. Edema y congestión pulmonar. Edema de manifestaciones alérgicas. Infiltración edematosa de heridas quirúrgicas. Equinos: Congestión y edema de origen diverso. Edema de declive. Edema de manifestaciones alérgicas.

Dosis: Clínica general: Bovinos, ovinos y equinos: 0,5 ml cada 20 kg de peso. Intervalo entre dosis: Cada 24 horas. En edema de ubre: 10 a 20 ml totales. Intervalo entre dosis: Cada 24 horas. Duración del tratamiento: 1 vez en caso de ser necesario.

Vía de administración: Intramuscular.

Presentación: Frasco ampolla por 30 ml.

Exportación: Frasco ampolla por 15 ml.

ENG

EDEMAX

Steroidal anti-inflammatory - Diuretic

Formula: *Dexamethasone Sodium Phosphate 0.06%, Trichlormethiazide 1%.*

Indications: *Cattle and sheep: Udder congestion and edema. Persistence of lactation edema. Pulmonary edema and congestion. Edema as allergic sign. Edematous infiltration in surgical wounds. Horses: Congestion and edema from different sources. Descent edema. Edema as allergic sign.*

Dosage: *General clinic: Cattle, sheep and horses: 0.5 ml every 20 kg bw. Interval between doses: Every 24 hours. In udder edema: A total of 10 to 20 ml. Interval between doses: Every 24 hours. Treatment duration: Once, if necessary.*

Administration: *Intramuscular.*

Presentation: *30 ml vial.*

For export: 15 ml vial.

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

✓ ***Combinación de antiinflamatorio y diuretico de excelencia***
✓ *Excellent combination of anti-inflammatory and diuretic*

ESP

TRIAVET

Antiinflamatorio esteroide inyectable de depósito

Fórmula: Acetónido de Triamcinolona 0,6%.

Indicaciones: Afecciones cutáneas, prurito, eczemas, urticaria. Afecciones osteomusculares. Afecciones oculares.

Dosis: Equinos: Aplicación intramuscular o subcutánea: 0,35 a 0,7 ml cada 100 kg de peso (0,02 a 0,04 mg/kg). Aplicación intraarticular o intrasinovial: 6 a 18 mg totales.
Dosis orientativas, pueden modificarse según criterio del profesional actuante. Duración del tratamiento: Puede repetirse a los 15 días de la primera aplicación. Vía intrasinovial en equinos: Puede repetirse después de 3 a 4 días.

Vías de administración: Intramuscular, subcutáneo, intraarticular o intrasinovial.

Presentación: Frasco por 20 y 50 ml.

ENG

TRIAVET

Long acting steroidal anti-inflamatory

Formula: *Triamcinolone Acetonide 0.6%.*

Indications: *Skin conditions, itchiness, eczemas, hives. Ostheomuscular conditions. Ocular disorders.*

Dosage: *Horses: Intramuscular or subcutaneous application: 0.35 to 0.7 ml every 100 kg bw (0.02 to 0.04 mg/kg). Intraarticular or intrasynovial application: A total of 6 to 18 mg. Orientative dose, it can be modified according to the acting professional criterion. Treatment duration: It can be repeated at 15 days of the first application. Intrasynovial route in horses: It can be repeated after 3 to 4 days.*

Administration: *Intramuscular, subcutaneous, intraarticular or intrasynovial.*

Presentation: *20 and 50 ml vial.*

SUSPENSIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SUSPENSION

zoovet

ESP

DRM 1%

Antiparasitario interno y externo

Fórmula: Doramectina 1%.

Indicaciones: Endectocida destinado a combatir los parásitos de los bovinos y ovinos. Nematodes gastrointestinales. Nematodes pulmonares: Ectoparásitos: Sarna. Piojos chupadores. Miasis. Miasis monocavitarias. Ura. Ayuda al control de piojos masticadores. Y garrapata común del ganado Rhipicephalus microplus.

Dosis: Bovinos: 1 ml cada 50 kg de peso (200 mcg/kg). Ovinos: 1 ml cada 30 kg de peso (333 mcg/kg). Duración del tratamiento: Dosis única o según criterio profesional veterinario.

Vía de administración: Subcutánea.

Presentación: Frasco por 50 ml y 500 ml.

ENG

DRM 1%

Internal y external antiparasitic

Formula: *Doramectin 1%.*

Indications: *Endectocide intended to combat parasites in cattle and sheep. Gastrointestinal nematodes. Pulmonary nematodes. Ectoparasites: Scabies. Sucking lice. Myiasis. Monocavitary myiasis. It helps to control chewing lice. And cattle ordinary ticks Rhipicephalus microplus.*

Dosage: *Cattle: 1 ml every 50 kg bw (200 mcg/kg). Sheep: 1 ml every 30 kg bw (333 mcg/kg). Treatment duration: Single dose or according to the veterinarian criterion.*

Administration: *Subcutaneous.*

Presentation: *50 and 500 ml vials.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

- ✓ ***Aprobado por SENASA como garrapaticida***
- ✓ ***Retiro pre-faena en bovinos ¡35 días!***
- ✓ *Approved by SENASA as tick-killer agent*
- ✓ *Pre-slaughter withdrawal in cattle: 35 days!*

ESP

ENDECTION 3,15%

Endectocida de acción persistente

Fórmula: Ivermectina 3,15 %, excipiente oleoso.

Indicaciones: Tratamiento de parásitos gastrointestinales y pulmonares. Sarna. Piojos chupadores y masticadores. Miasis. Garrapaticida.

Dosis: Bovinos: 1 ml por cada 50 kg de peso (630 mcg/ kg). Intervalo entre dosis y duración del tratamiento: Dosis única o según criterio profesional veterinario. Zona de control: Cada 44 días (poder residual relativo). Zona Indemne: Para atención de focos según la administración, supervisión e indicación de SENASA: Cada 32 días (Poder residual absoluto).

Vía de administración: Subcutánea.

Presentación: Frasco por 500 ml.

ENG

ENDECTION 3.15%

Persistent action endectocide

Formula: *Ivermectin 3.15 %, oily excipient.*

Indications: *Treatment of gastrointestinal and bronchopulmonary parasites. Scabies. Sucking and chewing lice. Myiasis. Tick-killer agent.*

Dosage: *Cattle: 1 ml every 50 kg bw (630 mcg/kg). Interval between doses and treatment duration: Single dose or according to the veterinarian criterion. Control area: Every 44 days (relative residual effect) Harmless area: For the attention of focal problems, according to SENASA administration, oversight and indication: Every 32 days (absolute residual effect).*

Administration: *Subcutaneous.*

Presentation: *500 ml vial.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

- ✓ ***Aprobado por SENASA como garrapaticida***
- ✓ ***Aprobado por SENASA para limpieza de campos***
- ✓ *Approved by SENASA as tick-killer agent*
- ✓ *Approved by SENASA for field clean-up*

ESP

ENDECTOMICIN ADE 4%

Endectocida - Suplemento vitamínico de acción persistente

Fórmula: Ivermectina 4%, Vitamina A Palmitato 6%; Vitamina D3 0,05%; Vitamina E Acetato 1,5%.

Indicaciones: Tratamiento de parásitos gastrointestinales y pulmonares. Sarna. Piojos chupadores. Miasis. Garrapaticida.

Dosis: Bovinos: 1 ml por cada 50 kg de peso (800 mcg de Ivermectina/kg; 102.000 UI de Vitamina A Palmitato; 20.000 UI de Vitamina D3; 15 UI de Vitamina E Acetato). Ovinos: 1 ml cada 30 kg de peso (1,33 mg/kg de Ivermectina; 3.400 UI/kg de Vitamina A Palmitato; 666 UI/kg de Vitamina D3; 0,5 UI/kg de Vitamina E Acetato.) Duración del tratamiento: Dosis única o según criterio profesional veterinario.

Vía de administración: Subcutánea.

Presentación: Frasco por 50, 100 y 500 ml.

ENG

ENDECTOMICIN ADE 4%

Endectocide - Persistent action vitamin supplement

Formula: *Ivermectin 4%, Vitamin A Palmitate 6%; Vitamin D3 0.05%; Vitamin E Acetate 1.5%.*

Indications: *Treatment of gastrointestinal and bronchopulmonary parasitosis. Scabies. Sucking lice. Myiasis. Tick-killer agent.*

Dosage: *Cattle: 1 ml every 50 kg bw (800 mcg of Ivermectin/kg; 102,000 IU of Vitamin A Palmitate; 20,000 IU of Vitamin D3; 15 IU of Vitamin E Acetate). Sheep: 1 ml every 30 kg bw (1.33 mcg of Ivermectin/kg; 3,400 IU of Vitamin A Palmitate; 666 IU of Vitamin D3; 0.5 IU of Vitamin E Acetate). Treatment duration: Single dose or according to the veterinarian criterion.*

Administration: *Subcutaneous.*

Presentation: *50, 100 and 500 ml vials.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

- ✓ ***¡Ivermectina de mayor concentración aprobada en Argentina!***
- ✓ ***Aprobado por SENASA como garrapaticida***
- ✓ ***Retiro pre-faena en bovinos ¡54 días!***
- ✓ *Most concentrated Ivermectin approved in Argentina!*
- ✓ *Approved by SENASA as tick-killer agent*
- ✓ *Pre-slaughter withdrawal: 54 days!*

ESP

INJECTION I

Antiparasitario interno y externo inyectable

Fórmula: Ivermectina 1%.

Indicaciones: Para el tratamiento y control de: Nematodes gastrointestinales, gusanos pulmonares, ácaros de la sarna, piojos, miasis y ura.

Dosis: Bovinos y camélidos: 1 ml cada 50 kg de peso (200 mcg/kg). Cerdos: 1 ml cada 33 kg de peso (300 mcg/kg). Duración del tratamiento: Dosis única o según criterio profesional veterinario.

Vía de administración: Subcutánea.

Presentación: Frascos por 50 y 500 ml.
Exportación: Frasco por 100 ml.

ENG

INJECTION I

Internal and external injectable antiparasitic

Formula: *Ivermectin 1%.*

Indications: *For the treatment and control of: Gastrointestinal nematodes, pulmonary worms, scabies mites, lice, myiasis and bot fly.*

Dosage: *Cattle and camelids: 1 ml every 50 kg bw (200 mcg/kg). Swine: 1 ml every 33 kg bw (300 mcg/kg). Treatment duration: Single dose or according to the veterinarian criterion.*

Administration: *Subcutaneous.*

Presentation: *50 and 500 ml vials.*
For export: 100 ml vial.

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

ESP

IVERMEX JGA

Endectocida oral saborizado

Fórmula: Ivermectina 1%.

Indicaciones: Tratamiento de parasitosis por nematodes y gastrófilos en equinos. Tratamiento de "llagas de verano" producidas por Draschia spp. y/o Habronema spp.

Dosis: 2 ml cada 100 kg de peso (200 mcg/kg). Duración del tratamiento: Dosis única o según criterio profesional veterinario.

Vía de administración: Oral.

Presentación: Jeringa dosificadora por 12 ml (600 kilos).

ENG

IVERMEX JGA

Oral flavored endectocide

Formula: *Ivermectin 1%.*

Indications: *Treatment of parasitosis by nematodes and bot flies in horses. Treatment of "summer sores" produced by Draschia spp. and/or Habronema spp.*

Dosage: *2 ml every 100 kg bw (200 mcg/kg). Treatment duration: Single dose or according to the veterinarian criterion.*

Administration: *Oral.*

Presentation: *12 ml dosing syringe (600 kg).*

ORAL
ORAL ADMINISTRATION

- ***¡Sabor manzana!***
- *Apple flavor!*

ESP

IVERMEX PLUS

Endectocida oral saborizado

Fórmula: Ivermectina 1%, Praziquantel 5%.

Indicaciones: Tratamiento de endoparasitosis por nematodes, cestodes y gastrófilos en equinos. Tratamiento de "llagas de verano" producidas por Draschia spp. y/o Habronema spp.

Dosis: 2 ml cada 100 kg de peso (200 mcg/kg de Ivermectina y 1 mg/kg de Praziquantel). Duración del tratamiento: Dosis única o según criterio profesional veterinario.

Vía de administración: Oral.

Presentación: Jeringa dosificadora de 12 ml (600 kilos).

ENG

IVERMEX PLUS

Flavored oral endectocide

Formula: *Ivermectin 1%, Praziquantel 5%.*

Indications: *Treatment of internal parasitosis by nematodes, cestodes and bot flies in horses. Treatment of "summer sores" produced by Draschia spp. and/or Habronema spp.*

Dosage: *2 ml every 100 kg bw (200 mcg/kg of Ivermectin and 1 mg/kg of Praziquantel). Treatment duration: Single dose or according to the veterinarian criterion.*

Administration: *Oral.*

Presentation: *12 ml dosing syringe (600 kg).*

ORAL
ORAL ADMINISTRATION

ESP

VAQUERO POUR ON

Garrapaticida - Piojicida - Endectocida

Fórmula: Fipronil 2%, Ivermectina 1%.

Indicaciones: Tratamiento de parasitosis externas generadas por garrapatas, piojos y mosca de los cuernos. Tratamiento de la gastroenteritis verminosa bovina producida por Cooperia spp., Haemonchus spp., Ostertagia spp. y Trichostrongylus spp. Uso en bovinos.

Dosis: Aplicar sobre la línea dorsal del animal 1 ml cada 20 kg de peso. Esta dosis es equivalente a 1 mg/kg de Fipronil y 500 µg/kg de Ivermectina. Intervalo entre dosis: Para control de garrapatas: Poder residual absoluto de 20 días; intervalo entre dosis: 32 días. Para control de piojos: un solo tratamiento es suficiente para controlar la parasitosis presente (adultos, estadios intermedios y huevos), evitando la re infestación. Mosca de los cuernos: 28 días.

Administración: Aplicación externa (Pour-on).

Restricciones de uso: Tiempo de retiro pre faena: 50 días.

Presentación: Bidón de 1000 ml con autodosificador y bidón de 5000 ml.

ENG

VAQUERO POUR ON

Tickicide - Lice killer - Endectocide

Formula: *Fipronil 2%, Ivermectin 1%.*

Indications: *Treatment of external parasitosis generated by ticks, lice and horn fly. Treatment of bovine verminous gastroenteritis produced by Cooperia spp., Haemonchus spp., Ostertagia spp. and Trichostrongylus spp. Use in cattle.*

Dosage: *Apply on the dorsal line of the animal, 1 ml every 20 kg bw. This dose is equivalent to 1 mg/kg of Fipronil and 500 µg /kg of Ivermectin. Interval between doses: For Tick control: Absolute residual power of 20 days; interval between doses: 32 days. For lice control: a single treatment is enough to control the present parasitosis (adults, intermediate stages and eggs), avoiding re infestation. Horn fly: 28 days.*

Administration: *External application (Pour on).*

Restrictions: *Pre-slaughter: 50 days.*

Presentation: *1000 ml and 5000 ml plastic pack.*

- ***El mejor producto para eliminar las garrapatas***
- ***Rinde el doble***
- ***Apto despacho a zona limpia***
- ***Único y el mejor***
- ***Aprobado por SENASA para limpieza de campos***

- *The best product to eliminate ticks*
- *It lasts the double*
- *Suitable for dispatch to clean areas*
- *Unique and the best*
- *Approved by SENASA for field clean-up*

zoovet

ESP

APLICADOR PRO-CICLAR P4 ZOOVET

Es un implemento especialmente diseñado para una fácil aplicación de los dispositivos intravaginales Pro Ciclar P4 Zoovet.

- Su material de elaboración lo hace fácilmente esterilizable con amonios cuaternarios (A4 Zoovet).
- Posee mango anatómico antideslizante.
- Posee freno de armado que permite su manipulación sin que se caiga el émbolo luego de su preparación antes de la aplicación.
- Su diámetro adecuado hace que la aplicación en vaquillonas sea adecuada y humanitaria.
- Bajo costo y resistente al trato riguroso.
- Su versatilidad hace que sea el más indicado para el uso a campo.

ENG

PRO-CICLAR P4 ZOOVET APPLICATOR

It is a gadget specially designed for an easy application of the intravaginal devices Pro Ciclar P4 Zoovet.
- Component material that is easily sterilized with quaternary ammonium (A4 Zoovet).
- Anatomic, non-skid handle.
- Assembly brake that allows manipulation while preventing the plunger from falling after the preparation prior to application.
- Adequate diameter that allows proper and humanitarian application in young cows.
- Low cost and resistance to harsh handling.
- Its versatility makes it the most indicated applicator to be used in the field.

¡NUEVO APLICADOR!
NEW APPLICATOR!

ESP

BENZOATO DE ESTRADIOL
ZOOVET

Hormonal

Fórmula: Benzoato de Estradiol 0,1%.

Indicaciones: Expulsión de placenta retenida, piómetra, inducción del celo, sincronización del celo, y en toda otra situación que amerite el tratamiento con estrógenos en bovinos.

Dosis: Bovinos: Se debe administrar 1 a 2,5 ml (1 a 2,5 mg) por animal a tratar, según la patología. Duración del tratamiento: Según criterio profesional veterinario.

Vía de administración: Intramuscular.

Presentación: Frasco por 100 ml.

Exportación: Frascos por 10 y 50 ml.

ENG

*ZOOVET **ESTRADIOL BENZOATE***

Hormonal

***Formula:** Estradiol Benzoate 0.1%.*

***Indications:** Release of retained placenta, pyometra, estrus induction and synchronization, and any other situation where estrogen treatment in cattle is required.*

***Dosage:** Cattle: Administer 1 to 2.5 ml (1 to 2.5 mg) per animal to be treated, according to its pathology. Treatment duration: According to the veterinarian criterion.*

***Administration:** Intramuscular.*

***Presentation:** 100 ml vial.*

Export: 10 y 50 ml vials.

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

ESP

BENZOATO ZOOVET 0,65%

Hormonal

Fórmula: Benzoato de Estradiol 0,65%.

Indicaciones: Tratamiento de endometritis post parto y toda otra situación que amerite el tratamiento con estrógenos en bovinos. Uso terapéutico y reproductivo únicamente.

Dosis: Bovinos: Se debe administrar 1 a 1,5 ml (6,5 a 9,75 mg) por animal, según la patología a tratar. Duración del tratamiento: Dosis única o según criterio profesional veterinario.

Vía de administración: Intramuscular y subcutánea.

Presentación: Frasco por 100 ml.

ENG

BENZOATE ZOOVET 0.65%

Hormonal

Formula: *Estradiol Benzoate 0.65%.*

Indications: *Treatment of post-parturition endometritis, and any other situation where estrogen treatment in cattle is required. Therapeutic and reproductive use only.*

Dosage: *Cattle: Administer 1 to 1.5 ml (6.5 to 9.75 mg) per animal, according to the pathology to treat. Treatment duration: Single dose or according to the veterinarian criterion.*

Administration: *Intramuscular and subcutaneous.*

Presentation: *100 ml vial.*

I+D
R&D

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

ESP

BUSERELINA *ZOOVET*

Análogo de hormona liberadora de gonadotropinas

Fórmula: Buserelina Acetato 0,0042 mg/ml, equivalente a 0,0004% de Buserelina.

Indicaciones: Inducción de la ovulación, tanto en caso de desórdenes ováricos (ej: quistes), como en programas de mejoramiento de los índices de concepción. No usar en hembras preñadas.

Dosis: Bovinos: Ovulación retardada, atresia folicular, IATF: 2,5 ml (0,01 mg). Tratamiento de quistes foliculares y atresia: 5 ml (0,02 mg). Equinos: Alteraciones quísticas de los ovarios, aciclia, inducción de la ovulación: 10 ml (0,04 mg). Duración del tratamiento: Dosis única o según criterio profesional veterinario.

Vías de administración: Intramuscular profunda, subcutánea o intravenosa. En equinos utilizar preferentemente la vía intravenosa.

Presentación: Frasco por 50 ml.

Exportación: Frasco por 25 ml.

ENG

BUSERELINA *ZOOVET*

Gonadotropin - Releasing hormone analogue

Formula: *Buserelin Acetate 0.0042 mg/ml, equivalent to 0.0004% of Buserelin.*

Indications: *Ovulation induction, in case of ovarian disorders (example: cyst), as well as in programs intended to improve conception rates. Do not use in pregnant females.*

Dosage: *Cattle: Delayed ovulation, follicular atresia, FTAI: 2.5 ml (0.01 mg). Treatment of follicular cysts and atresia: 5 ml (0.02 mg). Horses: Cystic ovarian alterations, aciclia, ovulation induction: 10 ml (0.04 mg). Treatment duration: Single dose or according to veterinarian criterion.*

Administration: *Deep intramuscular, subcutaneous or intravenous. In horses, the intravenous route is preferred.*

Presentation: *50 ml vial.*

Export: 25 ml vial.

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

ESP

CICLAR

Prostaglandina sintética - Agente luteolítico

Fórmula: D+Cloprostenol 0,0075%.

Indicaciones: Sincronización del celo. Desórdenes funcionales del ciclo estral. Desórdenes funcionales de los ovarios, como quistes foliculares o luteales. Patologías uterinas post parto (piómetras, endometritis crónicas). Interrupción de la gestación no deseada (sólo en el primer tercio de la misma).

Dosis: Bovinos: 2 ml por animal (0,150 mg). Porcinos: 1 ml por animal (0,075 mg). Ovinos: 0,5 ml por animal (0,0375 mg). Duración del tratamiento: Dosis única.

Vía de administración: Intramuscular.

Presentación: Frasco por 20 ml y 50 ml.

Exportación: Caja de 10 frascos por 2 ml.

ENG

CICLAR

Synthetic prostaglandine - Luteolytic agent

Formula: *D+Cloprostenol 0.0075%.*

Indications: *Estrus synchronization. Functional disorders during the estrous cycle. Functional ovarian disorders such as follicular or luteal cysts. Post-parturition uterine pathologies (pyometra, chronic endometritis). Interruption of un-wanted pregnancy (only during the first third).*

Dosage: *Cattle: 2 ml per animal (0.150 mg). Swine: 1 ml per animal (0.075 mg). Sheep: 0.5 ml per animal (0.0375 mg). Treatment duration: Single dose.*

Administration: *Intramuscular.*

Presentation: *20 and 50 ml vials.*

For export: Box containing 10 vials of 2 ml.

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

ESP

CIPIONATO *ZOOVET*

Hormonal

Fórmula: Cipionato de Estradiol 0,1%.

Indicaciones: Corrección del anestro, tratamiento de cuerpos lúteos persistentes, piómetras, expulsión de placenta y fetos retenidos. En vacas y vaquillonas se utiliza para sincronización de celo en programas de IATF. Interrupción de la gestación.

Dosis: Bovinos: Anestro: 3 a 5 ml, (3 a 5 mg). Piómetra, expulsión de placenta y fetos retenidos: 10 ml (10 mg). Cuerpo lúteo persistente: 4 ml (4 mg). Interrupción de la preñez: 4 a 8 ml (4 a 8 mg), aplicados en el 4° día del servicio o 20 ml (20 mg) aplicados entre el 4º a 7º mes de gestación. Sincronización de celo en IATF: 1 ml (1 mg) al retirar el dispositivo de progesterona y aplicar prostaglandina. Equinos: Anestro: 5 a 10 ml (5 a 10 mg). Ovinos y porcinos: Anestro: 0,5 a 1 ml (0,1 a 1 mg). Siempre referido a dosis total.

Vía de administración: Intramuscular.

Presentación: Frasco por 50 ml.

Exportación: Frasco por 25 ml.

ENG

CYPIONATE *ZOOVET*

Hormonal

Formula: *Estradiol Cypionate 0.1%.*

Indications: *Anestrus correction, persistent corpus luteum treatment, pyometras, placenta release and retained fetus. In young and adult cows, it is used for estrus synchronization in FTAI programs. Pregnancy interruption.*

Dosage: *Cattle: Anestrus: 3 to 5 ml (3 to 5 mg). Pyometra, placenta released and retained fetus: 10 ml (10 mg). Persistent Corpus Luteum: 4 ml (4 mg). Pregnancy interruption: 4 to 8 ml (4 to 8 mg), applied on the 4th. day of natural service or 20 ml (20 mg) applied between the 4th. and the 7th. pregnancy month. Estrus synchronization in FTAI: 1 ml (1 mg) when you remove the progesterone device and apply prostaglandin. Horses: Anestrus: 5 to 10 ml (5 to 10 mg). Sheep and swine: Anestrus: 0.5 to 1 ml (0.1 to 1 mg). Always referring to the total dose.*

Administration: *Intramuscular.*

Presentation: *50 ml vial.*

Export: 25 ml vial.

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

ESP

CONTRACTINA *ZOOVET*

Hormonal

Fórmula: Oxitocina 1.000 UI, excipiente c.s.p. 100 ml.

Indicaciones: Inercia uterina, endometritis, piómetra, retención de placenta. Coadyuvante en la involución uterina y control de hemorragias post-parto. Agalactia por estrés, mastitis u otras.

Dosis: Porcinos: Inductor de la motilidad uterina: 0,5 a 3 ml (5 a 30 UI de Oxitocina). Para agalactia: 0,5 a 2 ml (5 a 20 UI de Oxitocina). Equinos: Inductor de la motilidad uterina: 0,5 a 5 ml (5 a 50 UI de Oxitocina). Para agalactia: 1 a 2 ml (10 a 20 UI de Oxitocina). Ovinos y caprinos: Inductor de la motilidad uterina: 0,5 a 3 ml (5 a 30 UI de Oxitocina). Para agalactia: 0,5 a 2 ml (5 a 20 UI de Oxitocina). Bovinos: Inductor de la motilidad uterina: 1 a 5 ml (10 a 50 UI de Oxitocina). Para agalactia: 1 a 2 ml (10 a 20 UI de Oxitocina). Duración del tratamiento: Dosis única. Puede repetirse a los 30 minutos.

Vía de administración: Intramuscular.

Presentación: Frasco por 50 ml.

ENG

CONTRACTINA *ZOOVET*

Hormonal

Formula: *Oxytocin 1,000 IU, excipient q.s.100 ml.*

Indications: *Uterine inertia, endometritis, pyometra, placenta retention. Adjuvant in uterine involution, and hemorrhage control post parturition. Agalactia due to stress, mastitis or others.*

Dosage: *Swine: Uterine motility inducer: 0.5 to 3 ml (5 to 30 IU of Oxytocin). For agalactia: 0.5 to 2 ml (5 to 20 IU of Oxytocin). Horses: Uterine motility inducer: 0.5 to 5 ml (5 to 50 IU of Oxytocin). For agalactia: 1 to 2 ml (10 to 20 IU of Oxytocin). Sheep and goats: Uterine motility inducer: 0.5 to 3 ml (5 to 30 IU of Oxytocin). For agalactia: 0.5 to 2 ml (5 to 20 IU of Oxytocin). Cattle: Uterine motility inducer: 1 to 5 ml (10 to 50 IU of Oxytocin). For agalactia: 1 to 2 ml (10 to 20 IU of Oxytocin). Treatment duration: Single dose. It can be repeated at 30 minutes.*

Administration: *Intramuscular.*

Presentation: *50 ml vial.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

ESP

CUT 5

Dispositivo intravaginal

Fórmula: Cada dispositivo contiene: Progesterona Micronizada 5 g.

Indicaciones: Actúa inhibiendo el ciclo estral en animales no destinados a la reproducción. Mejora la ganancia de peso y el rendimiento en carne.

Dosis: Utilizar un dispositivo por animal, en anestro. Intervalo entre dosis y duración del tratamiento: Se puede reemplazar por otro dispositivo entre los 60 y 120 días, cuando la vaca presenta nuevo celo.

Forma de aplicación: Colocar el dispositivo en el aplicador, desinfectar en soluciones de amonio cuaternario al 0,5%, realizar higiene de la zona perivulvar y aplicar intravaginalmente.

Presentación: Bolsa doy pack con 10 dispositivos.

ENG

CUT 5

Intravaginal device

Formula: *Each device contains: Micronized Progesterone 5 g.*

Indications: *It acts by inhibiting the estrous cycle in animals not intended for reproduction. It improves weight gain and meat yield.*

Dosage: *Use one device per animal, in anestrus. Interval between doses and treatment duration: The device can be replaced by a new one between 60 and 120 days, when the cow gets into new estrus.*

Application method: *Place the device in the applicator, disinfect with quaternary ammonium at 0.5%, perform hygiene around the vulva and apply intravaginally.*

Presentation: *Doypack with 10 devices.*

I+D
R&D

DISPOSITIVO INTRAVAGINAL
INTRAVAGINAL DEVICE

- ✓ ***Ideal para castrar vacas químicamente***
- ✓ ***Dura 90-120 días***
- ✓ ***No se cae***
- ✓ ***No hay celo***
- ✓ *Ideal for chemical castration*
- ✓ *It lasts 90-120 days*
- ✓ *It does not fall*
- ✓ *Estrus does not appear*

ESP

DIPROGEST 600
DIPROGEST 1200
PROCIGEST 600/1200

Dispositivo Intravaginal

Fórmula: Cada dispositivo contiene:
Diprogest 1200: Progesterona 1,2 g.
Diprogest 600: Progesterona 0,6 g.

Indicaciones: Sincronización del celo en vacas y vaquillonas. Sincronización de celos para programas de IATF.

Forma de aplicación y dosis: Utilizando guantes de látex, tomar el dispositivo y colocarlo en el aplicador, desinfectar en soluciones de amonio cuaternario al 0,5%, realizar higiene de la zona perivulvar y aplicar intravaginalmente.

Restricciones: Retiro pre-ordeño: 0 días. Retiro pre-faena: 0 días.

Presentación: Bolsa doy pack con 10 dispositivos de 600 mg o 1200 mg.

ENG

DIPROGEST 600
DIPROGEST 1200
PROCIGEST 600/1200

Intravaginal device

Formula: *Each device contains:*
Diprogest 1200: Progesterone 1.2 g.
Diprogest 600: Progesterone 0.6 g.

Indications: *Estrus synchronization in young and adult cows. Estrus synchronization for FTAI programs.*

Application method and dose: *Using latex gloves, take the device and place it in the applicator, disinfect it with quaternary ammonium at 0.5%, perform hygiene around the vulva and apply intravaginally.*

Restrictions: *Pre-milking withdrawal: 0 days. Pre-slaughter withdrawal: 0 days.*

Presentation: *Doypack containing 10 devices of 600 mg or 1200 mg.*

DISPOSITIVO INTRAVAGINAL
INTRAVAGINAL DEVICE

ESP

FOLI-REC LÍQUIDO

Manejo de la reproducción - Hormonal
Gonadotrofina

Fórmula: reCG 7.000 UI, excipientes c.s.p. 100 ml.

Indicaciones: Estimulante del crecimiento folicular. Complemento en protocolos en la inducción, sincronización del celo y ovulación en bovinos, usado en conjunto con otras hormonas como Progestágenos, Benzoato de Estradiol, Prostaglandina F2α o sus análogos sintéticos, y Hormona Liberadora de Gonadotrofinas (GnRH). Complemento en el tratamiento de disfunciones reproductivas como celo silente, anestro post destete.

Forma de aplicación y dosis: Administrar: Vacas Bos Taurus: una dosis de 140 UI de reCG, es decir 2 ml de FOLI-REC® líquido por animal. Vacas Bos indicus: una dosis de 105 UI de reCG, es decir 1,5 ml de FOLI-REC® líquido por animal. Vaquillonas de ambas especies: una dosis de 70 a 105 UI de reCG, es decir 1 a 1,5 ml de FOLI-REC® líquido por animal.

Presentación: Frasco ampolla multidosis 30 y 100 ml, conteniendo la solución del principio activo.

ENG

FOLI-REC LIQUID

Reproduction management - Hormone Gonadotropin

Formula: *reCG 7,000 IU, excipients q.s. 100 ml.*

Indications: *Follicular growth stimulant. Complement in estrus synchronization and ovulation protocols, in cattle, in conjunction with other hormones such as Progestogens, Estradiol Benzoate, F2α Prostaglandin and GnRH. Complement in the treatment of reproductive dysfunctions such as silent estrus, post-weaning anestrus.*

Administration and dosage: *Bos Taurus cow: 140 IU of reCG, equivalent to 2 ml of FOLI-REC® liquid per animal. Bos indicus cow: 105 IU of reCG equivalent to 1.5 ml of FOLI-REC® liquid per animal. Heifers: 70 to 105 IU of reCG, equivalent to 1 to 1.5 ml of FOLI-REC® liquid per animal.*

Presentation: *Amber multi-dose vial containing 30 and 100 ml of product.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

- ✓ ***Lista para usar***
- ✓ ***Rinde 15 a 20 dosis***
- ✓ ***Recombinante***
- ✓ ***Única en el mundo***
- ✓ *Ready to use*
- ✓ *It lasts 15 to 20 doses*
- ✓ *Recombinant*
- ✓ *Unique in the world*

ESP

KIT DIPROGEST 1200 LECHE
50 DOSIS

Dispositivo intravaginal - Progesterona 1,2 g

Sincronización del celo en vacas y vaquillonas. Sincronización de celos para programas de IATF. Inducción de la ovulación en vaquillonas prepúberes y en vacas con anestro posparto. Tratamiento de quistes ováricos.

El mismo contiene: 50 Diprogest 1200 (dispositivos intravaginales de termofusión x 1,2 g progesterona), 2 Benzoato de estradiol Zoovet (100 ml), 4 Ciclar (D+Cloprostenol, 50 ml), 2 Cipionato Zoovet (50 ml) y 2 A4 Zoovet (Amonio cuaternario para desinfección de aplicadores, 100 ml).

Ver las indicaciones de cada producto por separado en este vademécum.

ENG

KIT DIPROGEST 1200 MILK
50 DOSES

Intravaginal device - Progesterone 1.2 g

Estrus synchronization in cattle and heifers. Estrus synchronization for FTAI programs. Ovulation induction in prior-to-puberty heifers and in cows with post-parturition anestrus. Treatment of ovarian cysts.

It contains: *50 Diprogest 1200 (intravaginal devices by dipping x 1.2 g Progesterone), 2 Zoovet Estradiol Benzoate (100 ml), 4 Ciclar (D+Cloprostenol, 50 ml), 2 Cypionate Zoovet (50 ml) and 2 A4 Zoovet (Quaternary ammonium to disinfect the applicators, 100 ml).*

See the instructions for each product separately in this vademecum.

I+D R&D

DISPOSITIVO INTRAVAGINAL
INTRAVAGINAL DEVICE

ESP

KIT J-SYNCH DIPROGEST 600

Dispositivo intravaginal - Progesterona 0,6 g

Sincronización del celo en vacas y vaquillonas. Sincronización de celos para programas de IATF. Inducción de la ovulación en vaquillonas peripúberes y en vacas con anestro posparto.

El mismo contiene: 50 Diprogest 600 (dispositivos intravaginales de termofusión de 600 mg progesterona), 1 Benzoato de estradiol Zoovet de 100 ml, 2 Ciclar de 50 ml, 2 Buserelina Zoovet de 50 ml, 1 Buserelina Zoovet de 25 ml y 1 A4 Zoovet de 100 ml (amonio cuaternario)

Ver las indicaciones de cada producto por separado en este vademécum.

ENG

KIT J-SYNCH DIPROGEST 600

Intravaginal device - Progesterone 0.6 g

Estrus synchronization in cattle and heifers. Estrus synchronization for FTAI programs. Ovulation induction in prior-to-puberty heifers and in cows with post-parturition anestrus.

***It contains:** 50 Diprogest 600 (intravaginal devices by termofusion, with 600 mg of Progesterone), One vial of Zoovet Estradiol Benzoate , 100 ml, 2 vials of Ciclar, 50 ml (D+Cloprostenol), 2 vials of Buserelina Zoovet, 50 ml, 1 vial of Buserelina Zoovet, 25 ml, and one bottle of A4 Zoovet, 100 ml (Quaternary ammonium).*

See the instructions for each product separately in this vademecum.

DISPOSITIVO INTRAVAGINAL
INTRAVAGINAL DEVICE

ESP

KIT J-SYNCH
PRO-CICLAR 750

Dispositivo intravaginal - Progesterona 750 mg

Sincronización del celo en vacas y vaquillonas. Sincronización de celos para programas de IATF. Inducción de la ovulación en vaquillonas peripúberes y en vacas con anestro posparto.

El mismo contiene: 50 Pro-Ciclar P4 zoovet (dispositivos intravaginales descartables con 750 mg progesterona), 1 Benzoato de estradiol Zoovet de 100 ml, 2 Ciclar de 50 ml, 2 Buserelina Zoovet de 50 ml, 1 Buserelina Zoovet de 25 ml y 1 A4 Zoovet de 100 ml (amonio cuaternario)

Ver las indicaciones de cada producto por separado en este vademécum.

ENG

KIT J-SYNCH
PRO-CICLAR 750

Intravaginal device - Progesterone 750 mg

Estrus synchronization in cattle and heifers. Estrus synchronization for FTAI programs. Ovulation induction in prior-to-puberty heifers and in cows with post-parturition anestrus.

It contains: *50 Pro-ciclar P4 Zoovet (disposable intravaginal devices, with 750 mg of Progesterone), One vial of Zoovet Estradiol Benzoate , 100 ml, 2 vials of Ciclar, 50 ml (D+Cloprostenol), 2 vials of Buserelina Zoovet, 50 ml, 1 vial of Buserelina Zoovet, 25 ml, and One bottle of A4 Zoovet, 100 ml (Quaternary ammonium).*

See the instructions for each product separately in this vademecum.

DISPOSITIVO INTRAVAGINAL
INTRAVAGINAL DEVICE

ESP

KIT REPRODUCTIVO DIPROGEST 600 50 DOSIS

Dispositivo intravaginal - Progesterona 0,6 g

Sincronización del celo en vacas y vaquillonas. Sincronización de celos para programas de IATF. Inducción de la ovulación en vaquillonas prepúberes y en vacas con anestro posparto. Tratamiento de quistes ováricos.

El mismo contiene: 50 Diprogest 600 (dispositivos intravaginales de termofusión x 600 mg progesterona), 1 Benzoato de estradiol Zoovet (100 ml), 2 Ciclar (D+Cloprostenol, 50 ml), 1 Cipionato Zoovet (50 ml) y 1 A4 Zoovet (Amonio cuaternario para desinfección de aplicadores, 100 ml).

Ver las indicaciones de cada producto por separado en este vademécum.

ENG

REPRODUCTIVE KIT DIPROGEST 600 50 DOSES

Intravaginal device - Progesterone 0.6 g

Estrus synchronization in cattle and heifers. Estrus synchronization for FTAI programs. Ovulation induction in prior-to-puberty heifers and in cows with post-parturition anestrus. Treatment of ovarian cysts.

It contains: 50 Diprogest 600 (intravaginal devices by dipping x 600 mg Progesterone), 1 Zoovet Estradiol Benzoate (100 ml), 2 Ciclar (D+Cloprostenol, 50 ml), 1 Cypionate Zoovet (50 ml) y 1 A4 Zoovet (Quaternary ammonium to disinfect the applicators, 100 ml).

See the instructions for each product separately in this vademecum.

DISPOSITIVO INTRAVAGINAL
INTRAVAGINAL DEVICE

ESP

KIT REPRODUCTIVO ZOOVET
50 DOSIS

Inseminación artificial

Presentación comercial que contiene los elementos para la ejecución de los protocolos de IATF clásicos. Eso permite abaratar los costos de los tratamientos y evitar olvidos de elementos necesarios.

Presentación Zoovet Full por 50 dosis:
50 Pro Ciclar P4 Zoovet (dispositivos intravaginales x 750 mg), 1 Benzoato de estradiol Zoovet (100 ml), 2 Ciclar (D+ Cloprostenol, 50 ml), 1 Cipionato Zoovet (50 ml), 1 A4 Zoovet (Amonio cuaternario para desinfección de aplicadores, 100 ml) y autoadhesivos rojos/azules para identificar productos o jeringas en el trabajo a campo.

Ver las indicaciones de cada producto por separado en este vademécum.

ENG

ZOOVET REPRODUCTIVE KIT
50 DOSES

Artificial insemination

Commercial presentation containing elements for the execution of traditional FTAI protocols. This allows to lowen treatment costs and not to forget the necessary elements.

Zoovet Full presentation containing 50 doses:
50 Pro Ciclar P4 Zoovet (intravaginal devices x 750 mg), 1 Zoovet Estradiol Benzoate (100 ml), 2 Ciclar (D+ Cloprostenol, 50 ml), 1 Cypionate Zoovet (50 ml), 1 A4 Zoovet (Quaternary ammonium to disinfect the applicators, 100 ml) and red/blue stickers to identify products or syringes during the field work.

See the instructions for each product separately in this vademecum.

I+D
R&D

DISPOSITIVO INTRAVAGINAL
INTRAVAGINAL DEVICE

ESP

PRO-CICLAR P4 *ZOOVET*

Dispositivo intravaginal - Progesterona 750 mg

Fórmula: Cada dispositivo intravaginal contiene: Progesterona micronizada 750 mg.

Indicaciones: Sincronización del celo en vacas y vaquillonas. Sincronización de celos para programas de IATF. Inducción de la ovulación en vaquillonas prepúberes y en vacas con anestro pos-parto. Tratamiento de quistes ováricos.

Forma de aplicación: Utilizando guantes de látex, tomar el dispositivo y colocarlo en el aplicador, desinfectar en soluciones de amonio cuaternario al 0,5 %. Realizar higiene de la zona perivulvar y aplicar intravaginalmente.

Restricciones: Pre Ordeño: 0 días.
Pre Faena: 0 días.

Presentación: Bolsa doy pack con 10 dispositivos de 750 mg de progesterona micronizada.

ENG

PRO-CICLAR P4 *ZOOVET*

Intravaginal device - Progesterone 750 mg

Formula: *Each intravaginal device contains: Micronized progesterone 750 mg.*

Indications: *Estrus synchronization in cattle and heifers. Estrus synchronization for FTAI programs. Ovulation induction in prior-to-puberty heifers and in cows with post-parturition anestrus. Treatment of ovarian cysts.*

Application method: *Using latex gloves, take the device and place it in the applicator, disinfect it with quaternary ammonium at 0.5 %. Perform hygiene around the vulva and apply intravaginally.*

Restrictions: *Pre-milking: 0 days. Pre-slaughter: 0 days.*

Presentation: *Doypack containing 10 devices of 750 mg of micronized progesterone.*

I+D
R&D

DISPOSITIVO INTRAVAGINAL
INTRAVAGINAL DEVICE

ESP

PROGESTERONA ZOOVET 2,85%

Hormonal

Fórmula: Progesterona (4-Pregnano-3,20-diona) 2,85 %.

Indicaciones: Formulación hormonal indicada para su utilización en programas de sincronización de celos.

Dosis: Bovinos: Se debe administrar 1,75 a 3 ml (50 a 100 mg) por animal. Duración del tratamiento: Dosis única o según criterio profesional veterinario.

Vía de administración: Intramuscular.

Presentación: Frasco por 100 ml.

ENG

PROGESTERONE ZOOVET 2.85%

Hormonal

Formula: *Progesterone (4-pregnane-3,20-dione) 2.85 %.*

Indications: *Hormonal formulation indicated for use in estrus synchronization programs.*

Dosage: *Cattle: Administer 1.75 to 3 ml (50 to 100 mg) per animal. Treatment duration: Single dose or according to the veterinarian criterion.*

Administration: *Intramuscular.*

Presentation: *100 ml vial.*

I+D
R&D

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

zoovet

ESP

BIFOS-D

Suplemento vitamínico mineral inyectable

Fórmula: Sodio Hipofosfito 25%; Sodio Glicerofosfato 18%; Vitamina D3 0,04% (Fósforo 4,75 g; Fósforo 6,72 g; Vitamina D3 1.600.000 UI).

Indicaciones: Tratamiento y prevención de enfermedades producidas por la carencia de fósforo, vitamina D3 o ambas.

Dosis: 1 ml cada 50 kg de peso (2,3 mg/kg de fósforo y 320 UI/kg de Vitamina D3). Duración del tratamiento: Se recomienda un mínimo de 2 aplicaciones anuales. Se puede repetir a los 60-90 días, o según criterio del profesional veterinario.

Vía de administración: Subcutánea.

Presentación: Frasco por 100 ml y 500 ml.

ENG

BIFOS-D

Injectable vitamin & mineral supplement

Formula: *Sodium Hypophosphite 25%; Sodium Glycerophosphate 18%; Vitamin D3 0.04% (Phosphorus 4.75 g; Phosphorus 6.72 g; Vitamin D3 1,600,000 IU).*

Indications: *Treatment and prevention of diseases produced by lack of Phosphorus, Vitamin D3, or both.*

Dosage: *1 ml every 50 kg bw (2.3 mg/kg of Phosphorus and 320 IU/kg of Vitamin D3). Treatment duration: At least 2 annual applications are recommended. It can be repeated at 60 to 90 days, or according to the veterinarian criterion.*

Administration: *Subcutaneous.*

Presentation: *100 and 500 ml vials.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

✓ ***Mayor concentración y biodisponibilidad ¡menor dosis!: 1 ml cada 50 kg***

✓ *More concentration and bioavailability, lower dose!: 1 ml every 50 kg*

ESP

CUZINC

Cobre y zinc de depósito

Fórmula: Cobre Metálico (como edetato) 1,5%; Zinc Metálico (como edetato) 5%.

Indicaciones: Tratamiento y prevención de enfermedades producidas por carencias primarias y secundarias de cobre y zinc. Actúa como reservorio de lenta liberación de cobre activo y zinc, que le permite obtener valores plasmáticos adecuados por más de 3 meses o más, aún tratándose de animales no carenciados el zinc evita la sobrecarga hepática.

Dosis: Bovinos jóvenes hasta 200 kg: 1 ml cada 50 kg de peso. Bovinos en recría: 4 ml totales. Bovinos adultos: 5 ml totales. Toros: 6 ml. Duración del tratamiento: Dosis única. Se puede repetir a los 90 días, o según criterio del profesional veterinario.

Vía de administración: Subcutánea, por delante o por detrás de la paleta.

Presentación: Frasco por 500 ml.

ENG

CUZINC

Long term copper and zinc

Formula: *Metallic Copper (as edetate) 1.5%; Metallic Zinc (as edetate) 5%*

Indications: *Treatment and prevention of diseases produced by primary or secondary lack of copper and zinc. It acts as a reservoir of active copper and zinc, producing a slow release that enables adequate plasma levels in the animal during 3 months, or more. Zinc avoids hepatic overburden, even in the case of animals without deficiency.*

Dosage: *Young cattle up to 200 kg: 1 ml every 50 kg bw. Cattle at rearing: 4 ml totals. Adult cattle: 5 ml. Bulls: 6 ml. Treatment duration: Single dose. It can be repeated at 90 days, or according to veterinarian criterion.*

Administration: *Subcutaneous, in front of, or behind, the shoulder blade.*

Presentation: *500 ml vial.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

✓ ***Mayor concentración y biodisponibilidad ¡menor dosis!: 1 ml cada 100 kg***

✓ *More concentration and bioavailability, lower dose!: 1 ml every 100 kg*

ESP

ELECTROLAC

Rehidratante - Energizante

Fórmula: Glucosa anhidra 39%, Acetato de sodio trihidrato 36,64%, Cloruro de sodio 6,4%, Cloruro de potasio 6,4%.

Indicaciones: Solución electrolítica y energizante para terneros. Ayuda a mantener el estado ácido-base y metabólico mineral.

Forma de administración y dosis: Diluir 50 ml del producto en 2 litros de leche o sustituto lácteo a 37-39 °C o bien en el mismo volumen de agua fría. Suministrar cada 12 horas durante 2 días o según criterio del profesional veterinario.

Vías de administración: Oral.

Especies: Bovinos (terneros).

Presentación: Bidón autodosificador multidosis de 1000 ml y exhibidora de 24 pomos de 50 ml.

ENG

ELECTROLAC

Rehydrating - Energizing

Formula: *Anhydrous Glucose 39%, Sodium Acetate Trihydrate 36.64%, Sodium Chloride 6.4%, Potassium Chloride 6.4%.*

Indications: *Electrolytic and energizing solution for calves. It helps to maintain the acid-base and metabolic mineral balance.*

Dosage: *Dilute 50 ml of product in 2 liters of milk or milk substitute or drinking water, at 37-39°C. Supply every 12 hours for 2 days, or according to veteri-narian criterion.*

Administration: *Oral.*

Species: *Cattle (calves).*

Presentation: *1000 ml multidose self-dosing drum and in bulk presentation, containing 24 vials of 50 ml.*

ORAL / *ORAL ADMINISTRATION*

- ✓ ***Efecto inmediato***
- ✓ ***Fórmula balanceada***
- ✓ ***Práctico envase aplicador***
- ✓ ***Muy económico***
- ✓ ***Rinde 20 dosis***
- ✓ *Immediate effect*
- ✓ *Balanced formulation*
- ✓ *Practical applicator container*
- ✓ *Very economic*
- ✓ *It lasts 20 doses*

ESP

KIT SINERGIA ENGORDE

Mejorador de la conversión
(anabólico no hormonal)

Desde el ingreso al engorde hasta el fin del ciclo (feed lot o pastura suplementada). Está pensado para mejorar la conversión al energizar, hacer descender el estrés, dar una sólida inmuno estimulación, vitaminizar y aportar una mineralización general estratégica de animales durante el engorde.

El mismo contiene: 1 frasco de Powermin ADE de 500 ml y 1 frasco de Mk471 de 500 ml.

Ver las indicaciones de cada producto.

ENG

KIT SINERGY FATTENING

Conversion enhancer (non-hormonal anabolic)

From the beginning of fattening until the end of the cycle (feedlot or supplemented pasture). It is designed to improve conversion by energizing, lowering stress, providing strong immunostimulation, vitaminizing and providing a general strategic mineralization of animals during fattening.

It contains: *500 ml vial of Powermin ADE and 500 ml vial of Mk471.*

See the instructions for each product separately.

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

- ✓ ***Un aliado en el Feed lot***
- ✓ ***Inmuno estimulante inespecífico***
- ✓ ***Energizante específico***
- ✓ ***Promotor del crecimiento***
- ✓ ***NO HORMONAL***
- ✓ ***Sin tiempo de retiro en carne***
- ✓ ***Vitamínico***
- ✓ ***Anti estresante***
- ✓ ***Mejor recuperación de transporte***
- ✓ ***Menos enfermedades***
- ✓ ***Composición y actividad mineralizante de acuerdo a la categoría***
- ✓ ***Mejor conversión***
- ✓ ***Más kilos en menos tiempo***

- ✓ *An ally in the Feed lot.*
- ✓ *Nonspecific immune stimulant.*
- ✓ *Specific energizer*
- ✓ *Growth promoter*
- ✓ *NOT HORMONAL*
- ✓ *No withdrawal time in meat.*
- ✓ *Vitamin*
- ✓ *Anti-stress*
- ✓ *Better transport recovery.*
- ✓ *Less disease.*
- ✓ *Composition and mineralizing activity according to category*
- ✓ *Better meat conversion*
- ✓ *Greater weight gain*

ESP

KIT SINERGIA LACTANCIA

Inmunoestimulante-inespecífico
Mineralizante - Promotor del crecimiento (no hormonal)

El kit sinergia lactancia propone un novedoso concepto de sinergia biológica para vacas y vaquillonas de producción lechera en su etapa peripartal, como también durante toda su producción.
Su actividad en conjunto potencia su efecto inmunoestimulante-inespecífico, promotor del crecimiento fetal y producción lechera, prevención de patologías carenciales y metabólicas. También propone un efecto antioxidante y antiestresante, tranquilizante.

El mismo contiene: 1 frasco de Magnezinc Plus de 100 ml y 1 frasco de Gram100 de 100 ml.

Ver las indicaciones de cada producto.

ENG

KIT SINERGY LACTATION

Non-specific Immunostimulant - Mineralizer Growth Promoter (Non-hormonal)

The lactation synergy kit proposes a new concept of biological synergy for cattle and Dairy production heifers in their peripartal stage, as well as throughout their productive life. Their activity as a whole enhances their non-specific immunostimulating effect, promoting fetal growth and milk production, preventing deficiencies and metabolic pathologies. It also proposes an antioxidant and antistressing effect.

It contains: *100 ml vial of Magnezinc Plus and 100 ml vial of Gram100.*

See the instructions for each product separately.

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

- ***Un aliado en la vaca fresca***
- ***Alta actividad Inmuno estimulante***
- ***Promotor de la producción***
- ***NO HORMONAL***
- ***Sin tiempo de retiro en leche***
- ***Anti estresante***
- ***Composición y actividad mineralizante específica***
- ***Menos enfermedades peripartales infecciosas y carenciales***
- ***Mejores tasas de producción y reproducción***

- *An ally in cattle at the beginning of lactation*
- *High immunostimulating activity*
- *Production promoter*
- *NOT HORMONAL.*
- *No withdrawal time in milk.*
- *Anti-stress*
- *Composition and specific mineralizing activity*
- *Fewer peripartal diseases*
- *Better production and reproduction rates*

ESP

KIT SINERGIA RECRÍA

Mejorador de la conversión
(anabólico no hormonal)

Desde el nacimiento hasta el destete está pensado para acelerar el crecimiento al dar una sólida inmuno estimulación, vitaminización y aporte de minerales estratégicos, imprescindibles en la etapa de la cría.

El mismo contiene: 1 frasco de Once (7+4) con selenio de 500 ml y 1 frasco de Mk471 de 500 ml.

Ver las indicaciones de cada producto.

ENG

KIT SINERGY REARING

Conversion enhancer (non-hormonal anabolic)

From birth to weaning it is thought to accelerate growth by giving a solid immunostimulation, vitaminization and contribution of strategic minerals, essential in the rearing stage.

It contains: *500 ml vial of Once (7+4) with selenium and 500 ml vial of Mk471.*

See the instructions for each product separately.

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

- ✓ ***Un aliado en la cría***
- ✓ ***Inmuno estimulante inespecífico***
- ✓ ***Promotor del crecimiento***
- ✓ ***NO HORMONAL***
- ✓ ***Vitamínico***
- ✓ ***Anti estresante***
- ✓ ***Composición y actividad mineralizante de acuerdo a la categoría***
- ✓ ***Menos enfermedades***
- ✓ ***Mejor actividad de las vacunas***
- ✓ ***Destetes más pesados y en menos tiempo***

- ✓ *An ally in rearing.*
- ✓ *Nonspecific immunostimulant*
- ✓ *Growth promoter*
- ✓ *NOT HORMONAL*
- ✓ *Vitamin*
- ✓ *Anti-stress*
- ✓ *Composition and mineralizing activity according to category*
- ✓ *Less probability to suffer diseases*
- ✓ *Better activity of vaccines*
- ✓ *Better weights at weaning*

ESP

LIPOVIT

Suplemento preventivo y terapéutico
Vitamínico

Fórmula: Cada 100 ml contiene: Vitamina A palmitato, 50.000.000 UI, vitamina D3, 7.500.000 UI, vitamina E acetato 5.000 UI, excipientes c.s.p 100 ml.

Indicaciones: Curativo o preventivo de estados carenciales en general. Muy útil en estados de estrés, bajas de defensas, terapia de apoyo en convalecencias de procesos infecciosos y/o infestaciones parasitarias, mejorar la producción lechera y de carne, en casos de retardo de aparición del celo.

Forma de administración y dosis: Administrar 0,4 ml cada 50 kg de peso vivo. Bovinos y equinos adultos: 2 a 5 ml. Potros y terneros: 0,5 a 2 ml. Porcinos adultos: 1 a 3 ml. Ovinos y caprinos adultos: 1 a 2 ml. Lechones, corderos, cabritos: 0,25 a 0,5 ml. Intervalo entre dosis: Aplicar cada 30 – 45 días, o según criterio profesional veterinario.

Vías de administración: Administración inyectable por vía intramuscular.

Presentación: Frasco por 100 y 250 ml.

ENG

LIPOVIT

Preventive and therapeutic supplement
Vitaminic

Formula: *Each 100 ml contains: Vitamin A palmitate, 50,000,000 IU, vitamin D3, 7,500,000 IU, vitamin E acetate 5,000 IU, excipients q.s.p 100 ml.*

Indications: *Curative or preventive of deficiency states, in stress situations, low defenses, supporting therapy in convalescence during infectious processes and/or parasitic infestations, to improve milk and meat production, in cases of delayed appearance of estrus.*

Administration and dose: *Administer 0.4 ml every 50 kg bw. Adult cattle and horses: 2 to 5 ml. Foals and calves: 0.5 to 2 ml. Adult pigs: 1 to 3 ml. Adult sheep and goats: 1 to 2 ml. Piglets, lambs, kids: 0.25 to 0.5ml Interval between doses: Apply every 30 – 45 days, or according to veterinarian criterion.*

Administration: *Injectable, by intramuscular route.*

Presentation: *100 and 250 ml vial.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

- ✓ ***Alta y equilibrada concentración en vitaminas.***
- ✓ ***Dosis única de larga acción.***
- ✓ ***Muy práctica dosificación.***
- ✓ ***Atóxico.***

- ✓ *High and balanced concentration of vitamins.*
- ✓ *Single dose and long action.*
- ✓ *Easy dosage.*
- ✓ *Non-toxic.*

ESP

MAGNEZINC PLUS

Suplemento mineralizante inyectable

Fórmula: Gluconato de Calcio 22%; Cloruro de Magnesio Hexahidrato 30%; Gluconato de Zinc 4%; Gluconato de Cobre 1%; Sulfato de Cobalto 0,5%.

Indicaciones: Desbalances metabólicos por carencias minerales. Hipomagnesemia clínica y subclínica. Prevención y tratamiento de patologías podales (como pietín) originadas por debilitamiento cutáneo. Bajos índices reproductivos. Alta presentación de retenciones placentarias.

Dosis: 1 ml cada 50 kg de peso. Duración del tratamiento: Se recomiendan aplicaciones estratégicas: En pre parto; pre servicio; con el rebrote de las pasturas; situaciones de estrés y cambios climáticos; pre destete. En invernada se recomienda la aplicación sistemática cada 60 días.

Vía de administración: Subcutánea.

Presentación: Frasco por 100 y 500 ml.

ENG

MAGNEZINC PLUS

Injectable mineralizer supplement

Formula: *Calcium Gluconate 22%; Magnesium Chloride Hexahydrate 30%; Zinc Gluconate 4%; Copper Gluconate 1%; Cobalt Sulfate 0.5%.*

Indications: *Metabolic imbalances following mineral deficiencies. Clinic and sub-clinic hypomagnesemia. Prevention and treatment of foot pathologies (such as foot rot), caused by skin weakening. Low reproductive rates. High levels of placenta retention.*

Dosage: *1 ml every 50 kg bw. Treatment duration: Strategic applications are recommended: Prior to parturition, to natural service; with pastures regrowth; stress situations and climate changes; prior to weaning. In fattening, systematic applications every 60 days are recommended.*

Administration: *Subcutaneous.*

Presentation: *100 and 500 ml vials.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

✓ ***Mayor concentración y biodisponibilidad ¡menor dosis!: 1 ml cada 50 kg***

✓ *More concentration and bioavailability, lower dose!: 1 ml every 50 kg*

ESP

OLEOVET ADE *INYECTABLE*

Vitamínico inyectable

Fórmula: Vitamina A Palmitato 25.000.000 UI; Vitamina D3 700.000 UI; Vitamina E Acetato 5.000 mg; excipientes c.s.p. 100ml.

Indicaciones: Estados carenciales, estrés; coadyuvante en procesos infecciosos y/o parasitarios; retraso del celo. Raquitismo y osteomalacia.

Dosis: Bovinos y equinos: Jóvenes: 1 ml cada 50 kg de peso. Recría y engorde: 5 ml. Confinamiento, gestación y reproductores: 5 ml. Ovinos y caprinos: Jóvenes: 0,5 ml. Reproductores: 2 ml. Cerdos: Hasta los 3 meses: 0,5 ml. Recría: 1 ml. Cerdas preñadas: 3 ml. Reproductores: 3 ml. Intervalo entre dosis: Según criterio de profesional actuante. Para más información: Ver envase del producto. Duración del tratamiento: Según criterio del profesional actuante.

Vía de administración: Intramuscular.

Restricción: Pre-faena: 2 días. Pre-ordeño: 48 horas.

Presentación: Frasco por 100 ml.

ENG

OLEOVET ADE *INJECTABLE*

Injectable vitamin

Formula: *Vitamin A Palmitate 25,000,000 IU; Vitamin D3 700,000 IU; Vitamin E Acetate 5,000 mg; excipients q.s. 100ml.*

Indications: *Deficiency conditions, stress; it helps in infectious and/or parasitic processes; silent estrus. Rickets and osteomalacia.*

Dosage: *Cattle and horses: Young: 1ml every 50 kg bw. Rearing and fattening: 5 ml. Confinement, gestation and breeders: 5 ml. Sheep and goats: Young: 0.5 ml. Breeders: 2 ml. Swine: Up to 3 months: 0.5 ml. Rearing: 1 ml. Gestating gilts: 3 ml. Breeders: 3 ml. Interval between doses: According to the acting professional criterion. For more information: See product package. Duration of treatment: According to the acting professional criterion.*

Administration: *Intramuscular.*

Restriction: *Pre-slaughter: 2 days. Pre-milking: 48 hours.*

Presentation: *100 ml vial.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

ESP

ONCE (7+4) *CON SELENIO*

Vitamínico mineralizante inyectable

Fórmula: Gluconato de Cobalto 0,5%; Gluconato de Cobre 1%; Gluconato de Hierro 1%; Cloruro de Magnesio Hexahidrato 2%; Gluconato de Calcio 2%; Selenito de Sodio (100%) 0,36%; Cloruro de Potasio 0,01%; Cloruro de Sodio 0,01%; Vitamina A (Palmitato) 1,5% (2.250.000 UI); Vitamina E (Acetato) 5% (5.000 UI); Vitamina D3 0,05% (2.000.000 UI); Vitamina B 12 0,01%; Clorfeniramina Maleato 0,4%.

Indicaciones: Fuente complementaria de vitaminas y minerales en el crecimiento, desarrollo, lactación y engorde. Preparación antes de servicio y pre IATF.

Dosis: Bovinos adultos: 10 ml cada 30 a 45 días. Terneros: 5 ml cada 30 a 45 días. Duración del tratamiento: A criterio del profesional veterinario.

Vía de administración: Subcutánea.

Presentación: Frascos por 100 y 500 ml.

ENG

ONCE (7+4) *WITH SELENIUM*

Injectable mineralizer vitamin supplement

Formula: *Cobalt Gluconate 0.5%; Copper Gluconate 1%; Iron Gluconate 1%; Magnesium Chloride Hexahydrate 2%; Calcium Gluconate 2%; Sodium Selenite (100%) 0.36%; Potassium Chloride 0.01%; Sodium Chloride 0.01%; Vitamin A (Palmitate) 1.5% (2,250,000 I.U.); Vitamin E (Acetate) 5% (5,000 IU); Vitamin D3 0.05% (2,000,000 IU); Vitamin B 12 0.01%; Chlorpheniramine Maleate 0.4%.*

Indications: *Complementary source of vitamins and minerals during growth, development, lactation and fattening. Preparation before natural service and prior to FTAI.*

Dosage: *Adult cattle: 10 ml every 30 to 45 days. Calves: 5 ml every 30 to 45 days. Treatment duration: According to the acting professional criterion.*

Administration: *Subcutaneous.*

Presentation: *100 and 500 ml vials.*

I+D
R&D

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

- ***Ideal para terneros destetados con bajo peso y mal estado***
- ***Mayor concentración y biodisponibilidad ¡menor dosis!: 1 ml cada 50 kg***
- *Ideal for post weaning calves with low weight and bad condition*
- *More concentration and bioavailability, lower dose!: 1 ml every 50 kg*

ESP

POLICALCIO B12 *ZOOVET*

Suplemento vitamínico mineralizante inyectable

Fórmula: Gluconato de Calcio 12%; Hipofosfito de Sodio 3%; Selenito de Sodio 0,2%; Gluconato de Zinc 1,2%; Gluconato de Cobre 0,2%; Gluconato de Cobalto 0,16%; Vitamina D 3 0,005%; Vitamina B12 0,001%.

Indicaciones: Preventivo de deficiencias de Calcio y Fósforo. Trastornos de la fertilidad y gestación, para corregir desgastes fisiológicos provocados por servicios y preñeces. Prevención del raquitismo en animales jóvenes.

Dosis: Bovinos adultos: 10 ml. Terneros: 5 ml. Intervalo entre dosis: Cada 30 a 60 días. Duración del tratamiento: A criterio del profesional veterinario.

Vía de administración: Subcutánea.

Presentación: Frasco por 250 y 500 ml.

ENG

POLY-CALCIUM B12 *ZOOVET*

Injectable mineralizer vitamin supplement

Formula: *Calcium Gluconate 12%; Sodium Hypophosphyte 3%; Sodium Selenite 0.2%; Zinc Gluconate 1.2%; Copper Gluconate 0.2%; Cobalt Gluconate 0.16%; Vitamin D 3 0.005%; Vitamin B12 0.001%.*

Indications: *Preventive of Calcium and Phosphorus deficiency. Fertility and gestation disorders. To correct physiological wear caused by natural services and pregnancies. Rickets prevention in young animals.*

Dosage: *Adult cattle: 10 ml. Calves: 5 ml. Interval between doses: Every 30 to 60 days. Treatment duration: According to veterinarian criterion.*

Administration: *Subcutaneous.*

Presentation: *250 and 500 ml vials.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

- ***✓ Mayor concentración y biodisponibilidad ¡menor dosis!: 1 ml cada 50 kg***
- ***✓ Alta concentración de activos, ¡no es un calcio más!***
- *✓ More concentration and bioavailability, lower dose!: 1 ml every 50 kg*
- *✓ High active ingredient concentration, is not just another calcium!*

ESP

POWERMIN ADE

Energizante - Mineralizante - Vitamínico

Fórmula: Adenosín Trifosfato (ATP) 0,3%; Vitamina A Palmitato 0,588%; Vitamina D3 0,025%; Vitamina E Acetato 0,5%; Selenito de Sodio 0,13%; Yodo Metálico 1%; Citrato de Hierro Amoniacal 0,4%; Cloruro de Magnesio Hexahidrato 2%; Gluconato de Zinc 0,5%; Gluconato de Cobre 0,25%; Gluconato de Cobalto 0,25%; Gluconato de Calcio 5%; Sodio Hipofosfito 3%.

Indicaciones: Crecimiento, lactación y engorde. Preventivo de estados carenciales de los minerales que aporta y recuperación de animales en general. Coadyuvante para la terminación de novillos de engorde.

Dosis y vía de administración: Bovinos, equinos y porcinos: 1 ml cada 50 kg de peso, vía subcutánea o intramuscular profunda. Caprinos ovinos y camélidos sudamericanos: 1 ml cada 25 kg de peso vía intramuscular profunda. Intervalo entre dosis: 10 a 30 días. Duración del tratamiento: Se recomienda un mínimo de 2 dosis.

Presentación: Frasco por 100, 250 y 500 ml.

ENG

POWERMIN ADE

Energizer - Mineralizer - Vitamin

Formula: *Adenosine Triphosphate (ATP) 0.3%; Vitamin A Palmitate 0.588%; Vitamin D3 0.025%; Vitamin E Acetate 0.5%; Sodium Selenite 0.13%; Metal Iodine 1%; Iron Ammonium Citrate 0.4%; Magnesium Chloride Hexahydrate 2%; Zinc Gluconate 0.5%; Copper Gluconate 0.25%; Cobalt Gluconate 0.25%; Calcium Gluconate 5%; Sodium Hypophosphite 3%.*

Indications: *Growth, lactation and fattening. Prevention of deficiency conditions of the minerals that it supplies, and recovery of animals in general. Adjuvant in finishing the fattening of steers.*

Dosage and administration: *Cattle, horse and swine: 1 ml every 50 kg bw, by deep subcutaneous or intramuscular route. Goats, sheep and South American camelids: 1 ml every 25 kg bw, by deep intramuscular route. Interval between doses: 10 to 30 days. Treatment duration: At least 2 doses are recommended.*

Presentation: *100, 250 and 500 ml vials.*

I+D
R&D

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

✓ ***Excelente para arranque de animales debilitados o retrasados***

✓ *Excellent to start up animals that are weakened or fallen*

ESP

SELEVIT ENERGY

Energizante - Vitamínico - Mineralizante

Fórmula: Hipofosfito de Sodio 15%; ATP 0,3%; Selenito de Sodio 0,35%; Zinc Gluconato 5%; Vitamina A Palmitato 0,5%; Vitamina E Acetato 2,5%; Vitamina D3 0,015%.

Indicaciones: Curativo y preventivo de estados carenciales de Selenio, Fósforo, Zinc, Vitaminas A, D, E.

Dosis: 1 ml cada 50 kg de peso (45,86 mg de Fósforo, 1,59 mg de Selenio, 5,27 mg de Zinc, 8.500 UI de Vitamina A, 6.000 UI de Vitamina D3, 25 UI de Vitamina E). En terneros al destete, y cada 60 días. En pre-parto: 20 a 25 días previos al parto. En post-parto: Dentro de la primera semana. En pre-servicio: para ambos sexos. En invernada: 60 días (hasta terminación). Intervalo entre dosis: 60 días o a criterio del profesional actuante.

Vía de administración: Subcutánea.

Presentación: Frasco por 500 ml.

ENG

SELEVIT ENERGY

Energizer - Vitamin - Mineralizer

Formula: *Sodium Hypophosphite 15%; ATP 0.3%; Sodium Selenite 0.35%; Zinc Gluconate 5%; Vitamin A Palmitate 0.5%; Vitamin E Acetate 2.5%; Vitamin D3 0.015%.*

Indications: *Cure and prevention of conditions following deficiency of Selenium, Phosphorus, Zinc, Vitamins A, D, E.*

Dosage: *1 ml every 50 kg bw (45.86 mg of Phosphorus, 1.59 mg of Selenium, 5.27 mg of Zinc, 8,500 IU of Vitamin A palmitate; 6,000 IU of Vitamin D3; 25 IU of Vitamin E). In calves at weaning, and every 60 days. Pre-parturition: 20 to 25 days prior to parturition. Post-parturition: Within the first week. Before natural service: For both sexes. During fattening: Every 60 days (until termination). Interval between doses: 60 days, or according to the acting veterinary criterion.*

Administration: *Subcutaneous.*

Presentation: *500 ml vial.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

- ✓ ***Único selenio con ATP***
- ✓ ***Ideal preservicio***
- ✓ ***Con Zinc***
- ✓ *Only Selenium with ATP*
- ✓ *Ideal pre-service*
- ✓ *With Zinc*

ESP

TOTAL-VET

Complejo condromineral con vitaminas y aminoácidos

Fórmula: Vitaminas: A, D3, E, B1, B2, B6, B12, B15, D-Pantenol (B5), Nicotinamida (B3), Ácido Fólico. Minerales: Manganeso; Zinc; Hierro; Cobre; Magnesio; Cobalto; Calcio, Selenio; Potasio; Fósforo. Condroprotectores: Glucosamina Sulfato; Condroitín Sulfato. Aminoácidos: DL Metionina, L Lisina, Citrato de Colina.

Indicaciones: Tratamiento y prevención de osteoartrosis y procesos inflamatorios articulares. Corrección de deficiencias vitamínicas, minerales y de aminoácidos.

Dosis: Preventiva: hasta 500 kg: 25 ml. Curativa: hasta 500 kg: 50 ml. Se recomienda repartir la dosis en dos tomas diarias orales. Administrar durante 10 días y descansar 20 o según criterio del profesional actuante.

Vía de administración: Oral.

Presentación: Frasco por 250 ml.

ENG

TOTAL-VET

Chondromineral complex with vitamins and amino acids

Formula: *Vitamins: A, D3, E, B1, B2, B6, B12, B15, D-Panthenol (B5), Nicotinamide (B3), Folic Acid. Minerals: Manganese; Zinc; Iron; Copper; Magnesium; Cobalt; Calcium, Selenium; Potassium; Phosphorous. Chondroprotectives: Glucosamine Sulfate; Chondroitin Sulfate. Amino acids: DL Methionine, L Lysine, Choline Citrate.*

Indications: *Treatment and prevention of osteoarthritis and joint inflammatory processes. Correction of deficiency of vitamins, minerals and amino acids.*

Dosage: *Preventive: Up to 500 kg bw, 25 ml. Curative: Up to 500 kg bw, 50 ml. We recommend to split the dose in two intakes and to administer during 10 days and rest 20 days or according to the acting professional criterion.*

Administration: *Oral.*

Presentation: *250 ml vial.*

I+D R&D

ORAL / *ORAL ADMINISTRATION*

- ✓ ***11 minerales, 11 vitaminas, 2 condroprotectores y 3 aminoácidos***
- ✓ ***Jarabe con aporte de condroprotector, vitaminas y minerales para equinos***

- ✓ *11 minerals, 11 vitamins, 2 chondroprotectives and 3 amino acids.*
- ✓ *Chondroprotective syrup, with vitamins and minerals for horses*

ESP

V.C.C.

Suplemento mineralizante preventivo
Terapéutico reconstituyente

Fórmula: Gluconato de Calcio 18%; Cloruro de Magnesio Hexahidrato 5%; Glucosa Anhidra 7%; Cloruro de Sodio 0,9%; Clorfeniramina Maleato 0,01%; Cafeína 0,5%.

Indicaciones: Hipocalcemia; Hipomagnesemia; vacas caídas; tetania o mal de los avenales; acetonemia; trastornos agudos del metabolismo del calcio; lesiones óseas.

Dosis: Bovinos y equinos adultos: Preventiva: 100 ml. Terapéutica: 250 a 500 ml. Terneros, potrillos, ovinos, caprinos, porcinos: Preventiva: 5 ml. Terapéutica: 50 a 100 ml. Corderos y cabritos: Terapéutica: 10 a 20 ml. Duración del tratamiento: Puede repetirse a las 6 a 8 horas.

Vía de administración: Subcutánea, intramuscular o endovenosa lenta.

Presentación: Sachet por 500 ml y frasco de 500 ml.

ENG

V.C.C.

Mineralizer preventive supplement
Therapeutic reconstituent

Formula: *Calcium Gluconate 18%; Magnesium chloride Hexahydrate 5%; Anhydrous Glucose 7%; Sodium Chloride 0.9%; Chlorpheniramine Maleate 0.01%; Caffeine 0.5%.*

Indications: *Hypocalcemia; Hypomagnesemia; downer cow; tetany; acetonemia; calcium metabolism acute disorders; bone injuries.*

Dosage: *Adult cattle and horses: Preventive: 100 ml. Therapeutic: 250 to 500 ml. Calves, colts, sheep, goat, and swine: Preventive: 5 ml. Therapeutic: 50 to 100 ml. Lambs and young goats: Therapeutic: 10 to 20 ml. Treatment duration: It can be repeated at 6 to 8 hours.*

Administration: *Slow subcutaneous, intramuscular or intravenous.*

Presentation: *500 ml sachet and 500 ml vial.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

✓ ***Sachet ¡listo para usar!***
✓ *Sachet, ready to use!*

ESP

A4 ZOOVET

Antiséptico - Desinfectante amonio cuaternario

Fórmula: Cloruro de Dimetil Alquil Bencil Amonio 2 %.

Indicaciones: Desinfección y antisepsia en general. Antisepsia local en tratamientos y/o profilaxis de procesos infecciosos locales, piel intacta o heridas. Esterilización de material quirúrgico. Desinfección de todo tipo de instalaciones y locales, máquinas y vehículos.

Forma de preparación y aplicación: Desinfección ambiental, implementos, instalaciones y vehículos: 1 parte de producto en 2000 partes de agua, aplicar 10 ml/m2 de superficie a tratar. Desinfección externa de animales, manos y ubres: 1 parte de producto en 400 partes de agua (50 ml en 20 Lt. de agua), aplicar lo suficiente para cubrir la zona a tratar y secar con algodón o gasa limpios. Desinfección de material quirúrgico: 1 parte de producto en 40 partes de agua (75 ml en 3 Lt de agua). Sumergir totalmente el material a desinfectar, un mínimo de 30 minutos.

Presentación: Frasco por 500 ml y bidón de 5 lt.

ENG

A4 ZOOVET

Antiseptic - Quaternary ammonium disinfectant

Formula: *Alkyl Benzyl Dimethyl ammonium Chloride 2%.*

Indications: *Disinfection and antisepsis in general. Local antisepsis in treatments and/or prophylaxis of local infectious processes, intact skin or injuries. Surgical instruments sterilization. Disinfection in all kinds of facilities and premises, machines and vehicles.*

Preparation and application method: *Disinfection of the environment, kits, facilities and vehicles: 1 part of the product in 2000 parts of water, apply 10 ml/m2 of the surface to treat. External disinfection in animals, hands and udders: 1 part of the product in 400 parts of water (50 ml in 20 lt of water), apply enough to cover the surface to treat and dry with clean cotton or gauze. Surgical instruments disinfection: 1 part of the product in 40 parts of water (75 ml in 3 lt of water). Completely submerge the material to disinfect, at least for 30 minutes.*

Presentation: *500 ml vial and 5 lt drum.*

PARA DILUIR
TO DILUTE

ESP

ANTIVERRUGAS *ZOOVET*

Tratamiento de papiloma

Fórmula: Clorobutanol 50 g, excipiente c.s.p. 100 ml.

Indicaciones: Tratamiento de verrugas y papilomatosis.

Dosis: Administrar en la periferia de las lesiones en todas las especies hasta 1 ml cada 10 kg. Esto es equivalente aproximadamente a 50 mg/kg de peso vivo. Intervalo entre dosis: Se recomienda repetir a las 72 horas. Duración del tratamiento: Generalmente son necesarias 2 a 3 aplicaciones. De todas formas, será el criterio del profesional Veterinario actuante el que decidirá la duración del tratamiento.
Al ser la papilomatosis una enfermedad multifactorial y dependiente del estado del sistema inmunológico del animal, la eficacia del tratamiento puede variar entre aproximadamente 50 y 80 %.

Vías de administración: Subcutánea perilesional.

Presentación: Frasco por 50 ml.

ENG

WART REMOVER *ZOOVET*

Papilloma treatment

Formula: *Chlorobutanol 50 g. Excipient q.s. 100 ml.*

Indications: *Treatment of warts and papillomatosis.*

Dosage: *Administer around the wart in all species up to 1 ml every 10 kg. This is equivalent to 50 mg/kg bw. Interval between doses: It is recommended to repeat after 72 hours. Duration of treatment: Generally, 2 to 3 administrations are necessary. Nevertheless, duration of treatment will depend on Veterinarian's criterion. Papillomatosis is a multifactorial disease that is related to animal's immune system. That's why efficacy of treatment may vary between 50 to 80%.*

Administration: *Subcutaneous, around the lesion.*

Presentation: *50 ml vial.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

ESP

HEMOSHOCK

Inmunoestimulante - Antiinflamatorio
Antipirético - Analgésico - Energizante
Neuro estimulante

Fórmula: Cafeína 0,5 g; Diclofenac Sódico1,2 g; Dextrosa 40 g; Polisacáridos de Pseudomonas aeruginosa 150 µg; Polisacáridos de Escherichia coli 200 µg; Polisacáridos de Streptococcus spp. 100 µg; Citrato de Sodio 3 g; excipiente c.s.p. 100 ml.

Indicaciones: Terapia única o coadyuvante de la terapia antibiótica en patologías de etiología infecciosa.

Modo de preparación y dosificación: Extraer por punción venosa 100 ml de sangre del animal a ser tratado y depositarla en el frasco. Agitar para permitir la mezcla de la sangre con el producto y aplicar inmediatamente por vía intramuscular o subcutánea el contenido del frasco. No aplicar más de 50 ml por punto de aplicación. Se puede aplicar en dosis única o según criterio del profesional Veterinario.

Presentación: Frasco 100ml.

I+D
R&D

ENG

HEMOSHOCK

Immunostimulant - Anti-inflammatory
Antipyretic - Analgesic - Energizer
Neurostimulant

Formula: *Caffeine 0.5 g; Diclofenac Sodium 1.2 g; Dextrose 40 g; Pseudomonas aeruginosa Polysaccharide150 µg; Escherichia coli Polysaccharide 200 µg; Streptococcus spp. Polysaccharide 100 µg; Sodium Citrate 3 g; excipient q.s. 100 ml.*

Indications: *Single therapy or adjuvant in antibiotic therapies for pathologies of infectious etiology.*

Preparation and dosage method: *Extract by venous puncture 100 ml of blood from the animal to be treated and place it in the product vial. Shake it to allow the mixture of the blood with the product and apply all the vial content immediately after, by intramuscular or subcutaneous route. Do not administer more than 50 ml per injection site. It can be applied in a single dose, or according to the acting veterinarian criterion.*

Presentation: *100ml vial.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

✓ ***Autohemoterapia + Un shock medicamentoso que salvará animales en estado grave***

✓ *Autohemotherapy + A drug shock that will save animals in critical condition*

zoovet

ESP

AMOXIVET DÚO

Antibiótico - Betalactámico - Penicilínico
Aminoglucósido

Fórmula: Amoxicilina trihidrato 15%, gentamicina sulfato 4%.

Indicaciones: Tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles a la combinación de amoxicilina y gentamicina, tales como cuadros clínicos de septicemia, abscesos, heridas, tratamientos posquirúrgicos e infecciones bacterianas secundarias a infecciones virales.

Dosis: 1 ml cada 10 kg de peso, equivalente a 15 mg/kg de amoxicilina trihidrato y 4 mg/kg de gentamicina sulfato. Intervalo entre dosis: 24 horas. Duración del tratamiento: se recomiendan 2 a 3 dosis. La duración del tratamiento dependerá del criterio del profesional veterinario.

Vías de administración: Intramuscular profunda.

Restricciones: Pre faena: 25 días. Pre ordeño: 96 horas.

Presentación: Frasco de 50 y 100 ml.

ENG

AMOXIVET DUO

Antibiotic - Betalactam - Penicillin
Aminoglycoside

Formula: *Amoxicillin trihydrate 15%, Gentamicin Sulfate 4%.*

Indications: *Treatment of infections caused by bacteria sensitive to the combination of amoxicillin and gentamicin, such as septicemia, abscesses, wounds, postsurgical treatments and bacterial infections secondary to viral infections.*

Dosage: *1 ml every 10 kg bw, equivalent to 15 mg/kg of amoxicillin trihydrate and 4 mg/kg of gentamicin sulfate. Interval between doses: 24 hours. Treatment duration: 2 to 3 doses are recommended. Treatment duration will depend on veterinarian's criterion.*

Administration: *Deep intramuscular.*

Restrictions: *Pre-slaughter: 25 days. Pre milking: 96 hours.*

Presentation: *50 and 100 ml vial.*

SUSPENSIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SUSPENSION

Sólo disponible para exportación
Only available for export

ESP

COBREMAS

Cobre de depósito

Fórmula: Cobre activo 2,5%.

Indicaciones: Tratamiento y prevención de enfermedades producidas por carencias primarias o secundarias de cobre (hipocuprosis). Actúa como reservorio de cobre activo, de liberación lenta que le permite obtener valores plasmáticos adecuados por más de 4 meses, evitando la sobrecarga, aún tratándose de animales no carenciados.

Dosis: 1 ml cada 100 kg de peso. Duración del tratamiento: Dosis única. Se puede repetir a los 60-90 días, o según criterio del profesional veterinario.

Vía de administración: Subcutánea en el hueco de la paleta.

Presentación: Frasco por 500 ml.

Exportación: Frasco por 100 ml.

ENG

COBREMAS

Long term copper

Formula: *Active copper 2.5%.*

Indications: *Treatment and prevention of diseases produced by primary or secondary lack of copper (hipocuprosis). It acts as a reservoir of active copper, producing a slow release that enables adequate plasmatic levels in the animal for more than 4 months, avoiding overburden, even in the case of animals without deficiency.*

Dosage: *1 ml every 100 kg bw. Treatment duration: Single dose. It can be repeated at 60 to 90 days, or according to the professional veterinarian criterion.*

Administration: *Subcutaneous, in the shoulder blade.*

Presentation: *500 ml vials.*

For export: 100 ml vial.

EMULSIÓN INYECTABLE
INJECTABLE EMULSION

Sólo disponible para exportación
Only available for export

ESP

GENTATEN

Antibiótico - Aminoglucósido

Fórmula: Gentamicina (como Sulfato) 10%.

Indicaciones: Se indica para la prevención y tratamiento de procesos infecciosos causados por gérmenes sensibles a la Gentamicina.

Dosis: Equinos, bovinos y porcinos: 1 ml cada 25 kg de peso (Equivale a 4,00 mg/kg de gentamicina). En caso de infusión intrauterina, diluir 20 ml (2000 mg de gentamicina) en 100 ml de solución fisiológica y aplicar intrauterinamente.
Repetir cada 24 horas durante 3 días consecutivos, pudiendo extenderse a 5 de ser necesario. La posterior continuación del tratamiento dependerá del criterio del profesional Veterinario actuante

Vía de administración: Intravenosa lenta; intramuscular, subcutáneo e intrauterina (en infusión).

Presentación: 100 ml.

ENG

GENTATEN

Antibiotic - Aminoglycoside

Formula: *Gentamicin (as Sulfate) 10%.*

Indications: *It is indicated for prevention and treatment of infectious processes caused by germs sensitive to Gentamicin.*

Dosage: *Horses, cattle and swine: 1 ml every 25 kg bw (This is equivalent to 4.00 mg/kg of gentamicin). In case of intrauterine infusion, dilute 20 ml (2000 mg of gentamicin) in 100 ml of physiological solution and administer by intrauterine route.*
Repeat every 24 hours for 3 consecutive days, with the possibility of extending the treatment to 5 days if necessary. Continuation of treatment will depend on veterinarian criterion.

Administration: *Slow intravenous, intramuscular, subcutaneous and intrauterine (as infusion) routes.*

Presentation: *100 ml.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

Sólo disponible para exportación
Only available for export

ESP

OXISOL PLUS *ZOOVET*

Antibiótico - Antiinflamatorio

Fórmula: Oxitetraciclina Clorhidrato 6,4%; Bencidamina Clorhidrato 2%; Lidocaína Clorhidrato 2%.

Indicaciones: Tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas producidas por microorganismos sensibles a la Oxitetraciclina, como así también del proceso inflamatorio asociado.

Dosis: 1 a 2 ml cada 10 kg de peso (No aplicar más de 10 ml por punto de aplicación en bovinos y no más de 5 ml en las demás especies indicadas). Intervalo entre dosis: 12 horas. Duración del tratamiento: Se recomienda aplicar durante 3 a 4 días.

Vías de administración: Intramuscular o subcutánea.

Presentación: Frascos por 50 y 250 ml.

ENG

OXISOL PLUS *ZOOVET*

Antibiotic - Anti-inflammatory

Formula: *Oxytetracycline Hydrochloride 6.4%; Benzydamine Hydrochloride 2%; Lidocaine Hydrochloride2%.*

Indications: *Treatment and prevention of infectious diseases caused by microorganisms sensitive to Oxytetracycline, as well as the inflammatory process associated to these conditions.*

Dosage: *1 to 2 ml every 10 kg bw (Do not apply more than 10 ml per application site in cattle, and no more than 5 ml in the rest of the indicated species). Interval between doses: 12 hours. Treatment duration: 3 to 4 days are recommended.*

Administration: *Intramuscular or subcutaneous.*

Presentation: *50 and 250 ml vials.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

Sólo disponible para exportación
Only available for export

ESP

PLANO 3 MAX

Anestésico disociativo

Fórmula: Ketamina (como clorhidrato) 10%.

Indicaciones: Anestésico disociativo, indicado para inducción y mantenimiento de la anestesia.

Dosis y vías de administración: Bovinos: Vía intravenosa: 5 mg/kg (2,5 ml cada 50 kg de peso). Vía intramuscular: 15 mg/kg (7,5 ml cada 50 kg de peso). Porcinos: 5 mg/kg (2,5 ml cada 50 kg de peso). Vía intramuscular: 15 to 20 mg/kg (7.5 a 10 ml cada 50 kg de peso). Ovinos: 3 mg/kg (1,5 ml cada 50 kg de peso). Vía intramuscular: 10 a 20 mg/kg (5 a 10 ml cada 50 kg de peso). Equinos: Vía intravenosa: 3 a 5 mg/kg (1,5- 2,5 ml cada 50 kg de peso). Vía intramuscular: 15 mg/kg (7,5 ml cada 50 kg de peso).

Presentación: Frasco por 50 ml.

ENG

PLANE 3 MAX

Dissociative anesthetic

Formula: *Ketamine (as hydrochloride) 10%.*

Indications: *Dissociative anesthetic, indicated for induction and maintenance of anesthesia.*

Dosage and administration route: *Cattle: Intravenous route: 5 mg/kg (2.5 ml every 50 kg bw). Intramuscular route: 15 mg/kg (7.5 ml every 50 kg bw). Swine: 5 mg/kg (2.5 ml every 50 kg bw). Intramuscular route: 15 to 20 mg/kg (7.5 to 10 ml every 50 kg bw). Sheep: 3 mg/kg (1.5 ml every 50 kg bw). Intramuscular route: 10 to 20 mg/kg (5 to 10 ml every 50 kg bw). Horses: 3 to 5 mg/kg (1.5 to 2.5 ml every 50 kg bw). Intramuscular route: 15 mg/kg (7.5 ml every 50 kg bw).*

Presentation: *50 ml vial.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

Sólo disponible para exportación
Only available for export

ESP

RACTONABOL

Promotor del crecimiento beta adrenérgico

Fórmula: Ractopamina Clorhidrato 2 %.

Indicaciones: Mejorador de la conversión alimentaria y ganancia de peso en porcinos en etapa de terminación. Mejora el porcentaje de carne magra y rendimiento de la canal.

Dosis: Aumento de ganancia de peso: 5 a 20 ppm. Aumento de rendimiento de canal y carne magra: 10 a 20 ppm. Se debe suministrar diariamente con la ración. Duración del tratamiento: Iniciar el tratamiento entre 28 y 42 días previos a la faena.

Vía de administración: Oral.

Presentación: Balde por 10 kg.

ENG

RACTONABOL

Beta-adrenergic growth booster

Formula: *Ractopamine Hydrochloride 2 %.*

Indications: *It improves the food conversion and weight gain in swine during the termination phase. It increases the percentage of lean meat and carcass yield.*

Dosage: *Weight gain increase: 5 to 20 ppm. Carcass and lean meat yield increase: 10 to 20 ppm. It must be supplied daily with the food. Treatment duration: Start the treatment 28 to 42 days prior to slaughter.*

Administration: *Oral.*

Presentation: *10 kg bucket.*

Sólo disponible para exportación
Only available for export

ESP

SELEVIT ZOOVET ADE

Suplemento vitamínico mineralizante inyectable

Fórmula: Sodio Hipofosfito 12%; Selenito de Sodio 0,3465%; Vitamina A Palmitato 1%; Vitamina D3 0,016%; Vitamina E Acetato 2,8%.

Indicaciones: Tratamiento y prevención de estados carenciales de Fósforo, Selenio y Vitaminas A, D y E.

Dosis: Bovinos, ovinos y porcinos: 1 ml cada 50 kg de peso (24,1 mg de Fósforo; 1,56 mg de Selenio; 17.000 UI de Vitamina A; 6.400 UI de Vitamina D3 y 28 UI de Vitamina E). Duración del tratamiento: Se recomiendan aplicaciones estratégicas: En preparto: 20-25 días previos a la fecha de parto. En post-parto: Dentro de la primer semana posterior al parto. En pre-servicio: Para ambos sexos. En invernada: Cada 60 días hasta la terminación.

Vía de administración: Subcutánea.

Presentación: Frasco por 500 ml. *Exportación:* Frasco por 100 ml.

ENG

SELEVIT ZOOVET ADE

Injectable mineralizer vitamin supplement

Formula: *Sodium Hypophosphite 12%; Sodium Selenite 0.3465%; Vitamin A Palmitate 1%; Vitamin D3 0.016%; Vitamin E Acetate 2.8%.*

Indications: *Cure and prevention of conditions following deficiency of Phosphorus, Selenium, and Vitamins A, D, and E.*

Dosage: *Cattle, sheep and swine: 1 ml every 50 kg bw (24.1 mg of Phosphorus; 1.56 mg of Selenium; 17,000 IU of Vitamin A; 6,400 IU of Vitamin D3 and 28 IU of Vitamin E). Treatment duration: Strategic applications are recommended: Pre-parturition: 20 to 25 days prior to parturition date. Post-parturition: Within the first week after parturition. Before natural service: For male and female. During fattening: Every 60 days, until termination.*

Administration: *Subcutaneous.*

Presentation: *500 ml vial. Export: 100 ml vial.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

Sólo disponible para exportación
Only available for export

✓ ***Ideal en preservicio***
✓ *Ideal for pre-mating*

ESP

VITANABOL AD$_3$E *ENGORDE*

Anabólico

Fórmula: Nandrolona Fenilpropionato 1%, Vitamina A Palmitato 2% (400.000 UI); Vitamina E Acetato 1% (1.000 UI); Vitamina D3 0,03% (1.200.000 UI).

Indicaciones: Promotor del engorde y desarrollo. Eleva los índices de conversión del alimento en carne. Está indicado en los procesos de convalecencia, recuperación de cirugías, animales caídos, crecimiento retrasado, resolución de fracturas, caquexia, distrofia muscular, anemia, osteoporosis, y procesos en los que se considere necesario estimular el apetito y el metabolismo en general.

Dosis: Bovinos: 1 ml por cada 50 kg de peso. Ovinos y porcinos: 1 ml por cada 33 kg de peso. Intervalo entre dosis: Cada 60 días. Duración del tratamiento: Dependerá de la patología a tratar y del criterio del profesional veterinario actuante.

Vía de administración: Subcutánea.

Presentación: Frasco por 100, 250 y 500 ml.

ENG

VITANABOL AD$_3$E *FATTENING*

Anabolic

Formula: *Nandrolone Phenylpropionate 1%, Vitamin A Palmitate 2% (400,000 IU); Vitamin E Acetate 1% (1,000 IU); Vitamin D3 0.03% (1,200,000 IU).*

Indications: *Fattening and development booster. It increases the conversion rate of food to meat. It is indicated in processes of convalescence, surgery recovery, fallen animals, delayed growth, fracture solution, cachexy, muscular dystrophy, anemia, osteoporosis, and conditions that require to stimulate the appetite and metabolism in general.*

Dosage: *Cattle: 1 ml every 50 kg bw. Sheep and swine: 1 ml every 33 kg bw. Interval between doses: Every 60 days. Treatment duration: It will depend on the pathology to treat and the acting veterinarian criterion.*

Administration: *Subcutaneous.*

Presentation: *100, 250 and 500 ml vials.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

Sólo disponible para exportación
Only available for export

ESP

ZERAMECTINA 3,5%

Anabólico - Endectocida de larga acción

Fórmula: Ivermectina 3,5%, Zeranol 1%.

Indicaciones: Endectocida de acción prolongada. Posee un potente efecto anabólico por la incorporación del Zeranol.

Dosis: Bovinos: 1 ml cada 50 kg de peso (700 mcg/kg de Ivermectina; y 200 mcg/kg de Zeranol). Intervalo entre dosis: 90 a 120 días. Duración del tratamiento: Dosis única.

Vía de administración: Subcutánea.

Presentación: Frasco por 50, 100 y 500 ml.

ENG

ZERAMECTINA 3.5%

Anabolic - Long acting endectocide

Formula: *Ivermectin 3.5%, Zeranol 1%.*

Indications: *Long acting endocticide. Powerful anabolic effect due to the Zeranol incorporation.*

Dosage: *Cattle: 1 ml every 50 kg bw (700 mcg/kg of Ivermectin and 1 mg/kg of Zeranol). Interval between doses: 90 to 120 days. Treatment duration: Single dose.*

Administration: *Subcutaneous.*

Presentation: *50, 100 and 500 ml vials.*

SOLUCIÓN INYECTABLE
INJECTABLE SOLUTION

Sólo disponible para exportación
Only available for export

ESP

ZILPATEROL *ZOOVET*

Mejorador de la ganancia de peso y la conversión alimenticia

Fórmula: Zilpaterol Clorhidrato 4,8%.

Indicaciones: Mejorador de la conversión alimentaria y ganancia de peso.

Dosis: Bovinos: Zilpaterol Clorhidrato 0,15 mg/kg de peso (6 ppm en la ración, agregando 125 gr de producto por tonelada alimento en animales de 400 kg que consumen 10 kg con un contenido de 90% de materia seca). Intervalo entre dosis: 24 horas. Duración del tratamiento: Los últimos 30 días de engorde a corral.

Vía de administración: Oral. Incorporado al alimento.

Presentación: Bolsa por 5 kg.

ENG

ZILPATEROL *ZOOVET*

Weight gain and food conversion promoter

Formula: *Zilpaterol Hydrochloride 4.8%.*

Indications: *Weight gain and food conversion promoter.*

Dosage: *Cattle: Zilpaterol Hydrochloride 0.15 mg / kg bw (6 ppm in the food, adding 125 g of the product per ton of food in 400 kg animals that eat 10 kg with a 90% content of dry matter). Interval between doses: 24 hours. Treatment duration: The last 30 days of feedlot fattening.*

Administration: *Oral. Mixed with the food.*

Presentation: *5 kg bag.*

Sólo disponible para exportación
Only available for export

280922

zoovet®

Nuestra receta, la mejor receta.

Our recipe, the best recipe.

/zoovet.productosveterinarios @zoovetar /zoovet.productosveterinarios